

		Pegneucyte™ pegfilgrastim Solução injetável 6 mg/0,6 mL Fator de Crescimento Hematopoiético seringa preenchida com 0,6 mL de solução injetável contendo 6 mg de pegfilgrastim com sistema de segurança. INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO DA SERINGA PREENCHIDA DE PEGNEUCYTE™ COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Esta seção contém informação sobre como aplicar uma injeção de Pegneucyte™ seringa preenchida com dispositivo de segurança. Ler todas as instruções atentamente antes de usar a seringa preenchida. Para reduzir o risco de acidentes envolvendo picadas de agulha, cada seringa preenchida está equipada com um protetor de segurança. É necessário ativar manualmente o protetor de segurança (deslizar sobre a agulha) depois da aplicação. NÃO deslizar o protetor de segurança sobre a agulha antes de administrar a injeção, pois ele permanecerá travado no local e impedirá a aplicação. Remover a seringa preenchidada do refrigerador. Deixar a seringa preenchida em temperatura ambiente por aproximadamente 30 minutos. Isto fará com que a injeção seja mais confortável. Não aquecer Pegneucyte™ de outra forma (por exemplo, não aqueça no micro-ondas ou em água quente). Além disto, não deixar a seringa exposta à luz solar direta. Não agitar a seringa preenchida. Não retirar a tampa da agulha até que esteja pronto para injetar. Etapas 1: Equipamentos A. Encontrar uma superfície de trabalho limpa, bem iluminada e plana, como uma mesa. B. Retirar a embalagem da seringa preenchida da geladeira e coloca-la na sua superfície de trabalho limpa. Deixá-la atingir a temperatura ambiente por 30 minutos antes de administrar uma injeção. C. Retirar a seringa preenchida do cartucho. D. Lavar bem as mãos com sabão e água. E. Reunir os suprimentos para a injeção: - uma seringa preenchida nova de Pegneucyte™; - algodão umedecido com álcool e similar. Etapas 2: Preparo da injeção F. Segurar a proteção de segurança da agulha para remover a seringa preenchida do berço. Por razões de segurança: - Não pegue no êmbolo. - Não segure a tampa da agulha cinza. G. Inspeccionar o medicamento e a seringa. - Verifique se a solução é límpida e incolor. Não utilizar a seringa se: - O medicamento estiver turvo ou descolorido ou contém flocos ou partículas. - A seringa preenchida sofrer quedas. - Qualquer parte parece rachada ou quebrada. - Não constar a tampa da seringa	
		- O medicamento já estiver expirado. H. Preparar e limpar o local da injeção. Os locais abaixo podem ser utilizados para injeção: - Coxas; - Abdômen, exceto por uma área de 5 centímetros ao redor do umbigo; - Área externa superior das nádegas (somente se outra pessoa estiver aplicando a injeção) e - Área externa da parte superior do braço (somente se alguém estiver lhe dando a injeção). Limpar o local da injeção com um pano embebido em álcool. Deixar a pele secar. - Não tocar na área limpa novamente antes de injetar. - Não injetar em áreas onde a pele esteja sensível, machucada, vermelha ou endurecida. Evitar injetar em áreas com cicatrizes ou estrias. - Se você quiser usar o mesmo local de injeção, verificar se não é o mesmo local no local da injeção que você usou para uma injeção anterior. I. Segurar a seringa preenchida pelo dispositivo de segurança da agulha. Quando estiver pronto, puxar com cuidado a tampa da agulha e retirá-la da seringa. - Não torcer ou dobrar a tampa da agulha. - Não segurar a seringa preenchida pela haste do êmbolo. - Não voltar a colocar a tampa da agulha na seringa preenchida. Descartar a tampa da agulha no lixo. Etapas 3. Injeção J. Pinçar o local de injeção limpo para criar uma superfície firme. Manter o local pinçado durante a injeção. K. Inserir a agulha na pele com ângulo entre 45 e 90 graus. Não tocar na área limpa da pele. L. Usando pressão lenta e constante, empurrar a haste do êmbolo até atingir o fundo. O êmbolo deve ser empurrado completamente para injetar a dose completa. M. Uma vez que toda a dose tenha sido injetada, o dispositivo de segurança da agulha será acionado. Você pode fazer o seguinte: - Soltar o êmbolo até que toda a agulha esteja coberta e depois remover a agulha do local da injeção. - Remover com cuidado a agulha do local de injeção e soltar o êmbolo até	que toda a agulha esteja coberta pelo dispositivo de segurança da agulha. Depois de soltar o êmbolo, o dispositivo de segurança da agulha cobrirá com segurança a agulha da seringa. - Uma vez que a agulha tenha sido removida do local de injeção, descartar a seringa e a agulha imediatamente. - Se o dispositivo de segurança da agulha não tiver sido ativado ou foi apenas parcialmente ativado, descartar o produto (sem colocar a tampa da agulha). - Após remoção da seringa, se parecer que ainda há medicamento na seringa, isso significa que a dose completa não foi aplicada. Ligar para o médico imediatamente. Não utilizar Pegneucyte™ restante na seringa. N. Examinar o local da injeção. Se houver sangue, pressionar o local da injeção com um chumaço de algodão ou gaze. Não esfregar o local da injeção. Fazer um curativo, se necessário. Etapas 4. Descarte de seringas usadas - Não colocar a tampa de volta na agulha da seringa usada. - Manter as seringas fora do alcance das crianças. - A seringa usada deve ser descartada de acordo com as exigências locais. Perguntar ao farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o meio ambiente. DIZERES LEGAIS M.S. no 1.0370.0781 Farm. Resp.: Andreia Cavalcante Silva CRF-GO no 2.659 Fabricado por: BIOCON BIOLOGICS LIMITED Bloco N°.B1, B2, Q13 de Q1 e W20 e Unidade S18, 1ºAndar, Bloco B4, Zona Econômica Especial, Lote nº 2, 3, 4 e 5, Fase IV, Bommasandra - Jigani Link Road, Posto Bommasandra, Bengaluru - 560 099, Índia. Mfg. Lic. Nº: KTK/28D/07/2006. Importado por: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A. CNPJ – 17.159.229/0001 - 876 VP 7-D Módulo 11 Qd. 13 – DAIA CEP 75132-140 – Anápolis – GO 0800 6218001 teuto.com.br

TEUTO SE É TEUTO, É DE CONFIANÇA DESENVOLVIMENTO DE EMBALAGEM		Código Atual: 406549-00	Código Anterior: N/A
☐ Protocolo ☒ Lançamento ☐ Republicação ☐ Alteração interna Alteração: ☐ Texto ☐ Dimensional CM0210523	Produto: PEGNEUCYTE™ Apresentação: SOLUÇÃO INJ 6 MG/0,6ML Dimensional: 600x390MM Gramatura: 40G/M² Tipo: ☐ Aberta ☒ Dobrada	Finalizado em: 10/07/2023 Arte-finalista: João Paulo de Pina Conferente: Filipe Carvalho OBSERVAÇÃO: É proibida a reprodução e alteração de qualquer arquivo fornecido pelo TEUTO sem prévia autorização. (Arquivo reduzido para impressão)	