



SE É TEUTO,
É DE CONFIANÇA



Bacteracin - Sulfametoxazol + trimetoprima (Antibiótico)

Tratamento das infecções causadas por germes sensíveis ao Bacteracin, tais como infecções do trato respiratório, infecções do trato urinário e renais, infecções genitais em ambos os sexos, infecções gastrointestinais, infecções da pele e tecidos moles, outras infecções bacterianas causadas por uma grande variedade de microrganismos (tratamento possivelmente em combinação com outros antibióticos): osteomielite aguda e crônica, brucelose aguda, nocardiose, blastomicose sul-americana, actinomycetoma.

Referência: Bactrim - Farmoquímica.

DEZ/23

MS. 1.0370.0638 - Bacteracin - Sulfametoxazol + trimetoprima - Susp. Oral 200mg/5mL + 40mg/5mL fr. c/100mL + copo-medida. MS. 1.0370.0410 - Sulfametoxazol + trimetoprima - Susp. Oral 200mg/5mL + 40mg/5mL fr. c/100mL + copo-medida - "Medicamento Genérico - Lei nº 9.787-99"

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? É indicado no tratamento de infecções causadas por microrganismos sensíveis à associação de trimetoprima e sulfametoxazol, como certas infecções respiratórias, gastrointestinais, renais e do trato urinário, genitais (feminino e masculino), da pele, entre outros tipos de infecções. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Não deve ser utilizado por pacientes com doença grave no fígado ou no rim. Também está contraindicado a pacientes com alergia à sulfonamida ou à trimetoprima ou a outro componente da fórmula. Não deve ser utilizado em combinação com dofetilida (medicamento contra arritmias). 3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Em pacientes idosos ou com história de deficiência de ácido fólico ou insuficiência renal, podem ocorrer alterações hematológicas (no sangue) indicativas de deficiência de ácido fólico. Deve ser administrado com cautela a pacientes com história de alergia grave e asma brônquica. Não deve ser utilizado por pacientes com sérias alterações hematológicas nem por portadores de deficiência de ácido fólico. Deve-se ter cautela com pacientes com porfiria ou alterações da tireoide. Este medicamento pode aumentar a excreção urinária, particularmente em pacientes com edema de origem cardíaca. TMP podem causar hipercalemia, quando administradas em pacientes com doenças subjacentes do metabolismo do potássio, insuficiência renal ou que estejam recebendo drogas que provocam hipercalemia. É indicado monitoramento rigoroso do potássio sérico nesses pacientes. Não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Caso haja necessidade de uso, toda gestante ou mulheres que pretendem engravidar devem receber concomitantemente 5 a 10mg de ácido fólico diariamente durante o tratamento com sulfametoxazol + trimetoprima. Deve-se evitar o uso deste medicamento no último trimestre de gestação. Este medicamento não deve ser utilizado durante a amamentação, exceto sob orientação médica. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Deve-se ter cautela com o uso concomitante de sulfametoxazol + trimetoprima e os medicamentos: diuréticos, digoxina, medicamentos para doenças do sistema nervoso (Ex: antidepressivos e fenitoína); medicamentos que contenham amantadina, lamivudina ou mementina, antidiabéticos orais, ciclosporina, indometacina, metotrexato, pirimetamina e varfarina. Trimetoprima interage com a dofetilida, portanto, este medicamento não deve ser administrado em combinação com esse fármaco. A exposição sistêmica a medicamentos metabolizados pelas enzimas do fígado (citocromo P450 2C8) pode aumentar quando administrado com trimetoprima + sulfametoxazol (ex: amiodarona, apsona, repaglinida, rosiglitazona e pioglitazona). Deve-se ter cuidado quando TMP e SMZ é administrado com outros agentes que aumentam o potássio sérico, tais como inibidores da enzima convertora da angiotensina e bloqueadores dos receptores da angiotensina, diuréticos poupadores de potássio, e prednisona. 4. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO: Crianças de 6 semanas a 5 meses: 2,5mL da susp. a cada 12 horas. De 6 meses a 5 anos: 5mL da susp. a cada 12 horas. De 6 a 12 anos: 10mL da susp. a cada 12 horas. Isso corresponde, aproximadamente, a dose diária média de 6mg de trimetoprima e 30mg de sulfametoxazol por kg de peso. Em infecções graves a dosagem pode ser aumentada em 50%. Adultos e crianças a partir de 12 anos: 20mL da susp. a cada 12 horas. Dose mínima e dose para tratamento prolongado (mais de 14 dias): 10mL da suspensão a cada 12 horas. Dose máxima (casos especialmente graves): 30mL da suspensão a cada 12 horas. 5. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? Nas doses recomendadas, este medicamento é geralmente bem tolerado. Os efeitos colaterais mais comuns são erupções cutâneas e distúrbios gastrointestinais. Outros efeitos colaterais comuns são: Ureia elevada, creatinina sérica elevada, Erupção medicamentosa fixa, dermatite esfoliativa, erupção cutânea, exantemas, eritema, prurido, Leucopenia, granulocitopenia, trombocitopenia, Hipercalemia. Outras reações menos comuns estão descritas na bula. 6. Uso oral. Uso adulto e pediátrico acima de 6 semanas. Venda sob prescrição médica. Só pode ser vendido com retenção de receita.

BACTERACIN E SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA SÃO MEDICAMENTOS. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. "SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO"

Material informativo exclusivo para a equipe de venda do medicamento