



Diclofenaco Potássico

(Anti-inflamatório)

Tratamento a curto prazo das seguintes condições de estados dolorosos inflamatórios pós-traumáticos, inflamação e tumefação, como por exemplo os causados por entorses; dor, tumefação e inflamação no pós-operatório, por exemplo após cirurgias ortopédicas ou odontológicas; cólica renal ou biliar.

Mai/23

MS. 1.0370.0314 – Diclofenaco Potássico - Solução injetável 25mg/mL com 100 ampolas de 3mL – “Medicamento Genérico – Lei 9787-99”

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? Tratamento a curto prazo de condições agudas: Estados dolorosos inflamatórios pós-traumáticos; inflamação e tumefação (entorses, pós-operatório de cirurgias ortopédicas ou odontológicas); nas cólicas renais ou biliares. 2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Não tomar se: for alérgico ao diclofenaco ou outro componente da fórmula; já teve reação alérgica após tomar ácido acetilsalicílico, diclofenaco ou ibuprofeno; se tem úlcera no estômago ou no intestino; tem sangramento no estômago ou no intestino; sofre de doença grave no fígado ou nos rins; tem insuficiência cardíaca grave; você está nos últimos 3 meses de gravidez. 3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: tenha cuidado com diclofenaco potássico se: você está tomando outros anti-inflamatórios incluindo ácido acetilsalicílico, corticoides, anticoagulantes ou inibidores seletivos da recaptção de serotonina; se tem asma ou rinite alérgica; você já teve problemas gastrintestinais como úlcera no estômago, sangramento ou fezes escuras; você tem inflamação no cólon ou trato intestinal (doença de crohn); você tem problemas no coração ou pressão arterial alta; problemas no fígado ou nos rins; você estiver desidratado; você apresenta inchaço nos pés; tem hemorragias ou outros distúrbios no sangue. Este medicamento pode reduzir os sintomas da infecção (ex.: febre) dificultando sua detecção. Em casos muito raros diclofenaco pode causar reações cutâneas alérgicas graves. Assim como com outros aines, reações alérgicas, incluindo-se reações anafiláticas podem ocorrer. O diclofenaco potássico deve ser aplicado exclusivamente nas nádegas. Não injetar no braço. Não é indicado para crianças abaixo de 14 anos, com exceção de casos de artrite juvenil crônica. Pacientes idosos podem ser mais sensíveis que os adultos em relação ao efeito de diclofenaco potássico. Em casos raros, pacientes em tratamento com diclofenaco podem apresentar reações adversas como distúrbios de visão, tontura ou sonolência. Se tiver esses efeitos, não dirigir, operar máquinas ou fazer qualquer atividade que requer atenção especial. Avise o médico se apresentar qualquer um destes efeitos. Não deve ser usado durante a gravidez e a amamentação, exceto sob orientação médica. Este medicamento é contraindicado na faixa etária de 0 a 18 anos. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Lítio ou inibidores seletivos da recaptção da serotonina (usados para tratar alguns tipos de depressão); Digoxina; Diuréticos; Inibidores da ECA ou betabloqueadores (tratar pressão alta e insuficiência cardíaca); Outros AINÉs: Assim como ácido acetilsalicílico ou ibuprofeno; Corticoides; Anticoagulantes; Antidiabéticos; Metotrexato: Medicamentos usados para tratar alguns tipos de câncer ou artrite; Ciclosporina; Antibacterianos quinolônicos. 4. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO: Adultos: A dose em adultos é geralmente 1 ampola de diclofenaco potássico por dia por, no máximo, 2 dias, em alguns casos 2 ampolas por dia. Para adultos, a dose é geralmente de uma ampola diária de 75mg, injetada profundamente no quadrante superior externo da região glútea. Excepcionalmente, em casos de crises dolorosas (por exemplo, cólicas), duas injeções de 75mg separadas por um intervalo de algumas horas, podem ser administradas por dia (uma em cada nádega). 5. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? Reações adversas comuns (afeta entre 1 a 10 pessoas a cada 100): dor de cabeça, tontura, náusea, vômito, diarreia, indigestão, dor abdominal, flatulência, perda do apetite, mudança na função do fígado, rash cutâneo, reação, dor e endurecimento no local da injeção. Reações adversas raras e muito raras que podem ser sérias: sangramento, febre alta, reação alérgica com inchaço na face e garganta, Respiração ofegante e sensação de aperto no peito (sinais de asma); dor no peito (sinais de ataque cardíaco); dor de cabeça grave e repentina, náusea, tontura, dormência, inabilidade ou dificuldade de falar, paralisia (sinais de ataque cerebral); pescoço duro (sinais de meningite viral); convulsões; pressão sanguínea alta; entre outras descritas na bula original do produto. Leia a bula com atenção antes de usar Diclofenaco. 6. Uso intramuscular. Uso adulto. Venda sob prescrição médica. Venda proibida ao comércio.

DICLOFENACO POTÁSSICO É UM MEDICAMENTO.
SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.
“SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO”

Material informativo exclusivo para equipe de vendas do medicamento.