

Baclofeno

(Antiespástico)



SE É TEUTO,
É DE CONFIANÇA

O baclofeno é usado para reduzir e aliviar a rigidez excessiva e/ou espasmos nos músculos que podem ocorrer em várias condições tais como a esclerose múltipla, doenças ou lesões na medula óssea, e certas doenças cerebrais.

Referência: Lioresal - Novartis Biociência



jun/2023

MS. 1.0370.0111 - Baclofen – Baclofeno 10mg c/ 20 e 60 comp. MS. 1.0370.0613 - Baclofeno 10mg c/ 20 e 60 comp. "Medicamento Genérico - Lei n° 9.787, de 1999"

PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? É indicado para reduzir e aliviar a rigidez excessiva e/ou espasmos nos músculos que podem ocorrer em várias condições tais como a esclerose múltipla, doenças ou lesões na medula óssea, e certas doenças cerebrais. 2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Baclofeno é contraindicado nos casos de alergia ao medicamento ou demais componentes da formulação. Nestes casos, o médico deve ser informado antes de se tomar baclofeno. 3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS e PRECAUÇÕES: Informe o médico antes de tomar baclofeno se você tem: doença de Parkinson ou alguma doença mental acompanhada por depressão ou confusão, epilepsia, úlcera no estômago ou intestino, problemas respiratórios, doença no fígado, distúrbio de circulação sanguínea no cérebro, doença renal, dificuldade em urinar e diabetes. Pessoas com histórico de depressão, que consomem bebidas alcoólicas em excesso e apresentam ou já apresentaram pensamentos suicidas, devem informar ao médico antes de iniciar o uso de baclofeno. Caso alguns desses sintomas apareçam durante o uso do medicamento, procure o médico imediatamente. Antes de realizar qualquer tipo de cirurgia informe que está tomando baclofeno. Pacientes acima de 65 anos de idade ou com espasmos musculares causados por doença cerebral podem apresentar mais efeitos colaterais com o uso do medicamento. Algumas pessoas podem apresentar sonolência, tonturas ou perturbação visual com o uso de baclofeno, portanto não se deve dirigir veículos ou realizar atividades que exijam atenção durante o tratamento. O uso de baclofeno durante a gestação pode provocar convulsões e outros sintomas relacionados com a interrupção abrupta do tratamento logo após o parto. O médico fará os ajustes necessários nas doses e redução gradual do tratamento a fim de controlar e prevenir esses sintomas, caso necessário. Baclofeno pode passar para o leite materno. Portanto, o uso de baclofeno durante a gravidez e amamentação só deve acontecer com orientação médica. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Algumas substâncias interferem na ação de baclofeno, são elas: álcool, medicamentos sedativos, para distúrbios do humor como lítio e antidepressivo, anti-hipertensivos, Antiparkinsoniano e medicamentos para artrite e dor. Informe ao seu médico sobre o uso das substâncias descritas acima e se você está usando qualquer outro medicamento, incluindo os obtidos sem prescrição médica. 4. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Use oral, durante as refeições com um pouco de líquido. Baclofeno não deve ser partido ou mastigado. O tratamento com baclofeno deve ser sempre iniciado com doses baixas que são elevadas de acordo com a necessidade do paciente até a dose diária ótima. A dose usual para adultos é de 15mg/dia divididas em 2 a 4 tomadas. As doses podem ser aumentadas por incrementos de 15mg/dia (de 3 em 3 dias) até o limite de 80mg/dia. Em pacientes hospitalizados, podem ser administradas doses máximas diárias de 120mg, cuidadosamente monitorados no hospital. Baclofeno deve ser administrado com cautela e em doses mais baixas em pacientes com insuficiência renal. Nos pacientes submetidos à hemodiálise crônica, as concentrações plasmáticas de baclofeno são elevadas e a dose para estes pacientes deve ser mais baixa, 5mg. A descontinuação do tratamento deve ser gradual reduzindo as doses durante 1 a 2 semanas. Interromper repentinamente o tratamento pode piorar o quadro de saúde e ocasionar: nervosismo, confusão, alucinações, convulsões, dentre outros sintomas. Siga a orientação do médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. 5. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? Reações adversas graves: problemas respiratórios, sensação de confusão e felicidade extrema, tristeza, perda de coordenação, tremores, alucinações, pesadelos, dificuldade em urinar, convulsões, batimento cardíaco lento, entre outras. Reações adversas muito comuns (ocorre em mais de 10% dos pacientes): torpor, sonolência e náuseas. Reações adversas comuns – (entre 1% e 10%): cansaço, tontura, dor de cabeça, insônia, dor nos músculos, boca seca, vômito seco, diarreia, suor excessivo etc. Reações raras – (entre 0,01% e 0,1%): dormência nas mãos ou pés, dificuldade na fala, alterações no paladar, dor abdominal, impotência sexual e aumento de açúcar no sangue. Para maiores informações, vide bula. Informe ao seu médico o aparecimento de reações indesejáveis. 6. USO ADULTO. VIA ORAL. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.

BACLOFENO/BACLOFEN É UM MEDICAMENTO. DURANTE SEU USO, NÃO DIRIJA VEÍCULOS OU OPERE MÁQUINAS, POIS SUA AGILIDADE E ATENÇÃO PODEM ESTAR PREJUDICADAS.
"SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO"

Material Informativo exclusivo para a equipe de venda do medicamento