

8912 - 7896112189121

9608 - 7896112196082



Colpatrin Metronidazol + Nistatina (anti-infecioso)

Colpatrin® e Metronidazol + Nistatina são medicamentos. É indicado para o tratamento de vaginites específicas causadas por Trichomonas vaginalis, Candida albicans ou por associação de ambos.

Referência: Metronidazol + Nistatina – Prati-Donaduzzi

Maio/24

MS. 1.0370.0007 – Colpatrin - Metronidazol + Nistatina - 100mg/g + 20.000UI/g - Creme vaginal bisnaga c/ 50g + 10 aplicadores. MS. 1.0370.0664 - Metronidazol + Nistatina 100mg/g+20000UI/g cr. vag. 50g c/10 aplic. - "Medicamento Genérico - Lei 9.787-99" 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? É indicado para o tratamento de vaginites (inflamação na vagina) específicas por Trichomonas vaginalis Candida albicans ou por associação de ambos. 2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Não deve ser usado se você já teve alergia ao metronidazol, nistatina ou aos demais componentes do produto. Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes pediátricos. 3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: o uso de Colpatrin em tratamento com duração prolongada deve ser cuidadosamente avaliado pelo seu médico. O tratamento simultâneo com metronidazol por via oral deve ser evitado nos casos de histórico de discrasia sanguínea, hipotireoidismo ou hipoadrenalismo a menos que, na opinião do médico, os benefícios superem o possível risco para o paciente. Foram relatadas reações cutâneas graves (reações em pele), incluindo a síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) entre outras. Durante a menstruação, o tratamento com Colpatrin não é afetado. Se ® houver previsão de início do próximo ciclo menstrual, antes do término do tratamento prescrito pelo médico, recomenda-se, quando possível, postergar o início do tratamento para o dia seguinte ao término do ciclo menstrual. Caso o tratamento não esteja no início, complete-o até o seu término. Você não deve ingerir bebidas alcoólicas ou medicamentos que contenham álcool em sua formulação durante e no mínimo 1 dia após o tratamento com metronidazol. Foram reportados casos de hepatotoxicidade. quanto ao uso de Colpatrin. Siga a orientação do seu médico. Pacientes com doença severa, ativa ou crônica, do sistema nervoso central e periférico, devem ter cautela ao aplicar Colpatrin. Você não deve dirigir veículos ou operar máquinas caso esses sintomas ocorram: confusão, tontura, vertigem, alucinações, convulsões ou alterações visuais temporárias. Algumas pessoas sendo tratadas com metronidazol podem passar por problemas de saúde mental, tais como pensamentos irracionais, alucinações, sentir-se confuso ou deprimido, incluindo pensamentos de automutilação ou suicídio. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou amamentando sem orientação médica. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Colpatrin pode interagir com: Álcool; dissulfiram; anticoagulante oral (tipo varfarina); lítio; ciclosporina; fenitoí -lo. Posologia: Fazer 1 aplicação de preferência à noite, ao deitar-se, durante 10 dias. Cada aplicação (5g de creme vaginal) contém 500mg de metronidazol e 17,45mg (100.000UI) de nistatina. Consulte os cuidados e modo de uso na bula. 5. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? sensação de queimação vaginal; náusea, vômito e diarreia; angioedema; neuropatia sensorial periférica; dores de cabeça, convulsões, tontura, relatos de encefalopatia; aumento das enzimas do fígado; rash (erupções cutâneas), prurido (coceira), rubor (vermelhidão), urticária. A lista completa de reações adversas está descrita na bula original do produto. Leia a bula com atenção antes de usar Colpatrin. 6. Uso vaginal. Uso adulto. Venda sob prescrição médica.

COLPATRIN E METRONIDAZOL + NISTATINA SÃO MEDICAMENTOS.
SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.
"SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO"

Material informativo exclusivo para a equipe de venda do medicamento