



SE É TEUTO,
É DE CONFIANÇA



Alendronato de Sódio

(Supressor da Reabsorção Óssea)

O Alendronato de sódio é indicado para o tratamento da osteoporose em mulheres na pós-menopausa com osteoporose para prevenir fraturas, inclusive do quadril e da coluna (fraturas vertebrais por compressão). Alendronato de sódio é indicado para o tratamento da osteoporose de homens para prevenir fraturas.

Referência: Alendronato de sódio – Sandoz

ABRIL/24

MS. 1.0370.0604 – Alendronato de Sódio – 70mg com 4 comprimidos – “Medicamento Genérico – Lei 9.787-99”

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? indicado no tratamento de osteoporose. Este medicamento ajuda na prevenção do desenvolvimento de fraturas. 2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Não tomar este medicamento se apresentar algum distúrbio do esôfago; não conseguir permanecer em pé ou na posição sentada durante, pelo menos, 30 minutos; tiver hipersensibilidade a qualquer componente do produto; se apresentar deficiência de cálcio no sangue. 3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Informe ao médico sobre doenças que apresente ou tenha apresentado, incluindo doença renal conhecida, sobre quaisquer tipos de alergias e se for ou tiver sido fumante. Se apresentar qualquer problema digestivo ou de deglutição, informe seu médico antes de tomar este medicamento. Não tome alendronato se você estiver grávida ou amamentando. O alendronato não é indicado para uso em crianças. Foram relatadas reações adversas com alendronato que podem afetar sua capacidade de dirigir ou operar máquinas. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Você sempre deve dizer ao seu médico sobre todos os medicamentos que esteja tomando ou planeje tomar, incluindo aqueles obtidos sem prescrição médica. Alendronato deve ser ingerido 1 vez por semana em jejum absoluto. 4. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO: Escolha um dia da semana que lhe seja mais adequado e nesse dia, tome um comprimido de alendronato 1 vez por semana. No dia escolhido, ao levantar-se e antes de se alimentar, beber qualquer tipo de líquido ou tomar qualquer outro medicamento, tome 1 comp. de alendronato com um copo cheio de água filtrada (180-240mL). Não tomar com água mineral, café ou chá, suco. Não mastigue ou chupe este comprimido. Após ter engolido o comprimido de alendronato, não se deite – fique em posição ereta (sentada, em pé ou caminhando) durante pelo menos 30 minutos e não se deite até que tenha feito a sua primeira refeição do dia. Não tome Alendronato à noite, ao se deitar, ou pela manhã, antes de se levantar. As recomendações acima facilitarão a chegada do comprimido de alendronato ao estômago e deste modo, reduzirão o potencial de irritação do esôfago. Após engolir o comprimido de alendronato, espere pelo menos 30 minutos antes de se alimentar, beber ou tomar qualquer outra medicação, incluindo antiácidos, suplementos de cálcio e vitaminas. O alendronato de sódio só é eficaz se ingerido quando seu estômago estiver vazio. 5. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? A maioria dos pacientes não apresenta efeitos adversos com alendronato de sódio. No entanto, como qualquer medicamento, o alendronato pode apresentar reações adversas. As reações adversas em geral foram leves. Alguns pacientes podem apresentar distúrbios digestivos, como náusea, vômito ou fezes escuras e/ou sanguinolentas. Alguns distúrbios digestivos podem ser graves, incluindo irritação ou ulceração do esôfago (o tubo que liga a boca ao estômago), que podem causar dor torácica, refluxo gastroesofágico, dificuldade para engolir ou dor após a deglutição. Estas reações podem ocorrer especialmente se os pacientes não tomarem alendronato de sódio com um copo cheio de água e/ou se deitarem menos de 30 minutos após tomar este medicamento ou antes da primeira refeição do dia. As reações esofágicas podem piorar se os pacientes continuarem a tomar alendronato de sódio após o desenvolvimento dos sintomas sugestivos de irritação do esôfago. Alguns pacientes podem experimentar dor óssea, muscular ou das articulações raramente (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento). Outras reações mais raras podem ocorrer e estão descritas na bula. 6. Uso oral. Uso adulto. Venda sob prescrição médica.

ALENDRONATO É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS.
PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.
“SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO”

Material informativo exclusivo para a equipe de venda do medicamento