

# TEUTO

SE É TEUTO,  
É DE CONFIANÇA



## Lozan – Cetoconazol (Antimicótico)

Lozan® é indicado para infecções da pele, cabelo e mucosa, causadas por dermatófitos e/ou leveduras que não podem ser tratadas topicamente devido ao local ou extensão da lesão ou infecção profunda da pele: dermatofitoses; pitíriase versicolor; foliculite por *Pityrosporum*; candidíases cutânea, mucocutânea crônica, orofaríngea e esofágica, e vaginal crônica recidivante. Infecções fúngicas sistêmicas.

Referência: Candoral – Aché

ABRIL/24

MS. 1.0370.0092 – Lozan – Cetoconazol – 200 mg c/ 10 ou 30 comprimidos; MS. 1.0370.0715 – Cetoconazol - 200 mg c/ 10 ou 30 comprimidos – “Medicamento Genérico – Lei nº 9.787-99”

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? Indicado no tratamento de certas infecções causadas por fungos como blastomicose, coccidioidomicose, histoplasmose, cromomicose e paracoccidioidomicose. O cetoconazol não deve ser usado em casos de meningite fúngica devido à sua baixa penetração no líquido cerebrospinal. 2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Não tome em caso de hipersensibilidade ao cetoconazol ou aos excipientes da formulação. Não tome caso você tenha doença do fígado. Você não deve tomar certos medicamentos enquanto estiver tomando cetoconazol. É contraindicado para uso por pacientes com doença do fígado e para menores de 2 anos. 3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Informe ao médico se você estiver tomando outros medicamentos, pois a ingestão ao mesmo tempo de cetoconazol com outros medicamentos pode ser prejudicial. Durante o tratamento com cetoconazol podem ocorrer distúrbios no fígado, até mesmo em tratamentos curtos. Casos de hepatotoxicidade grave, incluindo casos fatais ou que necessitaram de transplante hepático, ocorreram com o uso de cetoconazol oral. Quando a acidez gástrica está reduzida, a absorção do cetoconazol é reduzida. Não é provável que cetoconazol tenha efeito sobre a capacidade de dirigir veículos e operar máquinas. Você não deve amamentar se estiver tomando cetoconazol. Não deve ser utilizado por grávidas sem orientação médica. O uso documentado de cetoconazol em crianças com peso inferior a 15kg é muito limitado. Portanto, o uso deste medicamento em crianças pequenas não é recomendado. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não tomar bebidas alcoólicas com cetoconazol. Medicamentos que não devem ser tomados durante o uso de cetoconazol: terfenadina, astemizol e mizolastina; levacetilmetadol, metadona; cisaprida; domperidona; sinvastatina e lovastatina; midazolam, triazolam; lurasidona, pimozida, sertrindol, quinidina, disopiramida, dronedarona, dofetilida, bepridil, felodipina, eplerenona, lercanidipina, ivabradina, ranolazina, nisoldipina, metilergometrina; colchicina, quando usado em pacientes com insuficiência dos rins ou fígado. Espere pelo menos uma semana após o fim do tratamento com cetoconazol antes de tomar qualquer um destes medicamentos. Muitos outros medicamentos interagem com cetoconazol e estão descritos na bula. Leia a bula. 4. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO: Adultos: um comp. (200mg) 1 vez ao dia, junto com uma refeição. Quando a resposta clínica for insuficiente, seu médico poderá aumentar a dose para 2 comp., sempre 1 vez ao dia. Crianças com mais que 30kg necessitam de 1 comp. (200mg) 1 vez ao dia. Algumas vezes, essa dose pode ser aumentada para 2 comprimidos de uma só vez, diariamente. Crianças com peso entre 15 e 30kg necessitam da metade de 1 comprimido (100mg) por dia durante uma refeição. Não é recomendado para crianças com peso inferior a 15kg e abaixo dos 2 anos de idade. Siga a orientação do médico. 5. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? Reação comum (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes): dor abdominal, diarreia, náusea, função hepática anormal e dor de cabeça. Reações adversas relatadas por < 1% dos pacientes: ginecomastia, fotofobia, dor abdominal superior, constipação, boca seca, dispepsia, dispepsia, flatulência, descoloração da língua, vômito, astenia, calafrios, fadiga, fôlego, mal-estar, edema periférico, febre, hepatite, icterícia, reação alérgica, diminuição das plaquetas, intolerância ao álcool, anorexia, hiperlipidemia, aumento do apetite, mialgia, tontura, parestesia, sonolência, insônia, nervosismo, distúrbio menstrual, epistaxe, alopecia, dermatite, eritema, prurido, erupção cutânea, urticária, hipotensão ortostática. 6. Uso oral. Uso adulto e pediátrico acima de 2 anos. Venda sob prescrição médica.

LOZAN/CETOCONAZOL SÃO MEDICAMENTOS. SEU USO PODE TRAZER RISCOS.

PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.

“SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO”

Material informativo exclusivo para a equipe de venda do medicamento