

Digestil Bromoprida

(Antiemético e Antinauseante)

TEUTO

SE É TEUTO,
É DE CONFIANÇA

Digestil® está indicado para: distúrbios da motilidade gastrointestinal (alteração na movimentação do estômago e intestino); refluxo gastroesofágico (presença de conteúdo ácido dentro do esôfago proveniente do estômago); náuseas e vômitos de origem central e periférica (cirurgias, metabólicas, infecciosas e problemas secundários ao uso de medicamentos). Digestil® é utilizado também para facilitar os procedimentos radiológicos do trato gastrointestinal. Referência: Digesan - Sanofi Medley



7266 - 7896112172666

2029 - 77896112120292

0167 - 7896112141679

7027 - 7896112170273

Junho/23

MS. 1.0370.0127 - Digestil - Bromoprida - 10mg c/ 20 comp. e Sol. Oral 4mg/mL fr. c/ 20 ml; MS. 1.0370.0662 - Bromoprida - 10mg c/ 20 comp. e Sol. Oral 4mg/mL fr. c/ 20 ml - "Medicamento Genérico - Lei nº 9.787 de 1999."

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? Indicada para distúrbios da motilidade gastrointestinal; refluxo gastroesofágico; náuseas e vômitos de origem central e periférica. É usada para facilitar os procedimentos radiológicos do trato gastrointestinal. 2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Em pacientes com antecedentes de alergia aos componentes da fórmula; quando a estimulação da motilidade gastrointestinal for perigosa (na presença de hemorragia, obstrução mecânica ou perfuração gastrointestinal); em pacientes epiléticos ou recebendo outras drogas que possam causar reações extrapiramidais; em crianças menores de 1 ano de idade, devido ao risco aumentado da ocorrência de agitação, irritabilidade e convulsões; em pacientes com feocromocitoma. 3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: O uso deve ser cauteloso em gestantes, crianças, idosos, pessoas que sofrem de glaucoma, diabetes, doença de Parkinson, insuficiência dos rins e pressão alta. Usar com cautela caso tenha alergia à neurolepticos. Não deve ser administrada a mulheres grávidas ou que amamentam, exceto a critério médico (benefícios x riscos para o feto ou recém-nascido). A ocorrência de discinesia tardia tem sido relatada em idosos tratados por períodos prolongados. As reações extrapiramidais (inquietação, movimentos involuntários, fala enrolada, entre outros) podem ser mais frequentes em crianças e adultos jovens e podem ocorrer após 1 única dose. A estase gástrica (dificuldade de esvaziamento gástrico) pode ser responsável pela dificuldade no controle de alguns diabéticos. A insulina administrada pode começar a agir antes que os alimentos tenham saído do estômago e levar a uma hipoglicemia. Caso seja diabético e utilize insulina, a dose de insulina e o tempo de administração podem necessitar de ajustes. A bromoprida pode aumentar os níveis de prolactina, o que deve ser considerado em pacientes com câncer de mama. Informe ao médico se tem alergia à procaína ou procaína, pois neste caso bromoprida deve ser usada com cautela. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Os efeitos de bromoprida na motilidade gastrointestinal são inibidos pelas drogas anticolinérgicas e analgésicos narcóticos. Pode haver aumento dos efeitos sedativos quando se administra bromoprida junto com sedativos, hipnóticos, narcóticos ou tranquilizantes. Informe ao seu médico caso você tenha pressão alta e esteja sob tratamento com inibidores da monoaminooxidase (tipo de medicamento antidepressivo), pois neste caso, a bromoprida deve ser usada com cuidado. A bromoprida pode diminuir a absorção de fármacos pelo estômago (p.ex. digoxina) e acelerar aquelas que são absorvidas pelo intestino delgado (p.ex. paracetamol, tetraciclina, levodopa, etanol). Pode haver aumento dos efeitos sedativos quando se administra bromoprida junto com álcool. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. 4. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO: Gotas pediátricas: Bromoprida: 1 a 2 gotas por quilo de peso, três vezes ao dia. Adultos: Tomar um comprimido (10mg) de 12h-12h ou de 8h-8h, conforme orientação médica. A dose máxima por dia é de seis comprimidos (60mg). Este medicamento não deve ser partido ou amastigado. 5. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? Reação muito comum: inquietação, sonolência, cansaço e lassidão (diminuição de forças, esgotamento). Com menor frequência podem ocorrer insônia, dor de cabeça, tontura, náuseas, sintomas extrapiramidais (relacionados à coordenação dos movimentos), galactorreia (produção de leite excessiva ou inadequada), aumento das mamas em homens, erupções cutâneas, incluindo urticária ou distúrbios intestinais. As reações extrapiramidais podem ser mais frequentes em crianças e adultos jovens, enquanto movimentos anormais ou perturbados são comuns em idosos sob tratamentos prolongados. 6. Uso oral. Uso adulto (comprimido) e pediátrico acima de 1 ano (sol. Oral). Venda sob prescrição médica.

DIGESTIL E BROMOPRIDA SÃO MEDICAMENTOS. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. "SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO"

Material informativo exclusivo para a equipe de venda do medicamento