



Cefalexina

(Antibiótico Cefalosporínico)

A cefalexina é indicada para o tratamento das seguintes infecções quando causadas por cepas de microrganismos sensíveis: Sinusites bacterianas; Otite média; Infecções do trato respiratório, da pele e tecidos moles, ósseas, do trato geniturinário e dentárias. Referência: Keflex - Bagó

Junho/23

MS. 1.0370.0509 – Cefalexina Pó p/ suspensão oral 50mg/mL c/50 frascos de 60mL e MS. 1.0370.0382 – Cefalexina comprimido 500mg - c/ 500 – “Medicamento Genérico – Lei nº 9787 de 1999”

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? É indicada para o tratamento das infecções como sinusite, otites, infecções de dente, de pele e ossos, entre outras, quando causadas por cepas sensíveis dos microrganismos: E. coli, P. mirabilis, Klebsiella pneumoniae, S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis, outros estafilococos e estreptococos. 2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? A cefalexina é contraindicada para pacientes alérgicos às cefalosporinas. Este medicamento não deve ser utilizado por grávidas sem orientação médica. A cefalexina está classificada na categoria B de risco na gravidez. 3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: As cefalosporinas devem ser administradas cuidadosamente a pacientes alérgicos à penicilina. Reações agudas graves de hipersensibilidade podem levar à necessidade do uso de adrenalina ou outras medidas de emergência. Qualquer paciente que tenha demonstrado alguma forma de alergia, particularmente a drogas, deve receber cefalexina com cautela. Foi relatada colite pseudomembranosa com todos os antibióticos de amplo espectro. Essas colites podem variar de gravidade, de leve a intensa com risco de vida. O uso prolongado e/ou inadequado da cefalexina poderá resultar na proliferação de bactérias resistentes. A observação cuidadosa do paciente é essencial. Se uma superinfecção ocorrer durante a terapia, devem-se tomar as medidas apropriadas. A cefalexina deve ser administrada com cuidado a mulheres que estão amamentando. Este medicamento é conhecido por ser substancialmente excretado pela via renal, e o risco de reações tóxicas devido ao medicamento pode ser grande em pacientes com insuficiência renal. Devido aos pacientes idosos serem mais propensos a apresentarem função renal diminuída, a escolha da dose deve ser feita com cautela e a função renal deve ser monitorada. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: A excreção renal da cefalexina é inibida pela probenecida. A Cefalexina interfere na concentração e eliminação da metformina. Testes de COOMBS direto positivos foram relatados durante o tratamento com antibióticos cefalosporínicos. Poderá ocorrer uma reação falso-positiva para glicose na urina com as soluções de Benedict ou Fehling ou com os comprimidos de sulfato de cobre para teste. A cefalexina pode ser usada independente das refeições. 4. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO: As doses para adultos variam de 1 a 4g diárias, em doses fracionadas. A dose usual para adultos é de 250mg a cada 6 horas. Crianças - a dose diária recomendada para crianças é de 25 a 50mg/kg em doses fracionadas. 5. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? Sintomas de colite pseudomembranosa podem aparecer durante ou após o tratamento, náuseas e vômitos tem sido relatado raramente. A reação adversa mais frequente tem sido a diarreia. Tem também ocorrido dor abdominal e gastrite. Tem sido raramente relatada hepatite transitória e icterícia colestática. Foram observadas reações alérgicas na forma de erupções cutâneas, urticária, angioedema e raramente eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, ou necrólise tóxica epidérmica. Essas reações geralmente desaparecem com a suspensão da droga. Terapia de suporte pode ser necessária em alguns casos. Anafilaxia também foi relatada. Outras reações têm incluído prurido anal e genital, monilíase genital, vaginite e corrimento vaginal, tonturas, fadiga e dor de cabeça, agitação, confusão, alucinações, artralgia, artrite e doenças articulares. Tem sido raramente relatada nefrite intersticial, reversível. Eosinofilia, neutropenia, trombocitopenia, anemia hemolítica e elevações moderadas da transaminase glutâmico-oxalacética no soro (TGO) e transaminase glutâmico-pirúvica no soro (TGP) têm sido referidas. 6. Uso oral. Uso adulto (comprimido); adulto e pediátrico (suspensão). Venda sob prescrição médica. Só pode ser vendido com retenção de receita.

CEFALEXINA É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS.
PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.
“SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO”

Material informativo exclusivo para equipe de vendas do medicamento.