



SE É TEUTO,  
É DE CONFIANÇA



# Varfarina Sódica

(Anticoagulante)

A varfarina, como todos os anticoagulantes orais, é eficaz na prevenção primária e secundária do tromboembolismo venoso, na prevenção do embolismo sistêmico em pacientes com prótese de válvulas cardíacas ou fibrilação atrial, e na prevenção do acidente vascular cerebral, infarto recorrente e de morte em pacientes com infarto agudo do miocárdio.

Referência: Marevan - Farmoquímica S/A

SET/2022

MS:1.0370.0512.002-5 – Varfarina Sódica 5 mg caixa com 30 comprimidos – Medicamento Genérico - Lei nº9787/99

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? A varfarina sódica é indicada para a prevenção primária e secundária do tromboembolismo venoso (formação de trombos ou coágulos de sangue dentro de uma veia), na prevenção do embolismo sistêmico em pacientes com prótese de válvulas cardíacas ou fibrilação atrial e na prevenção do acidente vascular cerebral (AVC, derrame), do infarto agudo do miocárdio e da recorrência do infarto. 2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Não deve ser usado nas seguintes situações: Primeiras 24 horas antes ou após cirurgia ou parto; gravidez, especialmente durante o primeiro trimestre, devido à possibilidade de má-formação fetal. A administração a gestantes em estágios mais avançados está associada à hemorragia fetal e aumento na taxa de aborto; aborto incompleto; doenças hepáticas ou renais graves; hemorragias; hipertensão arterial grave não controlada; endocardite bacteriana; aneurisma cerebral ou aórtico; hemofilia; úlcera gástrica e alergia a qualquer componente da fórmula. 3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Este medicamento não deve ser usado por pacientes com hemorragia e, em geral, não deve ser prescrito a pacientes com risco de hemorragia. Os idosos e pacientes com deficiência de vitamina K requerem cuidado especial, assim como aqueles com hipertireoidismo. Se ocorrerem complicações hemorrágicas graves, deve-se interromper imediatamente a administração deste medicamento. Caso você esteja amamentando consulte o médico, pois é necessário ficar atento ao aparecimento de hematomas e sangramentos na criança. Caso ocorra qualquer indisposição ou sintoma de causa desconhecida, consulte o médico. 4. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: A varfarina interage com diversos grupos de medicamentos, diminuindo ou potencializando seus efeitos. Recomenda-se solicitar orientação médica para a utilização de qualquer medicamento de venda livre, como, por exemplo, ácido acetilsalicílico, analgésicos, antitérmicos e etc. A atividade da varfarina pode ser potencializada por esteroides anabólicos, amiodarona, amitriptilina, benzofibrato, cloranfenicol, cimetidina, ciprofloxacino, danazol, destropropoxifeno, dipiridamol, eritromicina, neomicina, feprazona, fluconazol, metronidazol, miconazol, oxifenilbutazona, fenformina, fenilbutazona, feniramidol, salicilatos, tolbutamida, sulfonamidas, tamoxifeno, triclofos, flurbiprofeno, ácido mefenâmico, piroxicam, fármacos para tratamento de disfunções da tireoide e qualquer fármaco potencialmente tóxico ao fígado, outros analgésicos anti-inflamatórios, antibióticos de largo espectro estão descritos na bula do produto. Tanto a potencialização quanto a inibição do efeito anticoagulante têm sido relatadas com fenitoína, ACTH e corticosteroides. A atividade anticoagulante da varfarina pode ser inibida ou diminuída por alguns fármacos, tais como: aminoglutetímida, barbiturato, carbamazepina, etclorvinol, glutatímida, griseofulvina, dicloralfenazona, primidona, a colestiramina, o sulcralfato, rifampicina e contraceptivos orais. Não se deve ingerir álcool durante o tratamento com varfarina sódica. 5. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? A duração da terapia e a dose de varfarina sódica deve ser individualizada para cada paciente baseada nos resultados de TP/RNI (valores obtidos no exame de sangue). A dosagem inicial é de 2,5mg a 5mg ao dia. Na maioria dos pacientes, a resposta é positiva mantida com uma dose de 2,5 a 10mg ao dia. De modo geral, a terapia com anticoagulante deve ser continuada até que o risco de trombose e embolia seja eliminado. Siga a orientação médica, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. 6. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR? Hemorragia de menor ou maior intensidade pode ocorrer durante a terapia com varfarina sódica, em qualquer tecido ou órgão, manifestando-se como sangramento externo ou interno, associado a sintomas e complicações dependentes do órgão ou sistema afetado. Pode ocorrer também necrose da pele e de outros tecidos, êmbolos aterotrombóticos sistêmicos e microêmbolos de colesterol. Outros sinais relacionados a complicações hemorrágicas estão descritos na íntegra na bula do produto. 6. Uso oral. Uso adulto. Venda sob prescrição médica.

VARFARINA SÓDICA É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.

“SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO”

Material informativo exclusivo para a equipe de venda do medicamento.