

# Cetoconazol + Dipropionato de Betametasona + Sulfato de Neomicina

**TEUTO**

SE É TEUTO,  
É DE CONFIANÇA

Está indicado nas afecções de pele, onde se exige ações anti-inflamatória, antibacteriana e antimicótica, causadas por germes sensíveis, como dermatites de contato, dermatite atópica, dermatite seborréica, intertrigo, disidrose, neurodermatite.

Referência: Novacort - Aché



MAR/2023

MS. 1.0370.0464 e MS. 1.0370.0468 - Cetoconazol + Dipropionato de Betametasona + Sulfato de Neomicina - pomada e creme dermatológico 20mg/g + 0,64mg/g + 2,5mg/g bisnagas com 30g. Medicamento Genérico - Lei nº 9.787-99\*

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? Está indicado nas afecções de pele, onde se exige ações anti-inflamatória, antibacteriana e antimicótica, causadas por germes sensíveis, como dermatites de contato, dermatite atópica, dermatite seborréica, intertrigo, disidrose, neurodermatite. 2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Este medicamento é contraindicado caso você tenha alergia a qualquer um dos componentes do medicamento. Você não deve usar o medicamento ao redor dos olhos. Não use este medicamento em determinadas infecções de pele, tais como: catapora, herpes simples ou zoster, tuberculose cutânea ou sífilis cutânea. Se você tiver uma dessas doenças, deve procurar o seu médico antes de usar o medicamento. 3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Durante o tratamento com este medicamento, você não deve usar cosméticos sobre a área da pele tratada. Se ocorrer irritação no local onde você passou o medicamento, procure a orientação do seu médico, pois somente o médico poderá avaliar a evolução do tratamento e decidir quando e como o tratamento deve terminar. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez. Este medicamento não deve ser usado durante a amamentação, exceto sob orientação médica. Aplique o medicamento somente na pele. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Não existe prova suficiente de que outros medicamentos causem modificações importantes no efeito habitual, ou seja, interajam com cetoconazol + dipropionato de betametasona + sulfato de neomicina. Podem surgir interações com alguns medicamentos quando utilizados durante o tratamento com cetoconazol + dipropionato de betametasona + sulfato de neomicina, como por exemplo, medicamentos prejudiciais ao fígado; anticoagulantes como dicumarol; ciclosporinas; famotidina; isoniazida; rifampicina; fenitoína; terfenadina; indinavir; saquinavir; ritonavir ou cisaprida. Evite tomar bebida alcoólica durante o tratamento. Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. 4. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO: Use o medicamento no local. Aplique uma fina camada do creme sobre a área afetada da pele, 1 vez ao dia. Em casos mais graves ou conforme orientação do médico, você pode aplicar 2 vezes ao dia. Não use este medicamento por períodos maiores que 2 semanas. Crianças menores de 12 anos devem usar pequenas quantidades deste medicamento. Adultos e crianças não devem usar mais que 45 gramas por semana. Não há contraindicação relativa a faixas etárias. Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. 5. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR? As reações desagradáveis atribuídas ao uso deste medicamento são: ardência, coceira, irritação, ressecamento, foliculite, hipertricose, dermatite perioral, inchaço da pele, infecção secundária, atrofia cutânea, dermatite de contato, brotoejas, surgimento de acne, supressão renal, estrias, petéquias, esquimose, dilatação dos vasos sanguíneos, eritema facial, aumento da sudorese, alopecia, pele pegajosa, eritema multifórmico, fotossensibilidade e sensibilidade da pele. Outras reações estão descritas na íntegra na bula do produto. Leia a bula. 6. Uso dermatológico. Uso adulto e pediátrico. Venda sob prescrição médica.

CETOCONAZOL + DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + SULFATO DE NEOMICINA É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. "SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO"

Material informativo exclusivo para a equipe de venda do medicamento