



SE É TEUTO,
É DE CONFIANÇA

Dorzolamida + Maleato de Timolol

Este medicamento é indicado para diminuir a pressão intra ocular elevada no tratamento de glaucoma e da hipertensão ocular.

Referência: Cosopt - Mundipharma



Março/2023

MS. 1.0370.0529 – Sol. oftálmica Dorzolamida 20mg/mL + Timolol 5mg/mL Frasco c/5mL - "Medicamento Genérico - Lei nº 9.787-99"; MS. 1.0370.0533 – Glalfital - Sol. oftálmica Dorzolamida 20mg/mL + Timolol 5mg/mL Frasco c/5mL

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? É indicado para diminuir a pressão intraocular elevada no tratamento de glaucoma e da hipertensão ocular. 2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Não use este medicamento se você: tem ou teve alguns problemas respiratórios graves, como asma; tem doença pulmonar obstrutiva crônica ou alguns tipos de doenças cardíacas (como batimentos cardíacos lentos ou irregulares); tem alergia a qualquer ingrediente do medicamento. 3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS e PRECAUÇÕES: Informe ao seu médico sobre problemas cardíacos, distúrbios de frequência cardíaca, problemas de má circulação sanguínea, problemas pulmonares ou respiratórios (como asma ou doença pulmonar obstrutiva crônica), diabetes e doença da tireoide. Informe ao seu médico que você está utilizando cloridrato de dorzolamida + maleato de timolol antes de realizar uma cirurgia. Se apresentar qualquer tipo de infecção ou irritação ocular, como vermelhidão ou inchaço das pálpebras, entre em contato com o médico. Se suspeitar que o colírio está causando reação alérgica, interrompa o tratamento e entre em contato com o médico. Dorzolamida + timolol contém o conservante cloreto de benzalcônio que pode se depositar nas lentes de contato gelatinosas. Informe o médico se você está grávida ou pretende engravidar. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Não use este colírio se estiver amamentando. Há informações limitadas sobre o uso deste medicamento em lactentes e crianças. Informe ao seu médico se você tem ou já teve problemas no fígado ou rins. Existem efeitos adversos associados ao uso deste medicamento, como visão turva, que podem afetar sua capacidade de dirigir e/ou operar máquinas. Não dirija ou opere máquinas até se sentir bem ou sua visão clarear. Este medicamento pode causar doping. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: informe ao médico se faz uso de algum outro medicamento, mesmo aqueles obtidos sem prescrição médica, inclusive outros colírios. Essa recomendação é particularmente importante se você estiver tomando medicamentos para reduzir a pressão arterial, para tratar uma doença cardíaca, diabetes ou depressão. Informe também se estiver tomando altas doses de ácido acetilsalicílico ou medicamentos à base de sulfas. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. 4. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? A dose usual é de 1 gota no(s) olho(s) afetado(s) pela manhã e à noite. Se estiver utilizando outros colírios, estes devem ser aplicados com intervalo de pelo menos 10 minutos. Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Na bula você encontra em detalhes a forma correta de administrar o produto. 5. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? Reações alérgicas localizadas ou generalizadas com diferentes graus de gravidade podem ocorrer e atingir tanto a pele quanto as vias respiratórias. Reações adversas muito comuns: (ocorre em mais de 10% dos usuários): queimação e ardência dos olhos, alteração de paladar. Comum: (1% a 10% dos pacientes): vermelhidão nos olhos ou ao redor deles, lacrimejamento, coceira, erosão da córnea, inchaço e/ou irritação nos olhos ou ao redor deles, redução da sensibilidade corneana, dor ocular, olhos secos, visão turva, dor de cabeça, sinusite, náusea, fraqueza/cansaço e fadiga. Incomum: (0,1% a 1%): tontura, depressão, inflamação da íris, distúrbios visuais, redução da frequência cardíaca, desmaio, dificuldade de respirar (dispneia) indigestão e cálculos renais. Outras reações raras de gravidade variada podem ocorrer (Vide Bula para informações completas). Informe a seu médico ou farmacêutico a ocorrência de qualquer reação adversa. 6. Uso Tópico Ocular – Uso adulto - Produto de venda sob prescrição médica.

GLALFITAL E DORZOLAMIDA + TIMOLOL SÃO MEDICAMENTOS. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

Material informativo exclusivo para a equipe de venda do medicamento