

Ezopen Aciclovir

(Antiviral)

O aciclovir é indicado para o tratamento de infecções cutâneas pelo vírus do herpes simplex, inclusive herpes genital e labial inicial e recorrente. Referência: Zovirax - Glaxosmithkline



Out/23

MS. 1.0370.0091 – Ezopen - Aciclovir creme 50mg/g bisnaga c/ 10g; MS. 1.0370.0610 Aciclovir creme 50mg/g bisnaga c/ 10g – “Medicamento genérico – Lei nº 9787-99”

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? Indicado para o tratamento de infecções na pele causadas pelo vírus Herpes simplex, incluindo herpes genital e labial, seja o primeiro episódio ou episódios que se repetem. 2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? É contraindicado em pacientes com conhecida alergia ao aciclovir, valaciclovir, propilenoglicol ou qualquer componente do medicamento. Não há contraindicação relativa à faixa etária. 3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Se você responder SIM a alguma das perguntas abaixo, avise seu médico antes de usar este medicamento. Você possui alguma doença que afete seu sistema imune? Você sofreu transplante de medula óssea? Você está grávida ou pretende ficar grávida? Você está amamentando? Você é alérgico a algum componente de aciclovir? Este medicamento não é recomendado para ser aplicado em mucosas, como boca, olhos ou vagina, pois pode causar irritação. Tome cuidado especial para evitar o contato do creme com os olhos. O uso de aciclovir durante a gravidez e lactação deve ser considerado apenas quando os benefícios forem maiores que os possíveis riscos para o feto. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Não foram identificadas interações significativas com medicamentos, alimentos ou exames laboratoriais. 4. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO: Não misture aciclovir com outros cremes ou loções. O aciclovir deve ser aplicado sobre as lesões já existentes ou lesões emergentes, preferencialmente no início da infecção. Adultos e crianças O aciclovir deve ser aplicado cinco vezes ao dia, em intervalos de aproximadamente quatro horas, pulando a aplicação no período noturno. O tratamento deve continuar por pelo menos quatro dias para herpes labial e por cinco dias para herpes genital. Se não ocorrer cicatrização, o tratamento deverá ser prolongado por mais cinco dias. Se as lesões permanecerem após 10 dias, o paciente deve consultar seu médico. 5. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? Como acontece com todos os medicamentos, aciclovir pode causar efeitos indesejáveis. Reações incomuns (ocorrem entre 0,1% e 1% dos pacientes): queimação ou ardência passageira; ressecamento leve e descamação da pele; coceira. Reação rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes): vermelhidão da pele e irritação. Reação muito rara (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento): reações de hipersensibilidade (alergia) incluindo angioedema, uma forma de alergia que leva ao inchaço de algumas partes da pele. 6. Uso tópico. Uso adulto e pediátrico. Venda sob prescrição médica.

ACICLOVIR/EZOPEN SÃO MEDICAMENTOS. SEU USO PODE TRAZER RISCOS.
PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.
“SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO”