

LANÇAMENTO

PREGABALINA





Cápsulas dura 75mg c/ 30 e 150mg c/ 30

"Medicamento Genérico Lei nº 9.787, de 1999".

"Material de divulgação exclusivo aos profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos".



MERCADO



- > O mercado total de Pregabalina vende em média 571 mil unidades por mês, resultando um faturamento de mais de 517,2 milhões de reais no último ano. Isto representa um crescimento de 28,18% em unidades e 30,17% em reais, se compararmos Julho/2020 com Julho/2019.

*MAT. Fonte: (Close Up RM – Julho /2020).

MERCADO




> Referente a concentração de 75mg c/30 vende mais de 366 mil unidades por mês, resultando um faturamento de 302 milhões de reais no período entre Julho/2019 – Julho/2020.


*MAT. Fonte: (Close Up RM – Julho /2020).

MERCADO

**Mercado Total - Pregabalina 150mg c/ 30
(MAT - Unids)**



**Mercado Total - Pregabalina 150 mg c/30 (MAT -
Reais)**



> Quanto a concentração de 150mg c/30 unidades faturou mais 98,3 milhões de reais e mais de 974 mil de unidades vendidas no último ano. Com uma evolução de 47,98% neste mesmo período, se considerarmos uma média mensal teremos mais de 81 mil unidades vendidas*.

*MAT. Fonte: (Close Up RM - Julho /2020).

COMPARATIVO DE PREÇOS*

PREGABALINA CÁPS. 75MG C/ 30

PRODUTO	LABORATÓRIO	20% PF	20% PMC	18% PF	18% PMC	17% PF	17% PMC	12% PF	12% PMC
DORENE	ACHE	R\$ 66,86	R\$ 92,43	R\$ 65,23	R\$ 90,18	R\$ 64,45	R\$ 89,10	R\$ 60,78	R\$ 84,02
INSIT	APSEN	R\$ 45,40	R\$ 62,77	R\$ 44,29	R\$ 61,23	R\$ 43,77	R\$ 60,50	R\$ 41,27	R\$ 57,06
PREFISS	FQM GRUPO	R\$ 64,60	R\$ 89,30	R\$ 63,02	R\$ 87,12	R\$ 62,26	R\$ 86,07	-	-
PREGABALINA	MEDLEY	R\$ 80,68	R\$ 114,54	R\$ 78,71	R\$ 108,81	R\$ 77,76	R\$ 107,50	R\$ 73,74	R\$ 101,39
PREGABALINA	MERCK	R\$ 72,62	R\$ 100,39	R\$ 70,85	R\$ 97,95	R\$ 70,00	R\$ 96,77	R\$ 66,02	R\$ 91,27
PREGABALINA	ACHE	R\$ 80,69	R\$ 111,55	R\$ 78,72	R\$ 108,83	R\$ 77,77	R\$ 107,51	R\$ 73,35	R\$ 101,40
PREGABALINA	MEDQUIMICA	R\$ 80,68	R\$ 111,53	R\$ 78,71	R\$ 108,81	R\$ 77,76	R\$ 107,50	R\$ 73,74	R\$ 101,40
PREGABALINA	TEUTO	R\$ 68,21	R\$ 94,30	R\$ 66,55	R\$ 92,00	R\$ 65,75	R\$ 90,90	R\$ 61,01	R\$ 85,73

Fonte: Revista Kairos Online/Agosto 2020

**Os preços contemplam apenas o período de Lançamento do Produto. Caso deseje os preços atualizados, consultar seu gerente ou consultor*

COMPARATIVO DE PREÇOS*

PREGABALINA CÁPS. 75MG C/ 30

PRODUTO	LABORATÓRIO	18% PF	DIF %	DIF R\$
DORENE	ACHE	R\$ 65,23	-2,02%	-R\$ 1,32
INSIT	APSEN	R\$ 44,29	-50,26%	-R\$ 22,26
PREFISS	FQM GRUPO	R\$ 63,02	-5,60%	-R\$ 3,53
PREGABALINA	MEDLEY	R\$ 78,71	15,45%	R\$ 12,16
PREGABALINA	MERCK	R\$ 70,85	6,07%	R\$ 4,30
PREGABALINA	ACHE	R\$ 78,72	15,46%	R\$ 12,17
PREGABALINA	MEDQUIMICA	R\$ 78,71	15,45%	R\$ 12,16
PREGABALINA	TEUTO	R\$ 66,55		

**Os preços contemplam apenas o período de Lançamento do Produto. Caso deseje os preços atualizados, consultar seu gerente ou consultor*

COMPARATIVO DE PREÇOS*

PREGABALINA CÁPS. 75MG C/ 30

PRODUTO	LABORATÓRIO	18% PMC	DIF %	DIF R\$
DORENE	ACHE	R\$ 90,18	-2,02%	-R\$ 1,82
INSIT	APSEN	R\$ 61,23	-50,25%	-R\$ 30,77
PREFISS	FQM GRUPO	R\$ 87,12	-5,60%	-R\$ 4,88
PREGABALINA	MEDLEY	R\$ 108,81	15,45%	R\$ 16,81
PREGABALINA	MERCK	R\$ 97,95	6,07%	R\$ 5,95
PREGABALINA	ACHE	R\$ 108,83	15,46%	R\$ 16,83
PREGABALINA	ACHE	R\$ 108,81	15,45%	R\$ 16,81
PREGABALINA	TEUTO	R\$ 92,00		

**Os preços contemplam apenas o período de Lançamento do Produto. Caso deseje os preços atualizados, consultar seu gerente ou consultor*

COMPARATIVO DE PREÇOS*

PREGABALINA CÁPS. 150MG C/ 30

PRODUTO	LABORATÓRIO	20% PF	20% PMC	18% PF	18% PMC	17% PF	17% PMC	12% PF	12% PMC
DORENE	ACHE	R\$ 102,55	R\$ 141,77	R\$ 100,05	R\$ 138,31	R\$ 98,84	R\$ 136,64	R\$ 93,23	R\$ 128,89
INSIT	APSEN	R\$ 95,12	R\$ 131,49	R\$ 92,81	R\$ 128,31	R\$ 91,69	R\$ 126,76	R\$ 86,49	R\$ 119,56
PREFISS	FQM GRUPO	R\$ 99,07	R\$ 136,96	R\$ 96,66	R\$ 133,62	R\$ 95,49	R\$ 132,01	-	-
PREGABALINA	MEDLEY	R\$ 113,63	R\$ 157,09	R\$ 110,85	R\$ 153,24	R\$ 109,52	R\$ 151,40	R\$ 103,30	R\$ 142,81
PREGABALINA	MERCK	R\$ 111,35	R\$ 153,93	R\$ 108,63	R\$ 150,17	R\$ 107,33	R\$ 148,38	R\$ 101,23	R\$ 139,94
PREGABALINA	TEUTO	R\$ 102,40	R\$ 141,56	R\$ 99,90	R\$ 138,11	R\$ 98,70	R\$ 136,45	R\$ 93,09	R\$ 93,09

Fonte: Revista Kairos Online/Agosto 2020

**Os preços contemplam apenas o período de Lançamento do Produto. Caso deseje os preços atualizados, consultar seu gerente ou consultor*

COMPARATIVO DE PREÇOS*

PREGABALINA CÁPS. 150MG C/ 30				
PRODUTO	LABORATÓRIO	18% PF	DIF %	DIF R\$
DORENE	ACHE	R\$ 100,05	0,15%	R\$ 0,15
INSIT	APSEN	R\$ 92,81	-7,64%	-R\$ 7,09
INSIT	APSEN	R\$ 96,66	-3,35%	-R\$ 3,24
PREGABALINA	MEDLEY	R\$ 110,85	9,88%	R\$ 10,95
PREGABALINA	MERCK	R\$ 108,63	8,04%	R\$ 8,73
PREGABALINA	TEUTO	R\$ 99,90		

**Os preços contemplam apenas o período de Lançamento do Produto. Caso deseje os preços atualizados, consultar seu gerente ou consultor*

COMPARATIVO DE PREÇOS*

PREGABALINA CÁPS. 150MG C/ 30				
PRODUTO	LABORATÓRIO	18% PMC	DIF %	DIF R\$
DORENE	ACHE	R\$ 138,31	0,14%	R\$ 0,20
INSIT	APSEN	R\$ 128,31	-7,64%	-R\$ 9,80
INSIT	APSEN	R\$ 133,62	-3,36%	-R\$ 4,49
PREGABALINA	MEDLEY	R\$ 153,24	9,87%	R\$ 15,13
PREGABALINA	MERCK	R\$ 150,17	8,03%	R\$ 12,06
PREGABALINA	TEUTO	R\$ 138,11		

**Os preços contemplam apenas o período de Lançamento do Produto. Caso deseje os preços atualizados, consultar seu gerente ou consultor*

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Condições especiais de lançamento, consulte seu gerente ou consultor.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

pregabalina

Medicamento Genérico Lei nº 9.787, de 1999.

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

A pregabalina é indicada para adultos para: tratamento da dor neuropática (dor devido à lesão e/ou mau funcionamento dos nervos e/ou do sistema nervoso) em adultos; como terapia adjunta das crises epilépticas parciais (convulsões), com ou sem generalização secundária em adultos; tratamento do Transtorno de Ansiedade Generalizada em adultos; controle de fibromialgia (doença caracterizada por dor crônica em várias partes do corpo, cansaço e alterações do sono) em adultos.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

A pregabalina age regulando a transmissão de mensagens excitatórias entre as células nervosas. O início da ação do medicamento é, geralmente, percebido cerca de uma semana após o início do tratamento.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Leia também as questões 4 e 8.

A pregabalina não deve ser utilizada se você tem hipersensibilidade (alergia) conhecida à pregabalina ou a qualquer componente da fórmula.

Este medicamento é contraindicado para menores de 18 anos.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Leia também as questões 3 e 8.

Informe ao seu médico se você tiver: (1) problemas hereditários (herdados da família) de intolerância a galactose, deficiência de lactase de Lapp ou má-absorção de alimentos; pois ele precisa avaliar se a pregabalina deve ser usada nessas situações; (2) diabetes, pois pode haver necessidade de controlar mais de perto seu

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

peso e a dose das medicações para tratar a doença; (3) doenças renais, pois a dose de pregabalina pode precisar de ajustes; (4) insuficiência cardíaca congestiva (doença em que o coração não consegue bombear o sangue adequadamente), pois houve casos de piora dos sintomas associado ao uso da pregabalina.

O uso da pregabalina está associado com tontura e sonolência, que pode aumentar a ocorrência de acidentes (como por exemplo, quedas) em idosos. Você deve ter cuidado até que os efeitos potenciais da pregabalina lhe sejam familiares. Pelo mesmo motivo, a habilidade de dirigir e operar máquinas pode estar prejudicada. É aconselhável não dirigir, operar máquinas complexas, nem exercer outras atividades potencialmente perigosas até que se saiba se este medicamento afeta a sua capacidade de realizar tais atividades.

Houve relatos no período pós-comercialização de reações de hipersensibilidade, incluindo casos de angioedema. A pregabalina deve ser descontinuada imediatamente se ocorrerem sintomas de angioedema, tais como inchaço na face, ao redor da boca e nas vias aéreas superiores.

Na experiência pós-comercialização, visão borrada transitória e outras alterações na capacidade visual foram reportadas por pacientes tratados com pregabalina. A descontinuação do medicamento pode resultar na resolução ou melhora desses sintomas visuais.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Não há dados suficientes sobre o uso da pregabalina em mulheres grávidas. O risco potencial aos fetos humanos é desconhecido. Portanto, a pregabalina não deve ser utilizada durante a gravidez, a menos que o benefício à mãe justifique claramente o risco potencial ao feto, uma decisão que deve ser tomada em conjunto com seu médico; portanto se durante o tratamento com a pregabalina você engravidar, comunique imediatamente a ele. Se você tem potencial de engravidar, deve utilizar métodos contraceptivos eficazes.

Não é recomendado que mulheres que estejam amamentando usem pregabalina, pois a medicação é excretada (sai) no leite materno. Sempre avise ao seu médico

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

todas as medicações que você toma quando ele for prescrever uma medicação nova.

No momento da interrupção do uso da pregabalina foram observados em alguns pacientes a ocorrência de insônia, dor de cabeça, enjoos, ansiedade, aumento da sudorese (transpiração), diarreia, síndrome gripal, depressão, dor, convulsão e tontura (vide item 8. Quais os males que este medicamento pode me causar?). As convulsões, incluindo estado epilético e convulsões do tipo grande mal, podem ocorrer durante o uso ou logo após a descontinuação da pregabalina.

O médico precisa avaliar se as medicações reagem entre si alterando a sua ação, ou da outra; isso se chama interação medicamentosa.

A pregabalina pode potencializar o efeito da oxicodona (analgésico), bebidas alcoólicas e de lorazepam (tranquilizante). Quando usado com analgésicos opioides pregabalina pode reduzir o funcionamento intestinal (por ex, obstrução intestinal, constipação – intestino preso ou prisão de ventre). Em experiência pós-comercialização, houve relatos de insuficiência respiratória, coma e morte em pacientes sob tratamento da pregabalina e outros medicamentos depressores do Sistema Nervoso Central, inclusive em pacientes que abusam da substância.

Se ocorrerem quaisquer sintomas relacionados ao uso deste medicamento, seu médico deve ser consultado. Aconselha-se precaução quando se prescreve pregabalina concomitantemente com opiáceos devido ao risco de depressão do SNC.

Ao perceber sinais ou comportamentos suicidas (pensamento ou ideia de se matar) em pacientes usando pregabalina, busque ajuda médica.

A segurança e eficácia da substância pregabalina não foram estabelecidas em pacientes adolescentes (12 a 17 anos) para as indicações aprovadas (incluindo epilepsia).

Foram relatados casos de encefalopatia, principalmente em pacientes pré-dispostos à encefalopatia.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?
CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C). PROTEGER DA LUZ E UMIDADE.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem. Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Características do medicamento:

-pregabalina 75mg: Pó de cor branco a quase branco. Cápsula gelatinosa dura, tamanho 4, de cor branco/ marrom.

-pregabalina 150mg: Pó de cor branco a quase branco. Cápsula gelatinosa dura, tamanho 2, de cor branco/ branco.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

A pregabalina deve ser utilizada por via oral (engolir), com ou sem alimentos. As doses recomendadas da pregabalina são: (1) Dor neuropática, Transtorno da Ansiedade Generalizada e Epilepsia – 150 a 600mg/dia divididos em 2 doses; (2) Fibromialgia: 150 a 450mg/dia divididos em 2 doses. Em todas as indicações, a dose inicial recomendada é 75mg, via oral, 2 vezes ao dia (150mg/dia). Entretanto, com base na resposta individual e na tolerabilidade do paciente, a dose poderá ser aumentada para 150mg 2 vezes ao dia após um intervalo de 3 a 7 dias e, se necessário, até uma dose máxima – descrita acima por indicação – 2 vezes ao dia após o mesmo intervalo. A eficácia da pregabalina foi observada já na primeira semana de tratamento. A decisão de aumentar ou diminuir a dose é exclusiva do

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

médico, não o faça sem a orientação dele. Pacientes com insuficiência ou algum comprometimento da função dos rins podem necessitar de ajustes na dosagem da pregabalina. Também em idosos recomenda-se avaliar a função dos rins para verificar se esses ajustes precisam ser feitos. A adequação da dosagem para estas situações deve ser instruída pelo seu médico (para pacientes com insuficiência renal, a dose inicial deve partir de 25mg).

Recomenda-se que a descontinuação do tratamento com a pregabalina seja feita gradualmente, ao longo de 1 semana. A descontinuação do tratamento deve ser feita sob indicação e supervisão do seu médico.

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Este medicamento não pode ser partido, aberto ou mastigado.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso você esqueça-se de tomar a pregabalina no horário estabelecido pelo seu médico, tome-a assim que lembrar. Entretanto, se já estiver perto do horário de tomar a próxima dose, pule a dose esquecida e tome a próxima, continuando normalmente o esquema de doses recomendado pelo seu médico. Neste caso, não tome o medicamento 2 vezes para compensar doses esquecidas. Se você esquecer uma dose, você pode comprometer o resultado do tratamento.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Leia as questões 3 e 4.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

As reações adversas mais frequentemente notificadas foram tontura e sonolência; em geral, elas foram de intensidade leve a moderada e estão listadas abaixo.

Reação Muito Comum (ocorre em mais de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento):

dor de cabeça*.

Reação Comum (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento):

nasofaringite (inflamação da faringe ou garganta), aumento do apetite, euforia, confusão, irritabilidade, depressão, desorientação, insônia (dificuldade para dormir), diminuição da libido (diminuição do desejo sexual), ataxia (dificuldade em coordenar os movimentos), coordenação anormal, tremores, disartria (alteração da fala), amnésia (perda de memória), dificuldade de memória, distúrbios de atenção, parestesia (formigamentos), hipoestesia (diminuição da sensibilidade), sedação (diminuição do nível de vigília ou alerta), transtorno de equilíbrio, letargia (lentidão), visão turva, diplopia (visão dupla), vertigem, vômitos, constipação (intestino preso), flatulência (excesso de gases), distensão abdominal, boca seca, câibra muscular, artralgia (dor nas articulações), dor lombar, dor nos membros, espasmo cervical, edema periférico (inchaço de extremidades), edema (inchaço), marcha (caminhada) anormal, quedas, sensação de embriaguez, sensação anormal, cansaço, aumento de peso, náusea* (enjoo), diarreia*.

Reação Incomum (ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento):

neutropenia (diminuição de um tipo de células de defesa no sangue: neutrófilos), anorexia (apetite diminuído), hipoglicemia (diminuição da glicose no sangue), alucinações, inquietação, agitação, humor deprimido, humor elevado, mudanças de humor, despersonalização (mudança na forma como a pessoa percebe a si mesma), sonhos anormais, dificuldade de encontrar palavras, aumento da libido (aumento do desejo sexual), anorgasmia (incapacidade de ter orgasmos), síncope (desmaio), mioclonia (contração muscular), hiperatividade (agitação) psicomotora, discinesia, hipotensão postural (diminuição da pressão arterial ao levantar), tremor

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

de intenção (tremor que ocorre ao movimento), nistagmo (movimento anormal dos olhos), transtornos cognitivos (dificuldade de compreensão), transtornos de fala, hiporreflexia (reflexos enfraquecidos), hiperestesia (aumento da sensibilidade), sensação de queimação, perda da visão periférica, alteração visual, inchaço ocular, deficiência no campo visual, redução da acuidade visual, dor ocular, astenopia (cansaço visual), fotopsia (sensação de ver luzes e cores cintilantes), olhos secos, aumento do lacrimejamento, irritação ocular, hiperacusia (aumento da audição), taquicardia (aumento da frequência cardíaca), bloqueio atrioventricular de primeiro grau (tipo de arritmia cardíaca), bradicardia sinusal (diminuição dos batimentos cardíacos) hipotensão arterial (pressão baixa), hipertensão arterial (pressão alta), ondas de calor, rubores (vermelhidões), frio nas extremidades, dispneia (falta de ar), epistaxe (sangramento nasal), tosse, congestão nasal, rinite, ronco, refluxo gastroesofágico (retorno do conteúdo do estômago para o esôfago), hipersecreção salivar, hipoestesia oral (diminuição da sensibilidade na boca), erupções cutâneas papulares (pequenas elevações na pele), urticária (alergia na pele), sudorese (transpiração), inchaço articular, mialgia (dor muscular), espasmo muscular (contração involuntária dos músculos), dor cervical, rigidez muscular, incontinência urinária (dificuldade em controlar a urina), disúria (dificuldade e dor para urinar), disfunção erétil (dificuldade para enrijecer o pênis), disfunção sexual, retardo na ejaculação, dismenorreia, edema (inchaço) generalizado, aperto no peito, dor, pirexia (febre), sede, calafrio, astenia (fraqueza), aumento das enzimas: alanina aminotransferase, creatina fosfoquinase sanguínea e aspartato aminotransferase, elevação da glicose sanguínea, diminuição da contagem de plaquetas, diminuição do potássio sanguíneo, diminuição de peso, hipersensibilidade*, perda de consciência*, prejuízo psíquico*, inchaço da face*, coceira*, mal-estar*, agressividade*.

Reação Rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento):

crise de pânico, desinibição, apatia (ausência de emoção), estupor, parosmia (distúrbio do olfato),

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

hipocinesia (movimento diminuído), ageusia (falta de paladar), disgrafia (dificuldade em escrever), oscilopsia (visão oscilante), percepção visual de profundidade alterada, midríase (pupila dilatada), estrabismo, brilho visual, taquicardia sinusal, arritmia (irregularidade do batimento cardíaco) sinusal, aperto na garganta, secreta nasal, ascite (acúmulo de líquido no abdome), pancreatite (inflamação no pâncreas), disfagia (dificuldade na deglutição), suor frio, rabdomiólise (destruição de células dos músculos), insuficiência renal (diminuição das funções dos rins), oligúria (diminuição do volume de urina), dor mamária (dor na mama), amenorreia (ausência de menstruação), secreção mamária, ginecomastia (aumento da mama, geralmente sexo masculino), diminuição de leucócitos (glóbulos brancos), elevação da creatinina sanguínea, angioedema* (reação alérgica que cursa com inchaço), reação alérgica*, ceratite* (inflamação na córnea), insuficiência cardíaca congestiva* (alteração na capacidade do coração em bombear o sangue, edema pulmonar* (retenção de líquidos no pulmão), edema (inchaço) de língua*, retenção urinária* (dificuldade em urinar), ginecomastia* (aumento da mama), ideação suicida* (pensamento ou ideia de se matar).

*Reações relatadas no período pós-comercialização.

Atenção: este produto é um medicamento que possui nova concentração no país e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer eventos adversos imprevisíveis ou desconhecidos. Nesse caso, informe seu médico.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Os eventos adversos mais comuns quando houve uma superdose de pregabalina incluem distúrbio afetivo, sonolência, confusão, depressão, agitação e inquietação. Convulsões também foram relatadas. O tratamento da superdose com pregabalina deve incluir medidas gerais de suporte, podendo ser necessária hemodiálise (filtração do sangue usando máquinas). No caso de superdose, procure um médico imediatamente.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DE RECEITA

\$UCE\$\$O E BOA\$ VENDA\$!!!

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E MERCADOS



SE É TEUTO,
É DE CONFIANÇA

Ficha: PREGABALINA 75MG (C1) CAPS C/30 GENCód. do produto **7213**OBS: **Lançamento!!!**Classe **GF**Denominação genérica **Pregabalina**Apresentação **Cápsulas dura 75mg c/ 30**Restrição de uso **VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA
SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA**Via de administração **Uso Oral**Nº de MS **1.0370.0589.005-1**Cód. de Barras **7896112172130**Cód da Caixa de Embarque **301384**Quant. de unidades por CE. **50 unidades**Dimensões da CE. **CX/EMB 02B 265X165X216**Faca/Dimensões da Cartoagem **Faca 22 50x30x105mm**Classe Terapêutica **Anticonvulsivo e antiepilético**Tipo de Tarja **Tarja Vermelha**

	ICMS	12%	17%	17,5%	18%	19%	20%
Aliquotas	Preço Fábrica	R\$ 61,01	R\$ 65,75	R\$ 66,15	R\$ 66,55	R\$ 67,37	R\$ 68,21
	Preço Consumidor	R\$ 85,73	R\$ 90,90	R\$ 91,45	R\$ 92,00	R\$ 93,14	R\$ 94,30

Referência **Lyrica - Pfizer**

Composição

Cada cápsula dura de 75mg contém:
pregabalina..... 75 mg
Excipiente q.s.p..... 1 cápsula
Excipientes: lactose monoidratada, amido e talco.

Embalagem Primária **Blister de PVDC Cristal 250/120**Classificação fiscal **30049039**Lista PIS/Confins **Positivo (0,00%)**IPI **0%**Validade **24 meses**Peso unitário **0,024 Kg**Peso por Cx. de Embarque **1,200 Kg****Sucesso e
Boas Vendas!!!**

Ficha: PREGABALINA 150MG (C1) CAPS C/30 GENCód. do produto **7220**OBS: **Lançamento!!!**Classe **GF**Denominação genérica **Pregabalina**Apresentação **Cápsulas dura 150mg c/ 30**Restrição de uso **VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA
SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA**Via de administração **Uso Oral**Nº de MS **1.0370.0589.012-2**Cód. de Barras **7896112172208**Cód da Caixa de Embarque **301384**Quant. de unidades por CE. **50 unidades**Dimensões da CE. **CX/EMB 02B 265X165X216**Faca/Dimensões da Cartonagem **Faca 22 50x30x105mm**Classe Terapêutica **Anticonvulsivo e antiepilético**Tipo de Tarja **Tarja Vermelha**

	ICMS	12%	17%	17,5%	18%	19%	20%
Aliquotas	Preço Fábrica	R\$ 93,09	R\$ 98,70	R\$ 99,29	R\$ 99,90	R\$ 101,13	R\$ 102,40
	Preço Consumidor	R\$ 128,69	R\$ 136,45	R\$ 137,26	R\$ 138,11	R\$ 139,81	R\$ 141,56

Referência **Lyrice - Pfizer**

Composição

Cada cápsula dura de 150mg contém:
pregabalina.....150 mg
Excipiente q.s.p.....1 cápsula
Excipientes: lactose monoidratada, amido e talco.

Embalagem Primária **Blister de PVDC Cristal 250/120**Classificação fiscal **30049039**Lista PIS/Confins **Positivo (0,00%)**IPI **0%**Validade **24 meses**Peso unitário **0,024 kg**Peso por Cx. de Embarque **1,20 Kg**

Sucesso e Boas Vendas!!!