



SE É TEUTO,  
É DE CONFIANÇA

# Brimonidina

Este medicamento é indicado no tratamento de pacientes com glaucoma de ângulo aberto ou pressão ocular elevada (pressão aumentada dentro dos olhos). Referência: Alphagan- Allergan



NOV/20

ML 1.0170.0713.010-8 – Tartarato de Brimonidina – Solução oftálmica 2mg/mL – Frasco de 5mL – “Medicamento Genérico – Lei nº 9.787/99”

**PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?** Tratamento de glaucoma de ângulo aberto ou pressão intraocular elevada. **2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?** É uma solução oftálmica que age reduzindo a pressão dentro dos olhos. **3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?** É contraindicado para pessoas que apresentem alergia a qualquer componente da fórmula, pacientes em tratamento com medicamentos inibidores da MAO e para menores de 2 anos de idade. **4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?** **ADVERTÊNCIAS:** Para não contaminar o colírio evite o contato da ponta das gotas com qualquer superfície, inclusive os olhos. Deve ser usado com cautela em pessoas com doenças cardiovasculares graves, depressão, insuficiência cerebral ou coronária, hipertensão ortostática entre outras, que o médico saiba identificar; reações de hipersensibilidade ocular também foram relatadas com alguns relatos de aumento na pressão intraocular. **PRECAUÇÕES:** Estudos realizados em animais demonstram que a brimonidina é excretada no leite. A decisão de desmamar e amamentação ou o uso do medicamento deverá ser tomada pelo médico. Este medicamento não deve ser usado por grávidas sem orientação médica. Crianças de 2 anos ou mais, especialmente as com peso até 20kg, devem ser tratadas com cautela e monitoradas devido à alta incidência e severidade de sonolência. Não foram observadas diferenças de eficácia e segurança entre os sexos. Tire as lentes de contato antes de aplicar o medicamento e aguarde por 15 minutos para colocá-las. Se for utilizar outros colírios, aguarde um intervalo de 5 minutos entre a aplicação de cada medicamento. Avise o médico se você tiver problemas de rim ou fígado. Brimonidina pode causar fadiga, sonolência, visão borrada ou entorpecida e pode levar a diminuição na capacidade de alerta. Você deve esperar o desaparecimento destes sintomas antes de dirigir ou operar máquinas. **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** Informe o médico se estiver utilizando algum dos seguintes medicamentos: álcool, barbitúricos, opiáceos, sedativos, anestésicos e antidepressivos. Informe ao médico se você está fazendo uso de outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?** CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C). PROTEGER DA LUZ E UMIDADE. Características do medicamento: Solução límpida de cor amarelada a amarelo-esverdeada. Observe a validade na embalagem. Todo medicamento deve ser inserido fora do alcance das crianças. **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?** Use exclusivo nos olhos. Aplicar o número de gotas recomendado pelo médico em um ou ambos os olhos. A dose usual é de 1 gota por olho afetado, de 8 em 8 h. Siga as orientações do médico e instruções da bula. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do médico. **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?** Retorne a utilização assim que lembrar, seguindo os intervalos de horários entre as aplicações até o final do dia. No dia seguinte, retorne os horários regulares. Em caso de dúvida, procure orientação do farmacêutico ou do médico. **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?** Reação muito comum (ocorre em mais de 10% dos pacientes): dor de cabeça, boca seca, fadiga, vertigem, coceira, pontada e ardor nos olhos, visão borrada, reações alérgicas oculares. Reação comum (entre 1% e 10%): tosse, sintomas no trato respiratório superior, sintomas gastrointestinais, eritema da címea, fotofobia, dor e secura nos olhos, inflamação ou edema na pálpebra ou na conjuntiva, visão anormal. Reação incomum (entre 0,1% e 1%): palpitações, secura no nariz, depressão, reações alérgicas. Outras reações adversas relatadas: inflamação da íris, contração da pupila, conjuntivite, dermatite. Informe ao médico ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis. Informe também se encontra abastado do seu serviço de atendimento. **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?** Em casos de overdose oftálmica, lave bem os olhos com solução fisiológica. Em caso de ingestão, o evento adverso relatado até o momento foi hipertensão. Nesses casos, o médico deve ser consultado imediatamente e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 8881, se você precisar de mais orientações.

PRODUTO DE VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. TARTARATO DE BRIMONIDINA É UM MEDICAMENTO.

“SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.”

DURANTE SEU USO, NÃO DIRIJA VEÍCULOS OU OPERE MÁQUINAS, POIS SUA AGILIDADE E ATENÇÃO PODEM ESTAR PREJUDICADAS.