



cetoconazol dipropionato de betametasona



Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999.

APRESENTAÇÃO

Pomada dermatológica 20mg/g+0,5mg/g
Embalagem contendo 1 bisnaga com 30g.

USO DERMATOLÓGICO USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada grama da pomada dermatológica contém:
cetoconazol.....20mg
dipropionato de betametasona (equivalente a 0,5mg de
betametasona).....0,64mg
Excipiente q.s.p.....1g
Excipientes: lanolina, propilparabeno, petrolato líquido
e petrolato branco.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Este medicamento é destinado ao tratamento de
micoses (doenças inflamatórias da pele) que foram

afetadas ou possam ser afetadas por fungos ou
leveduras.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O cetoconazol + dipropionato de betametasona é um
medicamento para ser aplicado na pele. Age como anti-
inflamatório (combate a inflamação) e contra a micose:
infecção fúngica da pele que pode estar associada a
inflamação.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

O cetoconazol + dipropionato de betametasona não
deve ser usado em pacientes que apresentem alergia a
quaisquer componentes do medicamento.

Este medicamento não deve ser utilizado em
determinadas infecções da pele, tais como: varicela
(catapora), herpes simples ou zoster, tuberculose
cutânea ou sífilis cutânea. Procure orientação médica
caso você tenha alguma destas doenças antes de usar o
medicamento.

**Este medicamento não deve ser utilizado por
mulheres grávidas sem orientação médica ou do
cirurgião-dentista.**

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Durante o tratamento com cetoconazol + dipropionato
de betametasona, você não deve usar cosméticos sobre a
área da pele tratada.

Se ocorrer irritação no local onde o produto foi
aplicado, procure orientação médica, pois somente o
médico poderá avaliar a evolução do tratamento e
decidir quando e como o tratamento deve ser
descontinuado.

**Este medicamento não deve ser utilizado por
mulheres grávidas sem orientação médica ou do
cirurgião-dentista.**

Este medicamento não deve ser usado durante a
amamentação, exceto sob orientação médica.

**O uso deste medicamento no período da lactação
depende da avaliação e acompanhamento do seu
médico ou cirurgião-dentista.**

Este medicamento não deve ser usado em áreas
extensas, em grande quantidade e por períodos maiores
que 2 semanas.

Em crianças menores de 12 anos, devem ser utilizadas
pequenas quantidades de cetoconazol + dipropionato de
betametasona.

Adultos e crianças não devem usar mais que 45 gramas
por semana.

Não há contraindicação relativa a idade (faixas etárias).
Não existe prova suficiente de que outros
medicamentos causem modificações importantes no
efeito habitual deste medicamento, ou seja, que
interajam com cetoconazol + dipropionato de
betametasona. Porém, podem surgir algumas interações
com certos medicamentos, se utilizados durante o
tratamento com cetoconazol + dipropionato de
betametasona, dentre eles estão medicamentos



prejudiciais ao fígado, ciclosporinas; famotidina;
isoniazida; rifampicina; fenitoína; terfenadina;
indinavir; saquinavir; ritonavir e/ou cisaprida,
anticoagulantes tais como: dicumarol.

Evite a ingestão de bebida alcoólica durante o
tratamento.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você
está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Não use medicamento sem o conhecimento do seu
médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

ARMAZENAR EM TEMPERATURA AMBIENTE
(15 A 30°C). PROTEGER DO CALOR.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide
embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade
vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

Características do medicamento: Pomada de cor
branca que pode apresentar porções contendo líquido
incolor.

Informamos que na composição do produto há óleos de
consistência pastosa e líquida. Dependendo das
condições em que o produto é estocado ou transportado,
passando por mudanças drásticas da temperatura em um
curto período de tempo, pode ocasionar separação
desses óleos ou ainda o óleo de consistência pastosa
pode estar parcialmente líquido, então, dessa forma ao
abrir o produto pode haver escoamento de um líquido



incolor. Se isso ocorrer, o produto poderá ser utilizado normalmente. Informamos que a qualidade do produto não foi afetada.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento deve ser utilizado apenas sob orientação médica.

A via de administração é a pele (uso tópico).

O produto deve ser aplicado somente na pele. Não usar de outra maneira (por via de administração não recomendada), pois pode causar riscos. Aplicação em outras áreas que não seja a pele, como por exemplo, os olhos e mucosas (boca, vagina e anus) pode causar reações adversas (efeitos não desejados) e não trazer benefícios.

Aplique uma fina camada da pomada sobre a área afetada da pele, 1 vez ao dia. Em casos mais graves ou conforme orientação médica, pode ser necessária a aplicação 2 vezes ao dia.

O cetoconazol + dipropionato de betametasona não deve ser utilizado por períodos maiores que 2 semanas.



Em crianças menores de 12 anos, devem ser usadas pequenas quantidades deste medicamento.

Adultos e crianças não devem utilizar mais que 45

gramas por semana.

Instruções para abrir a bisnaga:

1. Para sua segurança, esta bisnaga está bem lacrada. Esta embalagem não requer o uso de objetos cortantes.
2. Agite a bisnaga antes de perfurar o lacre, visando diminuir a pressão de ar no momento de abertura.
3. Retire a tampa da bisnaga (fig. 1).
4. Com a parte pontiaguda superior da tampa perfure o lacre da bisnaga (fig. 2).



Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Retomar o tratamento até o alívio dos sinais e sintomas da doença.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

A literatura cita as seguintes reações adversas, sem frequência conhecidas:

Ardência, coceira, irritação, ressecamento, foliculites (são infecções bacterianas que se iniciam no folículo piloso, podendo acometer qualquer área com pelos, inclusive o couro cabeludo), hipertricose (desenvolvimento anormal de pelos numa região que não os tem ou que normalmente só apresenta uma penugem), dermatite perioral, maceração cutânea, infecção secundária, atrofia cutânea, dermatite de contato, miliária e/ou estrias.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

A aplicação exagerada sobre a pele pode levar à vermelhidão, inchaço e sensação de queimação que desaparecerão quando o tratamento for suspenso (descontinuado). Em caso de uso excessivo e/ou ingestão acidental, cuidados devem ser tomados, tais como: entrar imediatamente em contato com seu médico ou procurar um pronto-socorro, informando a quantidade utilizada, horário da utilização e os sintomas.

Em caso de uso de grande quantidade deste

medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

Registro nº 1.0370.0496

Farm. Resp.: Andreia Cavalcante Silva

CRF-GO nº 2.659

Registrado e produzido por:

**LABORATÓRIO TEUTO
BRASILEIRO S/A.**

CNPJ - 17.159.229/0001-76

VP 7-D Módulo 11 Qd. 13 - DAIA

CEP 75132-140 - Anápolis - GO

SAC | 0800 62 18 001
teuto.com.br



VENDA SOB PRESCRIÇÃO

Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela Anvisa em 15/05/2023.