

Bepeben

(Antibiótico Penicilínico)

A benzilpenicilina (penicilina G) exerce ação bactericida durante o estágio de multiplicação ativa dos microrganismos sensíveis. Atua por inibição da biossíntese do mucopeptídeo da parede celular.



Outubro/2021
MS. 1.0370.0100 – Benzilpenicilina benzatina - Pó para solução injetável 600.000 UI ou 1.200.000 UI com 50 frascos-ampolas sem diluente

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? Indicado no tratamento de infecções por germes sensíveis à penicilina G, que sejam suscetíveis aos níveis séricos baixos, porém muito prolongados, característicos desta forma de dosificação. A terapia deverá ser orientada por estudos bacteriológicos e pela resposta clínica. 2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Contra-indicado para pacientes com alergia às penicilinas ou a qualquer componente da fórmula. 3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS: PRECAUÇÕES: Bepeben deve ser usado com cautela em indivíduos com história de alergia intensa e/ou asma. Reações de hipersensibilidade sérias e até fatais foram registradas em pacientes sob tratamento com penicilinas. Indivíduos com história de hipersensibilidade a múltiplos alérgenos são mais suscetíveis a estas reações. É necessário evitar-se a injeção intra-arterial ou intravenosa, ou junto a grandes troncos nervosos, uma vez que tais injeções podem produzir lesões neurovasculares sérias, incluindo mielite transversa com paralisia permanente, gangrena requerendo amputação de dígitos e porções mais próximas das extremidades, necrose ao redor do local da injeção. O uso de antibióticos poderá resultar em proliferação de microrganismos resistentes. Se aparecerem novas infecções por bactérias ou fungos durante a terapia, deve-se tomar medidas apropriadas. Em infecções estreptocócicas, o tratamento deve ser suficiente para eliminar os microrganismos, caso contrário, as sequelas da doença estreptocócica poderão surgir. Deve-se realizar culturas ao término do tratamento para determinar se os estreptococos foram totalmente erradicados. Em tratamentos prolongados com penicilinas, particularmente em altas doses, recomenda-se avaliações periódicas das funções renal e hematopoiética. As penicilinas atravessam a placenta e ainda sejam consideradas seguras para o uso durante a gravidez, Bepeben deve ser usado somente quando necessário, segundo critério médico. Não deve ser utilizado durante a gravidez e a amamentação, exceto sob orientação médica. Não há contra-indicação relativa a faixas etárias. Informe ao médico se você está fazendo uso de algum outro medicamento. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: A probenecida diminui a taxa de excreção das penicilinas, assim como prolonga e aumenta os níveis sanguíneos. 4. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Recomenda-se injeção intramuscular profunda, no quadrante superior externo da região glútea. Em crianças pequenas, pode ser preferível a face lateral da coxa. Recomenda-se não administrar mais que 4mL em um mesmo local de aplicação. Para doses repetidas, variar o local da injeção. Devido às altas concentrações da suspensão deste produto, a agulha poderá entupir caso a administração não seja feita de forma lenta e contínua. O medicamento, após reconstituído, deverá ser ressuspenso e aplicado em até 2 minutos, evitando assim possível sedimentação do pó na seringa (deve-se utilizar agulha 30x8 ou 25x8). Seu preparo e aplicação deverão ser imediatos. Em muitos casos Bepeben é utilizado em aplicação única com doses de vão desde 300.000 UI até 2.400.000 UI. No tratamento da Sífilis tardia e na prevenção da Glomerulonefrite ou febre reumática são necessários esquema posológicos diferenciados que o médico irá determinar. Siga rigorosamente as orientações médicas, respeitando as doses e a duração do tratamento. 5. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR? As penicilinas possuem baixa toxicidade, mas com índice significativo de sensibilização. As seguintes reações de hipersensibilidade, associadas com o uso de penicilina, foram relatadas: erupções cutâneas; urticária; edema de laringe; reações semelhantes a doença do soro, incluindo febre, calafrios, edema, artralgia e prostração. Febre e eosinofilia podem ser as únicas manifestações observadas. Reações anafiláticas intensas têm sido relatadas. Reações como anemia hemolítica, leucopenia, trombocitopenia, neuropatia e nefropatia são infrequentes e estão associadas com altas doses de penicilina por via parenteral. Como com outros tratamentos para sífilis, casos de ocorrência de reações de Jarisch-Herxheimer foram relatados. As penicilinas podem interferir com a medida da glicosúria realizada pelo método do sulfato de cobre, ocasionando falsos resultados de acréscimo ou diminuição. 6. Uso adulto e pediátrico. Uso intramuscular. Venda sob prescrição médica. Só pode ser vendido com retenção de receita. Venda proibida ao comércio – Uso hospitalar.

BEPEBEN É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.
“SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO”

Material informativo exclusivo para a equipe de venda do medicamento