

PREGABALINA



SE É TEUTO,
É DE CONFIANÇA

Pregabalina cápsulas duras é indicado para adultos para: tratamento da dor neuropática (dor devido à lesão e/ou mau funcionamento dos nervos e/ou do sistema nervoso) em adultos; como terapia adjunta das crises epilépticas parciais (convulsões), com ou sem generalização secundária em adultos; tratamento do Transtorno de Ansiedade Generalizada em adultos; controle de fibromialgia (doença caracterizada por dor crônica em várias partes do corpo, cansaço e alterações do sono) em adulto. Referência: Lyrica - Pfizer



OUT/2020 - MS. 1.0370.0589.005-1 - Pregabalina – 75 mg e MS. 1.0370.0589.012-2 - Pregabalina 150 mg embalagem com 30 cápsulas duras - Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999.

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? Uso adulto, no tratamento da dor neuropática (dor devido a problemas nos nervos); terapia adjunta de crises epilépticas parciais (com ou sem generalização); tratamento do Transtorno de Ansiedade Generalizada e controle de fibromialgia. 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA? Age regulando a transmissão de mensagens excitatórias entre as células nervosas. Seu início da ação é percebido cerca de 1 semana após o início do tratamento. 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? A pregabalina não deve ser usada em pessoas alérgicas a qualquer componente da fórmula. Este medicamento é contraindicado para menores de 18 anos. 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS: Informe o médico se tiver: problemas hereditários de intolerância a galactose, deficiência de lactase de Lapp ou má-absorção de alimentos; diabetes; doenças renais ou insuficiência cardíaca congestiva. O uso da pregabalina está associado com tontura e sonolência, que pode aumentar a ocorrência de quedas em idosos. É aconselhável não dirigir, operar máquinas, nem exercer atividades perigosas até que se saiba como este medicamento afeta a sua atenção, habilidade e capacidade de realizar tais atividades. Houve relatos de reações de hipersensibilidade, incluindo angioedema, nestes casos descontinuar o produto imediatamente nos primeiros sintomas. PRECAUÇÕES: Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. O risco potencial ao feto é desconhecido, portanto se engravidar durante o uso de pregabalina, comunique imediatamente o médico. Deve-se utilizar métodos contraceptivos eficazes durante o uso de pregabalina. Não é recomendado que mulheres amamentando usem pregabalina, pois, ela é excretada no leite materno. Informe seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: A pregabalina pode potencializar o efeito da oxícodona, bebidas alcoólicas e do lorazepam. O uso de analgésicos opioides com pregabalina requer precaução, pois, pode provocar depressão do SNC e reduzir o funcionamento intestinal. Houve relatos de insuficiência respiratória, coma e morte em pacientes sob tratamento da pregabalina e outros medicamentos depressores do SNC, inclusive em pacientes que abusam da substância. Se perceber sinais ou comportamentos suicidas em pacientes usando pregabalina, busque ajuda médica. A segurança e eficácia da pregabalina não foram estabelecidas em pacientes adolescentes (12 a 17 anos). 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO? CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C). PROTEGER DA LUZ E UMIDADE. Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem. Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? A pregabalina é de uso por via oral, com ou sem alimentos. As doses recomendadas são: (1) Dor neuropática, Transtorno de Ansiedade Generalizada e Epilepsia – 150 a 600mg/dia divididos em 2 doses; (2) Fibromialgia: 150 a 450mg/dia divididos em 2 doses. A dose inicial é sempre de 75mg, via oral, 2 vezes ao dia (150mg/dia). A decisão de aumentar ou diminuir a dose é exclusiva do médico, não faça sem a orientação dele. Recomenda-se que a descontinuação da pregabalina seja gradual, ao longo de 1 semana e sob indicação e supervisão do médico. Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do médico. Este medicamento não pode ser partido, aberto ou mastigado. 7. O QUE DEVO FAZER SE EU ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO? Caso esqueça-se de tomar a pregabalina no horário correto, tome-a assim que lembrar. Entretanto, se já estiver perto do horário de tomar a próxima dose, pule a dose esquecida e continue normalmente o esquema de doses recomendado. Neste caso, não tome o medicamento 2 vezes para compensar doses esquecidas. Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou do médico. 8. QUAIS MALES ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? As reações adversas mais comuns foram tontura e sonolência. Reação Muito Comum (ocorre em mais de 10% dos pacientes): dor de cabeça; Reação Comum (1% e 10%): nasofaringite, aumento do apetite, euforia, irritabilidade, depressão, insônia, diminuição da libido, coordenação anormal, tremores, amnésia, distúrbios de atenção e equilíbrio, formigamentos, visão turva, vertigem, vômitos, constipação, flatulência, boca seca, câimbra, dor (nas articulações, lombar e nos membros), cansaço, diarreia. Reação Incomum (0,1% e 1%): neutropenia, anorexia, hipoglicemia, alucinações, mudanças de humor, desmaio, alterações do ritmo cardíaco e da pressão arterial, falta de ar, sangramento nasal, refluxo gastroesofágico, erupções cutâneas, incontinência urinária, disfunção sexual, febre, alterações sanguíneas e visuais, hipersensibilidade. Reação Rara (0,01% e 0,1%): crise de pânico, pancreatite, dificuldade na deglutição, suor frio, rabdomiólise, insuficiência renal, angioedema, insuficiência cardíaca congestiva, retenção de líquidos no pulmão, retenção urinária, ideação suicida. 9. O QUE FAZER SE ALGUÉM TOMAR UMA QUANTIDADE MAIOR DESTA MEDICAMENTO? Os sintomas mais comuns de superdose incluem sonolência, confusão, depressão, agitação e iniquetação. Convulsões também foram relatadas. O tratamento da superdose com pregabalina deve incluir medidas gerais de suporte, podendo ser necessária hemodiálise. Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.
SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA.
"SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO."

PREGABALINA É UM MEDICAMENTO.
DURANTE SEU USO, NÃO DIRIJA VEÍCULOS OU OPERE MÁQUINAS,
POIS SUA AGILIDADE E ATENÇÃO PODEM ESTAR PREJUDICADAS.