



SE É TEUTO,
É DE CONFIANÇA

Cefalexina

(Antibiótico Cefalosporínico)

Este medicamento é indicado para o tratamento das seguintes infecções causadas por bactérias sensíveis à cefalexina: sinusites (inflamação dos seios da face), infecções do trato respiratório, otite média (inflamação do ouvido médio), infecções da pele e tecidos moles, infecções ósseas, infecções do trato geniturinário e infecções dentárias.

Referência: Keflex - Bagó



Novembro/2021

MS. 1.0370.0382 - Cefalexina 500 mg cx. com 8, 10 e 40 comprimidos; MS. 1.0370.0509 - Cefalexina Pó para suspensão oral 250mg/5mL frasco c/ 100mL após reconstituição + copo-medida "Medicamento Genérico - Lei nº 9.787/99"

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? Indicado no tratamento de infecções causadas por bactérias sensíveis à cefalexina: sinusites, infecções do trato respiratório, otite média, infecções da pele e tecidos moles, infecções ósseas, infecções do trato geniturinário e infecções dentárias. 2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Este medicamento é contraindicado em pacientes alérgicos às cefalosporinas. Não deve ser usado por grávidas sem orientação médica. Categoria B de risco na gravidez. 3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Antes de usar cefalexina, verifique se já apresentou reações de alergia às penicilinas ou cefalosporinas e informe ao médico. Pacientes alérgicos à penicilina devem usar este medicamento com cuidado, pois, podem ser alérgicos às cefalosporinas também. Houve relatos de reações graves, incluindo anafilaxia (reação violenta a uma segunda dose de algum antígeno) a ambas as drogas. Houve relatos sobre graves danos ao tecido do cólon intestinal (colite pseudomembranosa) com pacientes em tratamento com a cefalexina. É importante considerar este diagnóstico para pacientes que apresentem diarreia associada ao uso de antibióticos. Essas colites podem variar de leve a intensa (com risco de vida). O uso prolongado ou inadequado da cefalexina poderá resultar na proliferação de bactérias resistentes. Se uma superinfecção ocorrer durante a terapia, seu médico deverá tomar as medidas apropriadas. Para reduzir o desenvolvimento de bactérias resistentes e manter a eficácia da cefalexina, este medicamento deverá ser usado somente para o tratamento ou prevenção de infecções causadas por microrganismos sensíveis à cefalexina. Pacientes com insuficiência renal grave devem usar a cefalexina com cuidado e requer observação e exames frequentes, pois a dose segura poderá ser menor do que a usualmente recomendada. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: A eliminação da cefalexina pelos rins é inibida pela probenecida. A cefalexina e metformina, em doses únicas de 500mg, apresentaram interação medicamentosa em indivíduos saudáveis. Poderá ocorrer uma reação falso-positiva para glicose na urina com as soluções de Benedict ou Fehling ou com os comprimidos de sulfato de cobre para teste. A cefalexina pode ser usada independente das refeições. Informe ao médico se você está usando algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. 4. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Adulto: as doses variam de 1 a 4g diárias, em doses divididas. Para tratar faringites estreptocócicas, infecções da pele e estruturas da pele e cistites não complicadas em pacientes acima de 15 anos de idade, uma dose de 500mg ou 1g pode ser administrada a cada 12 horas. O tratamento de cistites deve ser de 7 a 14 dias. Para infecções do trato respiratório, causadas por *S. pneumoniae* e *S. pyogenes*, é necessário usar uma dose de 500mg a cada 6 horas. Infecções graves ou causadas por microrganismos menos sensíveis requerem doses mais elevadas. Na necessidade de doses diárias acima de 4g, o médico deve considerar o uso de uma cefalosporina injetável. Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Este medicamento não deve ser partido ou mastigado. Uso pediátrico: A dose diária recomendada para crianças é de 25 a 50mg por kg de peso em doses divididas. A dosagem da suspensão oral vai ser determinada pelo médico de acordo com a patologia e o peso da criança. Maiores detalhes vide bula. 5. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR? A reação adversa mais frequente tem sido a diarreia, sendo raramente grave para determinar a interrupção do tratamento. Houve relatos de indigestão, dor abdominal e gastrite. Sintomas de colite pseudomembranosa podem aparecer durante ou após o tratamento com antibiótico. Enjoos e vômitos foram relatados raramente. Há relatos raros de hepatite transitória e icterícia colestática. Foram observadas reações alérgicas na forma de erupções cutâneas (sem ou com urticária), angioedema e eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson ou necrólise tóxica epidérmica (morte das células da pele). Essas reações geralmente desaparecem com a suspensão da droga. Pode ser preciso terapia de suporte em alguns casos. Houve relatos de anafilaxia. Também ocorreram outras reações como prurido anal e genital, candidíase genital, vaginite, tonturas, fadiga, dor de cabeça, agitação, confusão, alucinações, dor nas articulações, artrite e doenças articulares. Houve relatos raros de inflamação dos rins. Eosinofilia, neutropenia, trombocitopenia, anemia hemolítica e elevações da TGO e TGP têm sido referidas. 6. Uso adulto e pediátrico – Uso via oral. Venda sob prescrição médica. Só pode ser vendida com retenção de receita.

CEFALEXINA É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.
"SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO"

Material informativo exclusivo para a equipe de venda do medicamento