

Cetoconazol + Betametasona



SE É TEUTO,
É DE CONFIANÇA

*Antimicótico + Anti-inflamatório
para uso tópico)*

Este medicamento é destinado ao tratamento de micoses (doenças inflamatórias da pele) que foram afetadas ou possam ser afetadas por fungos ou leveduras. Referência: Candicort - Aché



Maió/23

MS. 1.0370.0246 – Cetocort: Cetoconazol + Betametasona - Creme e Pomada (20 + 0,5) mg/g c/ 30g; MS. 1.0370.0497- Cetoconazol + Betametasona - Creme e Pomada (20+ 0,5) mg/g c/ 30g – “Medicamento Genérico – Lei 9787-99”

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? Este medicamento é destinado ao tratamento de doenças inflamatórias da pele que foram afetadas ou possam ser afetadas por fungos ou leveduras. 2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Não deve ser usado em pacientes que apresentam alergia a quaisquer componentes do medicamento. Não deve ser utilizado em determinadas infecções da pele, tais como: varicela (catapora), herpes simples ou zoster, tuberculose cutânea ou sífilis cutânea. Procure orientação médica caso você tenha alguma destas doenças antes de usar o medicamento. 3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Não se deve usar cosméticos sobre a área da pele tratada. Se ocorrer irritação no local onde o produto foi aplicado, procure orientação médica. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Não deve ser usado durante a amamentação, exceto sob orientação médica. Este medicamento não deve ser usado em áreas extensas, em grande quantidade e por períodos maiores que 2 semanas. Em crianças menores de 12 anos, devem ser utilizadas pequenas quantidades. Não há contraindicação relativa à faixa etária. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Não existe prova suficiente de que outros medicamentos causem modificações importantes no efeito habitual deste medicamento. Porém, podem surgir algumas interações com certos medicamentos, se utilizados concomitantemente, dentre eles estão medicamentos prejudiciais ao fígado, ciclosporinas; famotidina; isoniazida; rifampicina; fenitoína; terfenadina; indinavir; saquinavir; ritonavir e/ou cisaprida, anticoagulantes tais como: dicumarol. Evite a ingestão de bebida alcoólica durante o tratamento. 4. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO: Aplique uma fina camada do creme sobre a área afetada da pele, 1 vez ao dia. Em casos mais graves ou conforme orientação médica, pode ser necessária a aplicação 2 vezes ao dia. Não deve ser utilizado por períodos maiores que 2 semanas. Em crianças menores de 12 anos, devem ser usadas pequenas quantidades. Não utilizar mais que 45 gramas por semana. 5. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? As reações adversas que podem ser atribuídas ao uso do medicamento são: ardência, coceira, irritação, ressecamento, foliculites, Hipertroscose, dermatite perioral, maceração cutânea, infecção secundária, atrofia cutânea, dermatite de contato, miliária e/ou estrias. 6. Uso oral. Uso adulto e pediátrico. Venda sob prescrição médica.

CETOCONAZOL + BETAMETASONA É UM MEDICAMENTO.
SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.
“SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO”

Material informativo exclusivo para a equipe de venda do medicamento