



Cetofenid

(cetoprofeno)

É um medicamento anti-inflamatório, analgésico e antitérmico destinado ao tratamento de artrite reumatoide, espondilite anquilosante, gota, condrocalcinose, reumatismo psoriático, síndrome de Reiter, pseudo-artrite, lúpus eritematoso sistêmico, esclerodermia, periarterite nodosa, osteoartrite, periarterite escápulo-umeral, bursites, capsulites, sinovites, nevralgia cérvico-braquial, cervicalgia, lombalgia, dor ciática, pós-operatórios diversos.

Referências Anvisa:

Cetofenid sol. inj. 50mg/mL - Profenid IM Sanofi-Aventis

Cetofenid 100mg pó liof sol inj - Cetoprofeno Cristália

Agosto/23

Cetofenid – Cetoprofeno - MS. 1.0370.0775 – Sol. Inj. 50mg/mL cx. c/ 60 amp x 2mL e MS.1.0370.0777 - Pó Liofílo p/ Sol. Injetável 100mg c/ 50 Fr. Amp.

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? É destinado ao tratamento de inflamações e dores decorrentes de processos reumáticos e traumatismos, e de dores em geral. 2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Pacientes com histórico de reações de hipersensibilidade ao cetoprofeno, como crises asmáticas ou outros tipos de reações alérgicas ao cetoprofeno, ao ácido acetilsalicílico ou a outros AINEs; Pacientes com úlcera péptica/hemorragia, ou com histórico; histórico de sangramento ou perfuração gastrointestinal, relacionada ao uso de AINEs; com hemorragia gastrointestinal, cerebrovascular ou qualquer outra hemorragia; com insuficiência severa cardíaca, hepática e/ou renal; Mulheres no terceiro trimestre da gravidez. Este medicamento não é indicado para a faixa etária pediátrica. Não deve ser usado por gestantes sem orientação médica. 3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Embora os AINEs possam ser requeridos para o alívio das complicações reumáticas que ocorrem devido ao lúpus eritematoso sistêmico (LES), recomenda-se extrema cautela na sua utilização, uma vez que pacientes com LES podem apresentar predisposição à toxicidade por AINEs no sistema nervoso central e/ou renal. As reações adversas podem ser minimizadas através da administração da dose mínima eficaz e pelo menor tempo necessário para controle dos sintomas. Sangramento, úlcera e perfuração gastrintestinais, que podem ser fatais, foram reportados com todos os AINEs durante qualquer período do tratamento, com ou sem sintomas ou histórico de eventos gastrintestinais graves. Um aumento do risco de eventos tromboticos arteriais tem sido relatado em pacientes tratados com AINEs. Reações cutâneas graves, algumas fatais, incluindo dermatite esfoliativa, síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica, foram reportadas muito raramente com o uso de AINEs. Cetofenid pode mascarar sintomas de infecção, o que pode levar ao atraso do início do tratamento apropriado e, assim, agravar a infecção. Em pacientes com testes de função hepática anormais ou com histórico de doença hepática, os níveis de transaminase devem ser avaliados periodicamente. O uso de AINEs, incluindo Cetofenid IV, por volta da 20ª semana de gestação ou mais tarde na gravidez pode causar disfunção renal fetal, levando a oligodrâmnio e, em alguns casos, insuficiência renal neonatal. Categoria de risco na gravidez: D. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. O uso de cetoprofeno não é recomendado durante a amamentação. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Não associar com: outros AINEs, incluindo inibidores seletivos da ciclooxigenase 2, e altas dosagens de salicilatos (aumento do risco de ulceração e sangramento gastrintestinais); álcool; Anticoagulantes; varfarina; ticlopidina, clopidogrel; apixabana, rivaroxabana, edoxabana. Deve-se realizar cuidadoso monitoramento no uso concomitante com: lítio; metotrexato, colchicina, diuréticos, inibidores da ECA; entre outros descritos na íntegra na bula. 4. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO: Cetofenid IV deve ser administrado somente por via intravenosa, na dosagem de 100mg a 300mg ao dia. Cetofenid sol inj 50mg/ml deve ser administrada 1 ampola por via intramuscular, duas ou três vezes ao dia, a critério médico. Dose máxima diária recomendada: 300mg. 5. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? dispepsia, náusea, dor abdominal, vômito, constipação, diarreia, flatulência e gastrite, cefaleia, vertigem, sonolência, edema, erupção cutânea. Outras reações mais raras, inclusive graves podem ocorrer e estão descritas na bula. 6. Uso intravenoso (pó Liofílo 100mg) e intramuscular (sol inj. 50mg/ml). Uso adulto. Venda sob prescrição médica. Proibida Venda ao Comércio.

CETOFENID É UM MEDICAMENTO.
SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.
"SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO"

Material informativo exclusivo para equipe de vendas do medicamento.