



SE É TEUTO,
É DE CONFIANÇA



Ceftriaxona Dissódica

(Antibiótico Cefalosporínico)

Ceftriaxona dissódica é usada para tratar infecções causadas por microrganismos sensíveis à mesma, o que a torna um antibiótico capaz de eliminar uma grande variedade de microrganismos/bactérias responsáveis por diversos tipos de infecções.

Referência: Rocefin - Roche



Mai/23

MS. 1.0370.0712 – Ceftriaxona dissódica – Pó para Sol. Inj. IM de 1g + amp. dil. 3,5mL e 500mg + amp. dil. 2mL - "Medicamento Genérico - Lei nº 9.787-99"

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? Indicada no tratamento de infecções causadas por bactérias sensíveis a Ceftriaxona. 2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? É contraindicado a pacientes com alergia à ceftriaxona, a qualquer excipiente da fórmula ou a outro cefalosporínico. Pacientes com histórico de reações de hipersensibilidade à penicilinas e outros agentes betalactâmicos podem apresentar maior risco de alergia à ceftriaxona. Favor consultar as contraindicações descritas na bula da lidocaína. É contraindicado a neonatos prematuros com idade pós-menstrual de até 41 semanas (idade gestacional + idade cronológica). Recém-nascidos com icterícia não devem ser tratados com ceftriaxona. Este medicamento é contraindicado a neonatos (≤ 28 dias) sob tratamento (ou em previsão de tratamento) com soluções IV que contêm cálcio. 3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS e PRECAUÇÕES: Reações de hipersensibilidade sérias e, ocasionalmente, fatais foram reportadas em pacientes tratados com Ceftriaxona. Casos graves de anemia hemolítica, incluindo óbitos, foram relatados durante o tratamento em adultos e crianças. O tratamento com agentes antibacterianos altera a flora normal do cólon, levando a um crescimento exacerbado do *C. difficile*, que contribui para o desenvolvimento de CDAD. Se notar diarreia persistente, avise seu médico. Superinfecções: superinfecções com os microrganismos não susceptíveis podem ocorrer como com outros agentes antibacterianos. Pancreatite: casos de pancreatite, possivelmente de origem biliar (obstrutiva), foram raramente relatados em pacientes tratados com Ceftriaxona. Monitoramento do sangue: durante tratamentos prolongados, hemograma completo deve ser feito regularmente. O diluente de ceftriaxona IM, composto de uma solução de lidocaína, nunca deve ser administrado na veia. não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou amamentando sem orientação médica. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Não se observou alterações da função renal após administração simultânea de doses elevadas deste medicamento e potentes diuréticos, como a furosemida. Recomenda-se o monitorar os níveis de aminoglicosídeos e da função renal, quando administrados em combinação com ceftriaxona. A ceftriaxona não está associada a uma possível intolerância ao álcool e sangramentos observados com outras cefalosporinas. Cloranfenicol pode ter interações com ceftriaxona. O uso de ceftriaxona com antagonistas da vitamina K pode aumentar o risco de sangramentos. Os parâmetros de coagulação devem ser monitorados. 4. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Ceftriaxona IM 1g deve ser diluída em 3,5mL de uma solução de lidocaína a 1% e injetar profundamente na região glútea ou em outro músculo relativamente grande. Recomenda-se não injetar mais do que 1g em cada local. Dosagem usual: Adultos e crianças acima de 12 anos: a dose usual é de 1 – 2g de ceftriaxona em dose única diária (cada 24 horas). Em casos graves ou em infecções causadas por patógenos moderadamente sensíveis, a dose pode ser elevada para 4g, uma vez ao dia. As dosagens para outras idades e posologias para patologias específicas estão descritas em detalhe na bula do produto. 5. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? As reações adversas mais frequentemente reportadas para este medicamento são eosinofilia, leucopenia, trombocitopenia, diarreia, erupção cutânea e aumento das enzimas hepáticas (substâncias que indicam lesão do fígado no exame de sangue). Dor de cabeça, tontura, náusea, vômito, prurido (coceira), flebite (inflamação da veia), reações no local da administração, febre e aumento da creatinina no sangue (substância que indica lesão dos rins no exame de sangue) também foram relatados. Colite pseudomembranosa e outras reações adversas, algumas graves, também podem ocorrer embora seus relatos sejam raros. Na bula estão descritas na totalidade. Não use nenhum medicamento antes de ler com atenção a bula. 6. USO INTRAMUSCULAR. USO ADULTO E PEDIÁTRICO. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA COM RETENÇÃO DE RECEITA.

CEFTRIAXONA É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. CONSULTE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.

"SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO"

Material informativo exclusivo para a equipe de venda do medicamento.