




SE É TEUTO,  
É DE CONFIANÇA



# Fexofenadina

(Anti-histamínico)

É indicado para o alívio das manifestações alérgicas tais como: rinite alérgica incluindo espirros, obstrução nasal (nariz entupido); prurido (coceira) no nariz, no palato (céu da boca), na garganta e nos olhos; coriza (nariz escorrendo); conjuntivite alérgica com sintomas de lacrimejamento e vermelhidão dos olhos; febre do feno (causada pelo pólen de algumas plantas); alergias da pele como os da urticária (erupções avermelhadas na pele que causam coceira). Referência: Allegra - Sanofi Medley.

Agosto/23

MS. 1.0370.0742- Fexofenadina - Cpr. rev. 120mg c/10 e 180mg c/10 – “Medicamento Genérico – Lei 9.787/99”

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? Para o alívio das manifestações alérgicas tais como: rinite alérgica; espirros, prurido no nariz, na garganta e nos olhos; coriza; conjuntivite alérgica com sintomas de lacrimejamento e vermelhidão dos olhos; febre do feno; alergias da pele como os da urticária. 2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Não deve ser utilizado em caso de alergia aos componentes da fórmula. Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos. 3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Não há estudos com fexofenadina em mulheres grávidas e/ou que estejam amamentando. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Não é necessário ajuste de dose de fexofenadina em pacientes com insuficiência hepática e renal ou em idosos. Não foram observados efeitos sobre a capacidade de conduzir automóveis ou de operar máquinas, alteração no padrão do sono ou outros efeitos no sistema nervoso central. Fexofenadina não possui efeito de sedação. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Fexofenadina e antiácido contendo gel de hidróxido de alumínio e magnésio: é aconselhável aguardar o período de 2 h entre a administração destes medicamentos; Fexofenadina e eritromicina ou cetoconazol: a coadministração entre estes medicamentos não resultou em aumento significativo dos parâmetros de segurança eletrocardiográficos. Evite tomar fexofenadina junto com alimentos ricos em gordura ou com suco de frutas. 4. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO: Para os sintomas associados à rinite alérgica: 01 comprimido de 120mg uma vez ao dia ou 01 comprimido de 180mg uma vez ao dia. Para os sintomas associados à urticária: 01 comprimido de 180mg uma vez ao dia. 5. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? Reação comum (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): Dor de cabeça, sonolência, tontura e enjoos; Reação rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento): Exantema (erupções cutâneas), urticária, prurido e outras manifestações alérgicas como angioedema (inchaço em região subcutânea ou em mucosas, geralmente de origem alérgica), rigidez torácica (aperto no peito), dispneia (dificuldade na respiração), rubor (vermelhidão) e anafilaxia sistêmica (reação alérgica). 6. Uso oral. Uso adulto e pediátrico acima de 12 anos. Venda sob prescrição médica.

FEEOFENADINA É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.  
“SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO”

Material informativo exclusivo para a equipe de venda do medicamento