

Diclofenaco

(Anti - inflamatório)



SE É TEUTO,
É DE CONFIANÇA

Fenaflan D® pode ser utilizado no tratamento de curto prazo nas condições de dor e inflamação no pós-operatório, entorses, distensões e outras lesões, dor articular degenerativa (artrite), crises de gota, dor nas costas, síndrome do ombro congelado, cotovelo de tenista e outros tipos de reumatismo de tecidos moles, condições inflamatórias dolorosas em ginecologia, incluindo períodos menstruais, infecções do ouvido, nariz e garganta.

Referência: Cataflam D - Novartis



2249 - 789611212494

2246 - 789611212463

Maio/2023

MS. 1.0370.0080 – Fenaflan D - Diclofenaco 50mg c/ 20 comprimidos dispersíveis. MS. 1.0370.0387 – Diclofenaco 50mg c/20 comprimidos dispersíveis. “Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999”

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? É indicado no tratamento de curto prazo nas condições de dor e inflamação no pós-operatório, entorses, distensões e outras lesões, artrite, crises de gota, dor nas costas, síndrome do ombro congelado, cotovelo de tenista e outros tipos de reumatismo de tecidos moles, condições inflamatórias dolorosas em ginecologia, incluindo períodos menstruais, infecções do ouvido, nariz e garganta.
2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Você não pode tomar este medicamento se: for alérgico ao diclofenaco ou a qualquer outro componente da fórmula; já teve reação alérgica após tomar medicamentos para tratar inflamação ou dor; tem úlcera no estômago ou no intestino; tem sangramento ou perfuração no estômago ou no intestino; sofre de insuficiência hepática ou renal; tem insuficiência cardíaca grave. Fenaflan D é contraindicado para menores de 14 anos e não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.
3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Siga todas as instruções do seu médico cuidadosamente. Tenha especial se você tiver doença no coração ou nos vasos sanguíneos. O tratamento com Fenaflan D geralmente não é recomendado; se você tiver fatores de risco significativos, como pressão arterial elevada, níveis anormalmente elevados de gordura (colesterol, triglicérides) no sangue, diabetes, ou se você fuma. É importante tomar a menor dose de Fenaflan D que alivia a dor e/ou inchaço e durante o menor tempo possível, de modo a manter o menor risco possível de efeitos secundários cardiovasculares. Deve-se ter cautela se você está tomando Fenaflan D simultaneamente com outros anti-inflamatórios incluindo ácido acetilsalicílico, corticoides, anticoagulantes ou inibidores seletivos de serotonina, se você tem asma ou febre do feno. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: É importante avisar ao seu médico se está tomando qualquer um destes medicamentos: lítio ou inibidores seletivos da recaptação da serotonina, digoxina, diuréticos, inibidores da ECA ou betabloqueadores, outros anti-inflamatórios tais como, ácido acetilsalicílico ou ibuprofeno; corticoides, anticoagulantes, antidiabéticos, ciclosporina, tacrolimo, antibacterianos, quinolônicos, rifampicina. Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.
4. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Dissolva o comprimido em copo com água. A dose inicial diária recomendada é de 2 a 3 comprimidos em doses fracionadas. Não exceder 3 comprimidos por dia. Crianças de 14 anos ou mais, a dose diária de 2 comprimidos é, geralmente, suficiente. A duração do tratamento é conforme orientação médica.
5. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? Reações adversas comuns (ocorrem entre 1% e 10% dos pacientes): dor de cabeça, tontura, vertigem, náusea, vômito, diarreia, indigestão (sinais de dispepsia), dor abdominal, flatulência, perda do apetite, exames de função do fígado anormais (ex.: aumento do nível de transaminases), rash cutâneo. Reações adversas incomuns (ocorrem entre 0,1% e 1% dos pacientes): palpitações, dor no peito. Reações adversas raras (ocorrem entre 0,01% e 0,1% dos pacientes): sonolência, dor de estômago (sinais de gastrite), problema no fígado, rash com prurido (sinais de urticária). Algumas reações adversas são muito raras (ocorrem em menos de 0,01% dos pacientes): nível baixo de células vermelhas sanguíneas (anemia), nível baixo de células brancas sanguíneas (leucopenia), desorientação, depressão, dificuldade de dormir (sinais de insônia), pesadelos, irritabilidade, formigamento ou dormência nas mãos ou pés, tremores, distúrbios do paladar, distúrbios de visão, ruídos nos ouvidos, constipação, ferimentos na boca, inchaço, língua vermelha e dolorida, problema no tubo que leva o alimento da garganta para o estômago, espasmos no abdômen superior, especialmente depois de comer, prurido, rash com vermelhidão e queimação, vermelhidão na pele, perda de cabelo, prurido, sangue na urina. Outras informações estão disponíveis na bula. Leia a bula.
6. Uso oral. Uso adulto e infantil a partir de 14 anos de idade. Venda sob prescrição médica.

DICLOFENACO É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS.
PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.
SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO”

Material informativo exclusivo para a equipe de venda do medicamento