

Lestalgyn

(Anti-histamínico + Anti-inflamatório)



SE É TEUTO,
É DE CONFIANÇA

Lestalgyn® é indicado no tratamento adjuvante de doenças alérgicas do aparelho respiratório, nas doenças alérgicas da pele e nas doenças alérgicas inflamatórias oculares.

Referência: Celestamine - Cosmed



2743 - 7896112127437

2228 - 7896112122289



Março/2022

MS: 1.0370.0042 – Lestalgyn – Maleato de dexclorfeniramina + Betametasona – Xarope 2mg/5ml + 0,25mg/5ml – Embalagem com 01 frasco de 120ml + copo-medida e MS: 1.0370. 0399 — Maleato de dexclorfeniramina + Betametasona – Xarope 2mg/5ml + 0,25mg/5ml – Embalagem com 01 frasco de 120ml + copo-medida. "Medicamento Genérico - Lei nº 9.787/99"

PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? Indicado no tratamento adjuvante de doenças alérgicas do aparelho respiratório, como asma brônquica e rinite alérgica; nas doenças alérgicas da pele, como dermatite atópica, dermatite de contato, reações medicamentosas e nas doenças alérgicas inflamatórias oculares, como ceratites, conjuntivite e inflamações das porções internas do olho. Nestas doenças oculares, Lestalgyn inibe a fase aguda da inflamação preservando a integridade funcional do globo ocular enquanto se trata a infecção. 2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? É contraindicado em pacientes com infecção sistêmica por fungos, em prematuros e recém-nascidos, em pacientes que estejam em terapia com inibidores da monoaminoxidase ou que apresentarem hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula. Contraindicado para crianças menores de 2 anos de idade. 3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Betametasona – podem ser necessários ajustes posológicos de acordo com a remissão ou exacerbação da doença e poderá ser necessário acompanhamento clínico durante o período de até um ano após o término de tratamentos prolongados ou com doses elevadas. A retirada brusca e rápida de Lestalgyn pode ocasionar insuficiência suprarrenal secundária. Os corticosteroides podem: ter seus efeitos aumentados em pacientes com hipotireoidismo; mascarar alguns sinais de infecção e diminuir a resistência e dificuldade em localizar a infecção; elevar a pressão arterial, reter sal e água aumentando a excreção de potássio; aumentar a excreção de cálcio; interferir na taxa de crescimento normal e diminuir a produção de corticosteroides pelas glândulas suprarrenais e alterar a mobilidade e o número de espermatozoides. Durante o uso de Lestalgyn não se deve vacinar, especialmente contra varíola. Lestalgyn pode agravar os quadros prévios de instabilidade emocional ou tendências psicóticas. O médico deve ser avisado caso tenha as seguintes doenças: colite ulcerativa, abscesso com pus, diverticulite, cirurgia recente do intestino, úlcera do estômago ou intestino, doenças dos rins, pressão alta, osteoporose e miastenia gravis. Maleato de dexclorfeniramina – seu uso deve ser feito com cautela em pacientes com: glaucoma de ângulo estreito, úlcera do estômago ou duodeno, aumento da próstata, doenças do coração e dos vasos sanguíneos como pressão alta, pacientes com pressão intraocular elevada ou com aumento dos hormônios da tireoide. Este medicamento pode causar doping. Contém açúcar. Durante o tratamento o paciente não deve dirigir ou operar máquinas pois provoca sono. Pode causar sedação, vertigem e hipotensão em pacientes acima de 60 anos. Deve ser usado por mulheres grávidas ou que estejam amamentando somente sob prescrição e acompanhamento médico. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não deve ser usado com substâncias que deprimem o sistema nervoso central: álcool. A betametasona pode interagir com medicamentos, informe seu médico caso esteja usando: fenobarbital, fenitoína, estrogênios, diuréticos, anfotericina B, anticoagulantes cumarínicos e hormônios de crescimento. Usar Lestalgyn junto com anti-inflamatórios não hormonais ou álcool pode resultar em um aumento de incidência ou gravidade da úlcera de estômago. A administração de dexclorfeniramina junto com alguns medicamentos, pode provocar potencialização ou redução do seu efeito, são eles: inibidores da monoaminoxidase, antidepressivos tricíclicos, barbitúricos e anticoagulantes cumarínicos. Os corticoides podem afetar o teste nitroble tetrazolium para infecção bacteriana e produzir resultados falso-negativos no exame laboratorial. Informe ao médico se estiver fazendo uso de outro medicamento antes de iniciar o tratamento com Lestalgyn. 4. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? As doses e o tempo de duração do tratamento devem ser ajustadas pelo médico. Porém, as doses usuais são: adultos e crianças > 12 anos – 5 a 10ml 3 a 4 vezes ao dia (máximo 40ml/dia); crianças de 6 a 12 anos – 1,25 a 2,5ml 3 vezes ao dia (máximo de 20ml/dia) e crianças de 2 a 6 anos – 1,25 a 2,5ml 3 vezes ao dia (dose máxima de 10ml/dia). 5. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? Reações comuns (ocorrem entre 1% e 10% dos pacientes): betametasona – gastrointestinais, musculoesqueléticas, dermatológicas, neurológicas, endócrinas, oftálmicas, metabólicas e psiquiátricas. Maleato de dexclorfeniramina – sonolência leve a moderada, urticária, exantema cutâneo, choque anafilático, fotossensibilidade, transpiração excessiva, calafrios, secura da boca, nariz e garganta. Reações raras (entre 0,01% e 0,1%): maleato de dexclorfeniramina – reações cardiovasculares, hematológicas, neurológicas, gastrointestinais, geniturinárias e respiratórias. 6. USO ORAL. USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.

LESTALGYN É UM MEDICAMENTO. DURANTE SEU USO, NÃO DIRIJA VEÍCULOS OU OPERE MÁQUINAS, POIS SUA AGILIDADE E ATENÇÃO PODEM ESTAR PREJUDICADAS.
"SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO"

Material informativo exclusivo para a equipe de venda do medicamento