



SE É TEUTO,
É DE CONFIANÇA



**Indicação: Hiperplasia
Prostática Benigna.**



Posologia: 1 vez ao dia



**Pode ser tomado com
ou sem alimentos**



Finarid – Finasterida (Inibidor da Alfa-redutase tipo II)

Referência: Finasterida – Eurofarma

Julho/24

MS. 1.0370.0652 – Finarid 5mg caixa com 30 comprimidos revestidos. MS. 1.0370.0541 – Finasterida 5 mg caixa com 30 comprimidos revestidos – “Medicamento Genérico – Lei 9787-99”

1. **PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?** Indicado para quem apresenta uma condição conhecida como hiperplasia prostática benigna (HPB), ou seja, a próstata, localizada próximo da bexiga, aumenta o tamanho, causando dificuldades para a passagem da urina. Este medicamento é para uso somente em homens. 2. **QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?** Este medicamento é contra-indicado para uso por mulheres e crianças. Não deve ser usado por grávidas. Não tome finasterida se achar que é alérgico a algum de seus ingredientes. 3. **O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES** Fale com o seu médico antes de tomar finasterida se: Sua parceira está grávida ou planeja engravidar. Você deve utilizar um preservativo ou outro método contraceptivo de barreira quando tomar finasterida. Isso é necessário porque o seu sêmen pode conter uma pequena quantidade do fármaco e pode afetar o desenvolvimento normal dos órgãos sexuais do bebê. Se você vai fazer um exame de sangue chamado PSA. Se você tiver alteração de humor, depressão e pensamentos suicida, contate seu médico o mais rápido possível. **INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA:** A finasterida geralmente não afeta o efeito de outros medicamentos. 4. **COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO:** Tome um comprimido revestido de finasterida 5mg diariamente, com ou sem alimentos. Finasterida pode tratar seus sintomas e controlar a doença apenas se você continuar o tratamento por um longo período. Este medicamento não deve ser partido ou mastigado. 5. **QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?** Os seguintes efeitos secundários podem ocorrer: Reações alérgicas, Pare de tomar finasterida e contate um médico se sentir: Inchaço da face, lábios, língua ou garganta, dificuldade em engolir e dificuldades respiratórias, erupções cutâneas, coceira ou nódulos sob a pele (urticária). Os efeitos mais comuns podem incluir: impotência, perder o apetite por sexo, problemas de ejaculação. Essa diminuição na quantidade de sêmen não parece afetar a função sexual normal. Estes efeitos secundários acima podem desaparecer depois de algum tempo se continuar a tomar finasterida ou regredem depois de parar de usar finasterida. Outros efeitos colaterais relatados são: Inchaço da mama ou sensibilidade; palpitações, disfunção hepática, que pode ser comprovada através de exames, dor nos testículos, sangue no sêmen, incapacidade de ter uma ereção que pode continuar depois de parar a medicação, infertilidade masculina e/ou baixa qualidade do sêmen. Melhora na qualidade do sêmen foi relatada após a interrupção da medicação, depressão, diminuição do desejo sexual que pode continuar depois de parar a medicação, problemas com a ejaculação que podem continuar depois de parar a medicação e ansiedade. Você deve informar ao médico quaisquer alterações em seu tecido mamário, como nódulos, dor, aumento ou aparecimento de secreção, pois podem ser sinais de uma doença grave, como câncer de mama. Informe ao médico se algum dos efeitos secundários se agravar ou se perceber quaisquer efeitos secundários não mencionados nesta bula. 6. **Uso oral. Uso adulto (Apenas homens). Venda sob prescrição médica.**

FINASTERIDA É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.
“SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO”

Material informativo exclusivo para a equipe de venda do medicamento