



SE É TEUTO,  
É DE CONFIANÇA

2535 - 789611212084

1984 - 7896112119845



iStock™  
Credit: Barteks

# Fenobarbital

(Anticonvulsivante)

Este medicamento é destinado à prevenção do aparecimento de convulsões em indivíduos com epilepsia (doença do sistema nervoso central que causa convulsões ou ausências do paciente) ou crises convulsivas de outras origens.  
Referência: Gardenal - Sanofi Medley

Out/23

MS. 1.0370.0640 – Fenobarbital 100 mg caixa c/ 20 e 30 comprimidos – “Medicamento Genérico – Lei nº 9787-99”

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? Destinado à prevenção do aparecimento de convulsões em indivíduos com epilepsia ou crises convulsivas de outras origens. 2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Não deve ser utilizado nos seguintes casos: porfiria, insuficiência respiratória severa, insuficiência hepática ou renal graves e em pacientes com antecedentes de hipersensibilidade aos barbitúricos. Não usar se for mulher em idade fértil ou se estiver grávida, devido aos riscos de malformações congênitas e distúrbios do desenvolvimento neurológico para o feto em caso de gravidez. Também é contraindicado em pacientes que fazem uso de saquinavir, daclatasvir, dasabuvir, paritaprevir, ombitasvir, ledipasvir, sofosbuvir. O fenobarbital é contraindicado também com uso de álcool, estrógenos e progestogênio utilizados como contraceptivos e durante a lactação. Contraindicado durante a lactação. 3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: O fenobarbital não deve ser usado em crianças do sexo feminino até a menarca (primeira menstruação), a menos que outros tratamentos sejam ineficazes ou não tolerados. O fenobarbital não é indicado para o tratamento de convulsões de ausência ou convulsões mioclônicas, as quais, algumas vezes, podem ser exacerbadas. Uso prolongado pode causar dependência. Como com outros fármacos anticonvulsivantes, a interrupção abrupta do tratamento pode levar a crises convulsivas e estado epiléptico, particularmente em pacientes alcoólatras. Foram relatados comportamentos e intenções suicidas em pacientes tratados com agentes antiepilépticos em várias indicações. Foram reportadas sérias reações cutâneas incluindo Síndrome de Stevens-Johnson, entre outras. O tratamento com fenobarbital deve ser descontinuado na primeira aparição de erupção cutânea, lesões da mucosa, ou qualquer outro sinal de hipersensibilidade da pele. O consumo de bebidas alcoólicas é fortemente desaconselhado durante o tratamento com fenobarbital. Recomenda-se, ainda, suplementação adequada de ácido fólico, cálcio e vitamina K à gestante que faz uso crônico de fenobarbital, devido às interferências deste com o metabolismo dessas substâncias. recomenda-se cautela e redução das doses de fenobarbital em idosos. Os pacientes, particularmente os motoristas e as pessoas que operam máquinas, devem estar atentos aos riscos de sonolência e tontura associados com esta medicação. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Fenobarbital pode interagir com muitos medicamentos e a relação completa está na bula. Alguns são: álcool; antidepressivo imipramina; metadona; outros depressores do sistema nervoso central; metotrexato; -derivados da morfina, benzodiazepínicos, corticoides, hormônios estrogênicos ou tireoídicos, digoxina; doxiciclina; hidroquinidina, itraconazol; montelucaste; -teofilina e aminofilina; antivirais em geral; outros antiepilépticos. 4. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO: Adultos: 2 a 3mg/kg/dia em dose única ou fracionada. Siga a orientação médica sobre a dosagem e modo de uso. 5. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? agitação e agressividade; distúrbios do humor, distúrbios do sono/insônia; sonolência; ; distúrbio cognitivo, comprometimento da memória; ; náusea, vômito; aumento da gama-glutamilttransferase, aumento das transaminases e aumento da fosfatase alcalina no sangue; dermatite alérgica; contratura de Dupuytren (doença que dificulta a contração de um ou mais dedos da mão); artralgia (dor nas articulações - síndrome mão-ombro ou reumatismo induzido por fenobarbital). Muitas outras reações adversas mais raras e que podem ser graves estão descritas na íntegra na bula do produto. 6. Uso oral. Uso adulto. Venda sob prescrição médica. Só pode ser vendido com retenção da receita.

FENOBARBITAL É UM MEDICAMENTO. DURANTE O SEU USO NÃO DIRIJA VEÍCULOS OU OPERE MÁQUINAS, POIS SUA HABILIDADE E ATENÇÃO PODEM ESTAR PREJUDICADAS.  
“SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO”

Material informativo exclusivo para a equipe de venda do medicamento