

INCLUSÃO DE APRESENTAÇÃO

DIGOXINA



Comprimido 0,25mg c/ 20 unidades

"Medicamento Genérico Lei nº 9.787, de 1999".

"Material de divulgação exclusivo aos profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos".

MERCADO

- > O mercado nesta apresentação vende aproximadamente 42,3 mil unidades por mês, resultando um faturamento de 4,3 milhões de reais no período entre Fevereiro/2022 e Fevereiro/2023*, evoluindo cerca de 2% em valor neste mesmo período.

Fonte: (Close Up RM – Fevereiro/2023).

COMPARATIVO DE PREÇOS*

DIGOXINA CPR. 0,25 MG C/ 30 GEN

PRODUTO	LABORATÓRIO	20% PF	20% PMC	18% PF	18% PMC	17% PF	17% PMC	12% PF	12% PMC
DIGOXINA	PHARLAB	R\$ 12,86	R\$ 17,78	R\$ 12,55	R\$ 17,35	R\$ 12,40	R\$ 17,14	R\$ 11,69	R\$ 16,16
CARDCOR	TEUTO	R\$ 11,20	R\$ 15,48	R\$ 10,92	R\$ 15,10	R\$ 10,79	R\$ 14,91	R\$ 10,18	R\$ 14,07
DIGOXINA	TEUTO	R\$ 13,40	R\$ 18,52	R\$ 13,06	R\$ 18,06	R\$ 12,91	R\$ 17,84	R\$ 12,18	R\$ 16,83

Fonte: Kairos online Março/2023

DIGOXINA CPR. 0,25 MG C/ 20 GEN

PRODUTO	LABORATÓRIO	18% PF	DIF %	DIF R\$
DIGOXINA	PHARLAB	R\$ 8,66	21,25%	R\$ 1,84
CARDCOR	TEUTO	R\$ 8,02	14,96%	R\$ 1,20
DIGOXINA	TEUTO	R\$ 6,82		

**Os preços contemplam apenas o período de Lançamento do Produto. Caso deseje os preços atualizados, consultar seu gerente ou consultor.*

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Condições especiais de lançamento, consulte seu gerente ou consultor.

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- ✓ A digoxina é um dos medicamentos mais antigos na cardiologia ainda em uso, demonstrando sua eficácia;
 - ✓ Útil na redução de hospitalizações por insuficiência cardíaca;
 - ✓ Uso adulto e pediátrico acima de 10 anos;
 - ✓ Comprimido com vinco para facilitar ajustes posológico;
 - ✓ Apenas 1 concorrente genérico explorando este mercado;
- ✓ O Laboratório Teuto disponibiliza novamente ao mercado um dos seus sucessos de vendas, a apresentação de Digoxina 0,25 mg c/30 unidades com uma oportunidade de crescimento.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

digoxina

Medicamento Genérico Lei nº 9.787, de 1999.

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

A digoxina é um medicamento indicado para o tratamento da insuficiência cardíaca congestiva (um conjunto de sinais e sintomas decorrentes do mau funcionamento do coração, que não é capaz de bombear o sangue e suprir a necessidade de oxigênio e nutrientes do organismo) e de certas arritmias, nome que se dá às variações do ritmo dos batimentos do coração.

2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento é contraindicado nos casos de: Alergia à digoxina; Bloqueio atrioventricular completo ou intermitente ou outros tipos de arritmia cardíaca; Outros tipos de doenças cardíacas, como a cardiomiopatia obstrutiva hipertrófica, a menos que haja também fibrilação atrial e insuficiência cardíaca, mas, mesmo nesse caso, deve-se tomar cuidado com o uso de digoxina. A digoxina não deve ser utilizada por pacientes com certos problemas de coração.

3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Se você responder “sim” a alguma das perguntas abaixo, avise ao seu médico antes de usar este medicamento. Ele lhe dirá se este medicamento é adequado ou não para você.

- Você tem, ou já teve problemas nos rins?
- Você é idoso?
- Você está usando diurético ou inibidores da ECA?
- Você tem o nível alterado de cálcio no sangue?
- Você tem doença da tireoide?
- Você tem o nível baixo de magnésio no sangue?

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Você tem alguma doença no pulmão?
- Você sente falta de ar?
- Você tem problemas no intestino ou no estômago?
- Você está grávida, amamentando ou pretende engravidar?
- Você está usando ou usou um glicosídeo cardíaco nas últimas duas semanas?
- Você sofreu algum infarto recentemente?
- Você está sendo ou será submetido a tratamento de cardioversão de corrente contínua?
- Você possui algum dos seguintes problemas cardíacos? Amiloidose cardíaca, miocardite, doença cardíaca por beribéri ou pericardite crônica.

Os pacientes idosos têm tendência a apresentar problemas nos rins e diminuição da massa corporal, e isso faz com que os níveis altos de digoxina no sangue causem intoxicação rapidamente. O médico deverá fazer o ajuste adequado da dose conforme o caso. Consulte seu médico, que indicará outros cuidados a serem tomados.

Pacientes que estão usando digoxina devem ter cuidado ao dirigir, operar máquinas ou participar de atividades perigosas.

Gravidez: Categoria C de risco. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Lactação: Embora a digoxina esteja presente no leite materno, as quantidades são mínimas, por isso o medicamento não é contraindicado durante a amamentação.

Interações entre medicamento e alimento: A digoxina pode ser ingerida com a maioria dos alimentos. Entretanto, você deve evitar tomá-lo com alimentos ricos em fibras, que podem reduzir a quantidade de digoxina absorvida.

Interações entre medicamento e exame laboratorial: O uso de digoxina pode alterar o eletrocardiograma portanto, avise à pessoa que conduz o teste que você está tomando digoxina.

A digoxina pode interagir com muitos outros medicamentos, incluindo aqueles adquiridos sem prescrição médica. Não use nenhum medicamento junto com digoxina sem orientação médica.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Se você responder “sim” a alguma das questões abaixo, avise seu médico antes de usar este medicamento.

-Você usa medicamentos para tratar o câncer, pressão alta, epilepsia, arritmias ou para problemas de estômago/intestino (incluindo laxantes, digestivos ou para vômito) ?

-Você usa drogas bloqueadoras de receptores beta-adrenérgicos ou bloqueadores de canais de cálcio?

-Você utiliza drogas que diminuem os níveis de potássio no sangue, como diuréticos, sais de lítio, corticosteroides, carbenoxolona?

-Você faz uso de cálcio? (Especial atenção utilização via intravenosa).

-Você utiliza inibidores da ECA, amiodarona, flecainida, prazosina, propafenona, quinidina, espironolactona, antibióticos macrolídeos, tetraciclina, gentamicina, itraconazol, quinina, trimetoprima, alprazolam, indometacina, propantelina, nefazodona, atorvastatina, ciclosporina, verapamil, epoprostenol, carvedilol, felodipina, nifedipina, diltiazem, inibidores da Pglicoproteína ou tiapamil?

-Você utiliza antiácidos, caolin-pectina, laxantes, colestiramina, acarbose, sulfasalazina, neomicina, rifampicina, citostáticos, fenitoína, metoclopramida, penicilamina, adrenalina, salbutamol ou Hypericum perforatum (erva de São João)?

4. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

A dose de digoxina deve ser ajustada pelo médico, de acordo com a sua idade, peso corporal e função renal. As doses sugeridas devem ser interpretadas somente como uma diretriz inicial.

Você deve ingerir o medicamento sempre no mesmo horário, todos os dias. Siga à risca as instruções do seu médico. Usar doses maiores que a prescrita é perigoso.

Controle: A maioria dos pacientes apresentará bons resultados, com baixo risco de desenvolver sinais e sintomas de intoxicação quando as concentrações de digoxina no sangue estiverem entre 0,8ng/mL (1,02nmol/L) a 2,0ng/mL (2,56nmol/L).

É muito provável a ocorrência de intoxicação quando os níveis sanguíneos ultrapassarem a 3,0ng/mL (3,84nmol/L).

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Adultos e crianças com mais de 10 anos

Dose de ataque: 750 a 1500 μ g (0,75 a 1,5mg) como dose única.

Dose lenta de ataque: Uma dose de 250 a 750 μ g (0,25 a 0,75mg) pode ser administrada diariamente, por 1 semana, seguida de uma dose de manutenção apropriada. Uma resposta clínica deve ser observada dentro de uma semana.

Nota: a escolha entre a dose rápida ou lenta de ataque depende do estado clínico do paciente e da urgência da condição.

Dose de Manutenção: Seu médico deverá avaliar qual a dose mais adequada para seu caso. A maior parte dos pacientes terá doses de manutenção diárias entre 125 e 250 μ g (0,125 – 0,25mg) de digoxina.

A tendência de pacientes idosos apresentarem alterações da função renal ou pouca massa corporal influencia a farmacocinética da digoxina de tal forma que níveis altos de digoxina no plasma poderão causar toxicidade rapidamente, a menos que sejam usadas doses de digoxina, inferiores às de pacientes adultos. Os níveis de digoxina sérica devem ser checados regularmente, assim como os níveis de potássio.

Siga a orientação do médico, respeitando os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

5. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Se você se esquecer de uma dose, tome-a assim que se lembrar e continue o tratamento como antes. Não tome doses duplas do medicamento para compensar as que você esqueceu.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou do médico.

6. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Reações comuns (ocorrem entre 1% e 10% dos pacientes) desorientação, tontura e vista turva ou amarelada; mudanças da frequência ou dos batimentos cardíacos

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

(seu coração pode bater mais devagar ou de forma irregular); Sensação de enjoo, diarreia; manifestações alérgicas da pele (inclusive vermelhidão e coceira).

Reação incomum (0,1% a 1% dos pacientes)

Depressão

Outras reações muito raras, inclusive graves podem ocorrer e estão descritas em detalhes na bula do medicamento.

Se algum dos efeitos indesejáveis se agravarem ou se você notar algum efeito não descrito nesta bula, avise seu médico ou farmacêutico.

A primeira e mais frequente manifestação de superdosagem de digoxina é o aparecimento de arritmias cardíacas (alteração dos batimentos do coração).

Procure imediatamente o médico se isto ocorrer.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

DIGOXINA É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. "SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO".

Maiores informações vide a bula.

\$UCE\$\$O E BOA\$ VENDA\$!!!

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E MERCADOS



SE É TEUTO,
É DE CONFIANÇA

Ficha: DIGOXINA 0,25 C /20

Cód. do produto	2306																					
OBS:	Inclusão de Apresentação!																					
Classe	GE																					
Denominação genérica	Digoxina																					
Apresentação	Comprimido 0,25mg c/ 20 unidades																					
Restrição de uso	USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 10 ANOS.																					
Via de administração	USO ORAL.																					
Nº de MS	1.0370.0458.001-4																					
Cód. de Barras	7896112123064																					
Cód da Caixa de Embarque	301351																					
Quant. de unidades por CE.	100 unidades																					
Dimensões da CE.	CX/EMB 01A 265X265X216																					
Faca/Dimensões da Cartonagem	F21 50X25X105MM																					
Classe Terapêutica	Glicosídeo Cardíaco																					
Tipo de Tarja	Tarja Vermelha																					
Aliquotas	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ICMS</th> <th>12%</th> <th>17%</th> <th>17,5%</th> <th>18%</th> <th>20%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Preço Fábrica</td> <td>R\$</td> <td>6,35</td> <td>R\$ 6,73</td> <td>R\$ 9,43</td> <td>R\$ 6,82</td> <td>R\$ 6,99</td> </tr> <tr> <td>Preço Consumidor</td> <td>R\$</td> <td>8,78</td> <td>R\$ 9,30</td> <td>R\$ 6,73</td> <td>R\$ 9,43</td> <td>R\$ 9,66</td> </tr> </tbody> </table>		ICMS	12%	17%	17,5%	18%	20%	Preço Fábrica	R\$	6,35	R\$ 6,73	R\$ 9,43	R\$ 6,82	R\$ 6,99	Preço Consumidor	R\$	8,78	R\$ 9,30	R\$ 6,73	R\$ 9,43	R\$ 9,66
	ICMS	12%	17%	17,5%	18%	20%																
Preço Fábrica	R\$	6,35	R\$ 6,73	R\$ 9,43	R\$ 6,82	R\$ 6,99																
Preço Consumidor	R\$	8,78	R\$ 9,30	R\$ 6,73	R\$ 9,43	R\$ 9,66																
Referência	Digoxina - Pharlab (Referência Comercial)																					
Composição	<p>Cada comprimido contém:</p> <p>digoxina0,25mg</p> <p>Excipientes q.s.p.1 comprimido</p> <p>Excipientes: álcool etílico, amido, estearato de magnésio, povidona, manitol, talco, lactose monoidratada, laurilsulfato de sódio, crospovidona e água de osmose reversa.</p>																					
Embalagem Primária	PVC CRISTAL																					
Classificação fiscal	30049079																					
Lista PIS/Confins	Positivo (0%)																					
IPI	0%																					
Validade	24 meses																					
Peso unitário	0,015 kg																					
Peso por Cx. de Embarque	1,500 kg																					

**Sucesso e
Boas Vendas!!!**