

LANÇAMENTO

DILTIAZEM




Comprimido 60mg com 50 unidades

"Medicamento Genérico Lei nº 9.787, de 1999".

"Material de divulgação exclusivo aos profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos".

MERCADO

- > O Laboratório Teuto lança a apresentação genérico de Cloridrato de Diltiazem em seu portfólio. A companhia que já comercializa o Cordil medicamento similar com a qualidade que você já conhece sendo líder de mercado na concentração 60 mg c/50 unidades.



- > O mercado total de Diltiazem vende aproximadamente 148,8 mil unidades por mês, resultando um faturamento de mais de 51,9 milhões de reais no período entre Julho/2019 e Julho/2020.
- > Quanto a participação no mercado, verifica-se que o mesmo é tomado por apresentações com 50 comprimidos, sendo a predominante na concentração de 60 mg que apresenta a maior participação (52%), seguida pela concentração de 30mg (48%). *MAT. Fonte: (Close Up RM - Julho /2020).

COMPARATIVO DE PREÇOS*

DILTIAZEM CPR. 60MG C/ 50

PRODUTO	LABORATÓRIO	20% PF	20% PMC	18% PF	18% PMC	17% PF	17% PMC	12% PF	12% PMC
CARDIZEM	BOEHRINGER ING.	R\$ 43,44	R\$ 60,05	R\$ 42,38	R\$ 58,59	R\$ 41,87	R\$ 57,88	-	-
CORDIL	TEUTO BRASILEIRO	R\$ 25,87	R\$ 35,76	R\$ 25,24	R\$ 34,89	R\$ 24,94	R\$ 34,48	R\$ 23,52	R\$ 32,52
DILTIAZEM	EMS	R\$ 29,95	R\$ 37,26	R\$ 26,29	R\$ 36,34	R\$ 25,98	R\$ 35,92	R\$ 24,50	R\$ 33,87
DILTIAZEM	NOVA QUIMICA	R\$ 27,98	R\$ 38,68	R\$ 27,29	R\$ 37,73	R\$ 26,96	R\$ 37,27	R\$ 25,43	R\$ 35,16
DILTIAZEM	TEUTO	R\$ 25,87	R\$ 35,76	R\$ 25,24	R\$ 34,89	R\$ 24,94	R\$ 34,48	R\$ 23,52	R\$ 32,52

Fonte: Revista Kairos Online/ Agosto 2020

**Os preços contemplam apenas o período de Lançamento do Produto. Caso deseje os preços atualizados, consultar seu gerente ou consultor.*

COMPARATIVO DE PREÇOS*

DILTIAZEM CPR. 60MG C/ 50

PRODUTO	LABORATÓRIO	18% PF	DIF %	DIF R\$
CARDIZEM	BOEHRINGER ING.	R\$ 42,38	40,44%	R\$ 17,14
CORDIL	TEUTO BRASILEIRO	R\$ 25,24	0,00%	R\$ 0,00
DILTIAZEM	EMS	R\$ 26,29	3,99%	R\$ 1,05
DILTIAZEM	NOVA QUIMICA	R\$ 27,29	7,51%	R\$ 2,05
DILTIAZEM	TEUTO	R\$ 25,24		

DILTIAZEM CPR. 60MG C/ 50

PRODUTO	LABORATÓRIO	18% PMC	DIF %	DIF R\$
CARDIZEM	BOEHRINGER ING.	R\$ 58,59	40,45%	R\$ 23,70
CORDIL	TEUTO BRASILEIRO	R\$ 34,89	0,00%	R\$ 0,00
DILTIAZEM	EMS	R\$ 36,34	3,99%	R\$ 1,45
DILTIAZEM	NOVA QUIMICA	R\$ 37,73	7,53%	R\$ 2,84
DILTIAZEM	TEUTO	R\$ 34,89		

**Os preços contemplam apenas o período de Lançamento do Produto. Caso deseje os preços atualizados, consultar seu gerente ou consultor.*

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Condições especiais de lançamento, consulte seu gerente ou consultor.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

cloridrato de diltiazem

Medicamento Genérico Lei nº 9.787, de 1999.

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

O cloridrato de diltiazem é indicado para tratamento de pressão alta, angina pectoris (dores fortes no peito e falta de ar) e coronariopatias (problemas nos vasos que irrigam o coração) acompanhadas ou não de pressão alta e/ou taquicardia (palpitações constantes e duradouras).

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O cloridrato de diltiazem é um antianginoso (reduz as dores fortes no peito), anti-hipertensivo (dilata os vasos sanguíneos reduzindo a pressão arterial) e antiarrítmico (estabiliza o ritmo do coração).

A vantagem de cloridrato de diltiazem em relação aos medicamentos semelhante é que seu efeito ocorre de forma gradual, e isso o torna mais bem tolerado. O efeito se inicia cerca de 3 horas após ser tomado.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve usar cloridrato de diltiazem se tiver problema no sistema que controla o ritmo do coração (nó sinoatrial) e/ou bloqueio atrioventricular de 2º ou 3º grau (problema que altera o ritmo do coração), a não ser que esteja usando marca-passo; insuficiência cardíaca congestiva descompensada (coração inchado descompensado); diminuição acentuada das batidas do coração; alergia a substância ativa ou a qualquer componente da fórmula.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

O cloridrato de diltiazem não age rapidamente, porque a sua substância ativa se encontra na matriz do comprimido e é liberada aos poucos. Em alguns casos, essa matriz não é absorvida no intestino e pode ser encontrada nas fezes. Isso não prejudica o funcionamento do medicamento, uma vez que a substância ativa já foi liberada e absorvida.

Você deve usar cloridrato de diltiazem com cuidado se tiver bloqueio atrioventricular de 1º grau (problema que altera o ritmo do coração); mau funcionamento do coração, com diminuição dos batimentos do coração e pressão arterial excessivamente baixa. Nesses casos, será necessário o controle constante pelo seu médico.

Recomendam-se cuidados especiais nos casos de mau funcionamento do fígado ou dos rins e com pacientes que usam betabloqueadores (propranolol, atenolol) ou digitálicos (digoxina).

Não interrompa o uso de cloridrato de diltiazem sem antes consultar seu médico. Você não deve interromper o tratamento de forma abrupta: deve-se reduzir a dose gradualmente sob acompanhamento médico.

Dependendo da dose usada, podem ocorrer sintomas de pressão baixa. Em casos raros, pode ocorrer aumento das enzimas do fígado.

Idosos devem usar cloridrato de diltiazem com cautela, pois podem ter a duração do seu efeito aumentado.

Efeitos na capacidade de dirigir e operar máquinas

Você não deve dirigir, operar máquinas ou desempenhar atividades perigosas, como trabalhar em lugares altos, durante o tratamento com cloridrato de diltiazem, pois podem ocorrer tonturas.

Gravidez e Amamentação

O uso de cloridrato de diltiazem não é recomendado durante a gravidez ou para mulheres que possam engravidar e na amamentação, por não haver estudos suficientes com essa população. Estudos em animais demonstraram malformações e toxicidade para a prole. Se o tratamento com cloridrato de diltiazem for considerado essencial, a amamentação deve ser interrompida durante o

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

tratamento. O cloridrato de diltiazem é excretado no leite materno.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Interações Medicamentosas

O cloridrato de diltiazem pode aumentar a quantidade no sangue das seguintes substâncias, intensificando seus efeitos: digoxina, metildigoxina (pode ser necessário diminuir a dose devido à toxicidade); anti-hipertensivos (ácido nítrico – deve-se monitorar a pressão); betabloqueadores (como propranolol, atenolol, bisoprolol, carvedilol e outros, usados no tratamento de problemas do coração e de hipertensão arterial), podendo ocorrer mau funcionamento do coração, principalmente se você tiver problemas no músculo do coração; antagonistas do cálcio (nifedipino, anlodipino); midazolam (agente sedativo hipnótico); carbamazepina (antiepiléptico, antimaníaco), podendo ocorrer sonolência, enjoo, vômitos e tonturas; selegilina (antiparkinsoniano), com efeitos tóxicos intensificados; teofilina (broncodilatador), podendo ocorrer enjoo, vômitos, cefaleia e insônia; cilostazol (antiplaquetário); apixabana (anticoagulante oral); vinorelbina (usado no câncer); ciclosporina (usado no reumatismo e pós-transplantes), podendo ocorrer efeitos tóxicos nos rins, sendo necessária a redução da dose; tacrolimo, podendo ocorrer distúrbios renais; fenitoína (antiepiléptico), podendo ocorrer falta de coordenação dos movimentos, tonturas, movimentos oculares oscilatórios, rítmicos e repetitivos, e ainda diminuir o efeito de Cordil®; estatinas (como sinvastatina, atorvastatina, rosuvastatina e outros, usados para reduzir o colesterol no sangue), podendo ocorrer eventos adversos como dor muscular, doenças musculares e raros casos de destruição muscular e podendo ainda causar toxicidade nos rins; relaxantes musculares (pancurônio); imipramina, deve-se monitorar sinais e sintomas de toxicidade da imipramina.

O efeito de cloridrato de diltiazem pode aumentar se usado com agentes antiarrítmicos (como amiodarona, mexiletina); intensificando a depressão da estimulação e condução cardíaca; cimetidina (antiulceroso) e medicamentos para

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

HIV (como ritonavir, saquinavir), aumentando o efeito anti-hipertensivo e bradicardia.

O efeito de cloridrato de diltiazem pode diminuir se usado com anti-inflamatórios não hormonais, especialmente indometacina (utilizado em inflamações e reumatismos) e rifampicina (para tuberculose), neste caso pode ser necessário o aumento da dose de cloridrato de diltiazem ou a substituição deste por outro medicamento.

Os anestésicos têm seu efeito aumentado no coração e na circulação com o uso de cloridrato de diltiazem; portanto, se você for passar por cirurgia, não deixe de informar ao anestesista sobre o uso de cloridrato de diltiazem.

Para todas estas interações, os sintomas devem ser informados ao médico, que poderá alterar a dose dos medicamentos ou interromper o uso.

Informe ao seu médico ou cirurgião dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C). PROTEGER DA LUZ E UMIDADE.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido.

Guarde-o em sua embalagem original.

Características do medicamento: Comprimido circular bicôncavo sem vinco de cor branca.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

O cloridrato de diltiazem deve ser tomado por via oral, com água, nos horários indicados.

A dose prescrita pelo seu médico pode variar de acordo com a sua idade e sintomas. O tratamento deve ser iniciado com 30mg, 4 vezes ao dia, antes das 3 principais refeições do dia e ao deitar.

A dose deve ser aumentada aos poucos, de um em um, ou de dois em dois dias, se for preciso, até chegar a dose certa, que pode variar de 180mg a 240mg ao dia (60mg, 3 a 4 vezes ao dia), conforme recomendado pelo seu médico.

Pacientes idosos devem iniciar o tratamento com baixas doses, sob monitoramento médico.

O cloridrato de diltiazem deve ser administrado com especial cautela em pacientes com mau funcionamento do fígado. A segurança de cloridrato de diltiazem não foi estabelecida em pacientes pediátricos.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e duração do tratamento.

Não interrompa o tratamento sem conhecimento do seu médico.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Continue tomando as próximas doses regularmente no horário habitual. Não duplique a dose na próxima tomada.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou de cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

-Reações comuns: hipersensibilidade (alergia), anorexia (falta de apetite), dor de cabeça profunda, azia.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

-Reações incomuns: tontura, dor de cabeça, bradicardia (batimento lento do coração), bloqueio atrioventricular (problema com o ritmo do coração), rubor (vermelhidão na face), constipação (prisão de ventre), enjojo, dor abdominal, desconforto estomacal, erupção cutânea (rash - vermelhidão, descamação e coceira na pele) e mal-estar.

-Reações raras: palpitação, dispepsia (indigestão), boca seca, prurido (coceira), urticária (placas elevadas na pele, geralmente com coceira), sede, edema periférico (inchaço nas pernas e pés), hipotensão (queda da pressão), sonolência, insônia, parada sinusal (parada no estímulo do coração), dor no peito, câimbras na batata da perna, astenia (sensação de fraqueza), icterícia (coloração amarelada dos olhos e da pele), erupção eritematosa multiforme (erupções bolhosas da pele e mucosa), fezes amolecidas e diarreia.

-Reações com frequência desconhecida: sintomas do tipo Parkinson (como rigidez muscular, tremor no repouso, diminuição da mobilidade e instabilidade postural), alterações no ritmo e mau funcionamento do coração, hipertrofia gengival (crescimento excessivo da gengiva), mau funcionamento do fígado; síndrome de Stevens-Johnson (reação inflamatória grave de pele e também das mucosas, levando à formação de vesículas e bolhas), necrólise epidermal (reação que ocorre grande descamação da pele), eritema multiforme (manifestação grave na pele, com surgimento de bolhas); dermatite esfoliativa (pele avermelhada, escamativa, espessa), pustulose exantemática generalizada aguda (lesões na pele ou mucosa com pus, vermelhidão, descamação e coceira), reação de fotossensibilidade (sensibilidade à luz), ginecomastia (crescimento das mamas em homens), aumento das enzimas do fígado, arritmia (distúrbio do batimento ou ritmo cardíaco), mau funcionamento dos rins, assistolia (interrupção do estímulo elétrico ao coração), parestesia (sensações estranhas na pele de frio, calor e formigamento), tremor, poliúria e/ou nictúria (aumento da urina durante o dia e/ou noite), vômitos, aumento de peso, petéquias (pintas de sangue na pele), aumento do fígado, diminuição da contagem de plaquetas e leucócitos (células brancas), dormência.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Você deve interromper o tratamento com cloridrato de diltiazem se ocorrerem alguns desses sintomas: tontura, mau funcionamento do coração, reações graves da pele, inflamação da pele com esfoliação, pele avermelhada, bolhas, lesões na pele ou mucosa com pus, coceira, febre, erupção da pele, alteração no funcionamento do fígado ou coloração amarelada da pele.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Em caso de dose excessiva de cloridrato de diltiazem, os sintomas variam conforme a quantidade ingerida. Pode ocorrer queda da pressão, batimentos cardíacos muito lentos, alteração no ritmo do coração, mau funcionamento do coração. Busque ajuda médica sem atraso.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

\$UCE\$\$O E BOA\$ VENDA\$!!!

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E MERCADOS



SE É TEUTO,
É DE CONFIANÇA

Ficha: DILTIAZEM**Cód. do produto** 9994**OBS:** Lançamento!**Classe** GF**Denominação genérica** Cloridrato de Diltiazem**Apresentação** Comprimido 60mg c/50**Restrição de uso** Venda sob prescrição médica**Via de administração** Via oral**Nº de MS** 1.0370.0744.001-9**Cód. de Barras** 7896112199946**Cód da Caixa de Embarque** 301384**Quant. de unidades por CE.** 50 unidades**Dimensões da CE.** CX/EMB 02B 265X165X216**Faca/Dimensões da Cartonagem** Faca 22HB**Classe Terapêutica** Benzotiazepina**Tipo de Tarja** Tarja Vermelha

	ICMS	12%	17%	17,5%	18%	19%	20%
Aliquotas	Preço Fábrica	R\$ 23,52	R\$ 24,94	R\$ 25,09	R\$ 25,24	R\$ 25,55	R\$ 25,87
	Preço Consumidor	R\$ 32,52	R\$ 34,48	R\$ 34,69	R\$ 34,89	R\$ 35,32	R\$ 35,76

Referência Cardizem-Boehringer Ingelheim**Composição**

Cada comprimido contém:
cloridrato de diltiazem (equivalente a 55,15mg de diltiazem).....60mg
Excipiente q.s.p.....1 comprimido
Excipientes: lactose monoidratada, celulose microcristalina, dióxido de silício, estearato de magnésio e povidona.

Embalagem Primária Blister de PVDC Branco + alumínio**Classificação fiscal** 30049079**Lista PIS/Confins** Positivo (0%)**IPi** 0%**Validade** 24 meses**Peso unitário** 0,0304 kg**Peso por Cx. de Embarque** 1,520 kg

Sucesso e Boas Vendas!!!