

# LANÇAMENTO

## LEXIN®




### Comprimidos 500mg com 10 unidades


"Material de divulgação exclusivo aos profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos".

# MERCADO

## Mercado Total - Cefalexina cpr. 500mg (MAT - Unids)



## Mercado Total - Cefalexina cpr. 500mh (MAT - Reais)



- O mercado total de Cefalexina na concentração 500mg vende aproximadamente 1,8 milhões de unidades por mês, resultando um faturamento de mais de 528 milhões de reais no período entre Nov/2021 e Nov/2022, neste mesmo período houve uma evolução de 8,2% em unidades e 19,98% em valor, o que demonstra a expansão deste mercado.

\*MAT. Fonte: (Close Up RM – Novembro/2022).

# COMPARATIVO DE

# PREÇOS\*

LEXIN CPR. 500MG C/ 10									
PRODUTO	LABORATÓRIO	20% PF	20% PMC	18% PF	18% PMC	17% PF	17% PMC	12% PF	12% PMC
CEFALEXINA	TEUTO	R\$ 21,02	R\$ 29,06	R\$ 20,51	R\$ 28,37	R\$ 20,27	R\$ 28,02	R\$ 19,12	R\$ 26,43
CEFALEXINA	AUROBINDO	R\$ 19,46	R\$ 26,90	R\$ 18,99	R\$ 26,25	R\$ 18,76	R\$ 25,93	R\$ 17,69	R\$ 24,46
CEFALEXINA	RANBAXY	R\$ 20,81	R\$ 28,77	R\$ 20,30	R\$ 28,06	R\$ 20,06	R\$ 27,73	R\$ 18,92	R\$ 26,16
CEFALEXINA	GERMED PHARMA	R\$ 21,50	R\$ 29,72	R\$ 20,98	R\$ 29,00	R\$ 20,72	R\$ 28,64	R\$ 19,55	R\$ 27,03
CEFALEXINA	EMS	R\$ 28,60	R\$ 39,54	R\$ 27,90	R\$ 38,57	R\$ 27,57	R\$ 38,11	R\$ 26,00	R\$ 35,94
CEFALEXINA	UNIÃO QUÍMICA	R\$ 27,07	R\$ 37,42	R\$ 26,41	R\$ 36,51	R\$ 26,09	R\$ 36,07	R\$ 24,61	R\$ 34,02
CEFALEXINA	MULTILAB	R\$ 27,44	R\$ 37,93	R\$ 26,77	R\$ 37,01	R\$ 26,45	R\$ 36,57	R\$ 24,94	R\$ 34,48
CEFALEXINA	PHARLAB	R\$ 19,53	R\$ 26,99	R\$ 19,05	R\$ 26,33	R\$ 18,82	R\$ 26,02	R\$ 17,75	R\$ 24,54
CEFAGEL	MULTILAB	R\$ 28,13	R\$ 38,89	R\$ 27,44	R\$ 37,93	R\$ 27,11	R\$ 37,48	R\$ 25,57	R\$ 35,35
LEXIN	TEUTO	R\$ 21,06	R\$ 29,11	R\$ 20,55	R\$ 28,41	R\$ 20,30	R\$ 28,06	R\$ 19,15	R\$ 26,27

Fonte: Revista Kairos online Dezembro/2022

# COMPARATIVO DE PREÇOS\*

LEXIN CPR. 500MG C/ 10				
PRODUTO	LABORATÓRIO	18% PF	DIF %	DIF R\$
CEFALEXINA	TEUTO	R\$ 20,51	-30,52%	-R\$ 6,26
CEFALEXINA	AUROBINDO	R\$ 18,99	-40,97%	-R\$ 7,78
CEFALEXINA	RANBAXY	R\$ 20,30	-31,87%	-R\$ 6,47
CEFALEXINA	GERMED PHARMA	R\$ 20,98	-27,60%	-R\$ 5,79
CEFALEXINA	EMS	R\$ 27,90	4,05%	R\$ 1,13
CEFALEXINA	UNIÃO QUÍMICA	R\$ 26,41	-1,36%	-R\$ 0,36
CEFALEXINA	MULTILAB	R\$ 26,77	0,00%	R\$ 0,00
CEFALEXINA	PHARLAB	R\$ 19,05	-40,52%	-R\$ 7,72
CEFAGEL	MULTILAB	R\$ 27,44	2,44%	R\$ 0,67
LEXIN	TEUTO	R\$ 20,55		

\*Os preços contemplam apenas o período de Lançamento do Produto. Caso deseje os preços atualizados, consultar seu gerente ou consultor.

# **CONDIÇÕES COMERCIAIS**

Condições especiais de lançamento, consulte seu gerente ou consultor.

# DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- ✓ ÓTIMO CUSTO / BENEFÍCIO PARA O CONSUMIFOR FINAL;
- ✓ MEDICAMENTO SIMILAR EQUIVALENTE AO MEDICAMENTO REFERÊNCIA;
- ✓ QUALIDADE E RENTABILIDADE TEUTO;
- ✓ MERCADO EM FORTE EXPANSÃO.

# INFORMAÇÕES TÉCNICAS

## Lexin®

Cefalexina

MEDICAMENTO SIMILAR EQUIVALENTE  
AO MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA

### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Lexin® é indicado para o tratamento das seguintes infecções causadas por bactérias sensíveis à cefalexina: sinusites (inflamação dos seios da face), infecções do trato respiratório, otite média (inflamação do ouvido médio), infecções da pele e tecidos moles, infecções ósseas, infecções do trato geniturinário e infecções dentárias.

Nota: De acordo com a história do paciente e aspectos clínicos, o médico poderá indicar a realização de testes de sensibilidade à cefalexina e culturas apropriadas do microrganismo causador.

### 2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Lexin® é contraindicado em pacientes alérgicos às cefalosporinas. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Lexin® está classificado na categoria B de risco na gravidez.

### 3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Antes de iniciar o tratamento com Lexin®, verifique cuidadosamente se você já apresentou reações anteriores de hipersensibilidade (alergia) às cefalosporinas e às penicilinas. Pacientes alérgicos à penicilina devem usar Lexin® com cuidado. Informe ao seu médico se você já teve alguma reação alérgica a antibióticos do tipo das penicilinas ou cefalosporinas.

Há evidências clínicas e laboratoriais que apontam que os pacientes que já são alérgicos às penicilinas e a outras drogas apresentem grande possibilidade de

# INFORMAÇÕES TÉCNICAS

desencadear reação alérgica também as cefalosporinas como a cefalexina. Houve relatos de pacientes que apresentaram reações graves, incluindo anafilaxia (reação violenta a uma segunda dose de algum antígeno) a ambas as drogas.

Houve relatos sobre graves danos ao tecido do cólon intestinal (colite pseudomembranosa) com pacientes em tratamento com antibióticos de amplo espectro (ampla ação) incluindo as cefalosporinas como a cefalexina e outros antibióticos como os macrolídeos e penicilinas semissintéticas. É importante considerar este diagnóstico para pacientes que apresentem diarreia associada ao uso de antibióticos. Essas colites (inflamações do intestino grosso) podem variar de leve a intensa (com risco de vida). Informe ao seu médico sobre a ocorrência de diarreia durante o uso do medicamento.

O uso prolongado ou inadequado da cefalexina, assim como os antibióticos em geral, poderá resultar na proliferação de bactérias resistentes. A observação cuidadosa do paciente é essencial. Se uma superinfecção ocorrer durante a terapia, seu médico deverá tomar as medidas apropriadas.

Para reduzir o desenvolvimento de bactérias resistentes e manter a eficácia da cefalexina, este medicamento deverá ser usado somente para o tratamento ou prevenção de infecções causadas ou fortemente suspeitas de serem causadas por microrganismos sensíveis à cefalexina.

Pacientes com insuficiência renal grave devem usar a cefalexina com cuidado. Essa condição requer observação clínica e exames laboratoriais frequentes, pois a dose segura poderá ser menor do que a usualmente recomendada.

Não há recomendações e advertências quanto ao uso de Lexin® por idosos.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Lexin® está classificado na categoria B de risco na gravidez.

## 4. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Lexin® deve ser administrado por via oral e independente das refeições.

Posologia

# INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Adulto: as doses para adultos variam de 1 a 4g diárias, em doses divididas. A dose usual para adultos é de 250mg a cada 6 horas. Para tratar faringites estreptocócicas, infecções da pele e estruturas da pele e cistites (inflamação da mucosa da bexiga) não complicadas em pacientes acima de 15 anos de idade, uma dose de 500mg ou 1g pode ser administrada a cada 12 horas. O tratamento de cistites deve ser de 7 a 14 dias. Para infecções do trato respiratório, causadas por *S. pneumoniae* e *S. pyogenes*, é necessário usar uma dose de 500mg a cada 6 horas. Infecções mais graves ou causadas por microrganismos menos sensíveis requerem doses mais elevadas. Se houver necessidade de doses diárias de cefalexina acima de 4g, o médico deve considerar o uso de uma cefalosporina injetável, em doses adequadas.

## 5. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

A reação adversa mais frequente tem sido a diarreia, sendo raramente grave o bastante para determinar a interrupção do tratamento. Houve também relatos de dispepsia (indigestão), dor abdominal e gastrite.

Sintomas de colite (inflamação do intestino grosso) pseudomembranosa podem aparecer durante ou após o tratamento com antibiótico. Enjós e vômitos foram relatados raramente. Como acontece com algumas penicilinas ou cefalosporinas, há relatos raros de hepatite (inflamação do fígado) transitória e icterícia (coloração amarela dos tecidos e secreções por presença anormal de pigmentos biliares) colestática.

Foram observadas reações alérgicas na forma de erupções cutâneas, erupções cutâneas com urticária (coceira), angioedema e raramente eritema (vermelhidão da pele) multiforme, síndrome de Stevens-Johnson ou necrólise tóxica epidérmica (morte das células da pele). Essas reações geralmente desaparecem com a suspensão da droga. Pode ser preciso terapia de suporte em alguns casos. Houve também relatos de anafilaxia (reação violenta à segunda dose de algum antígeno). Também ocorreram outras reações como prurido (coceira) anal e genital, monilíase (candidíase) genital, vaginite (inflamação da vagina), corrimento vaginal, tonturas, fadiga (cansaço), dor de cabeça, agitação, confusão, alucinações, artralgia (dor nas

# **INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

articulações), artrite (inflamação nas articulações) e doenças articulares. Houve relatos raros de nefrite intersticial reversível (inflamação dos rins). Eosinofilia, neutropenia, trombocitopenia, anemia hemolítica e elevações moderadas da transaminase glutâmicooxalacética (TGO) e transaminase glutâmico-pirúvica no soro (TGP) têm sido referidas.

**LEXIN® É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. “SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO”.**

**Maiores informações vide a bula.**

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA**

**\$UCE\$\$O E BOA\$ VENDA\$!!!**

# **DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E MERCADOS**



SE É TEUTO,  
É DE CONFIANÇA

**Ficha: Lexin****Cód. do produto** 4706**OBS:** Lançamento!**Classe** AF**Denominação genérica** Cefalexina**Apresentação** Comprimido 500mg. Embalagem contendo 10 comprimidos.**Restrição de uso** Uso adulto**Via de administração** Uso oral**Nº de MS** 1.0370.0770.007-1**Cód. de Barras** 7 896112107064**Cód da Caixa de Embarque** 301351**Quant. de unidades por CE.** 100 Unidades**Dimensões da CE.** CX/EMB 01A 265X265X216**Faca/Dimensões da Cartonagem** Faca 21 - 50x25x105mm**Classe Terapêutica** Antibiótico β-lactâmico dentro da classe da primeira geração de cefalosporinas.**Tipo de Tarja** Vermelha

	ICMS	12%	17%	17,5%	18%	20%
--	------	-----	-----	-------	-----	-----

<b>Aliquotas</b>	Preço Fábrica	R\$ 19,15	R\$ 20,30	R\$ 20,42	R\$ 20,55	R\$ 21,06
	Preço Consumidor	R\$ 26,47	R\$ 28,06	R\$ 28,23	R\$ 28,41	R\$ 29,11

**Referência** Keflex - Laboratórios Bagó

Cada comprimido contém:  
 cefalexina monoidratada (equivalente a 500mg de  
 cefalexina).....526mg  
 Excipientes q.s.p.....1 comprimido  
 Excipientes: água para injetáveis, amido, corante amarelo crepúsculo, estearato de magnésio,  
 croscarmelose sódica e crospovidona.

**Embalagem Primária** PVC Cristal**Classificação fiscal** 30042052**Lista PIS/Confins** Positivo (0%)**IPI** 0%**Validade** 24 meses**Peso unitário** 0,017 kg**Peso por Cx. de Embarque** 1,700 kg

## Sucesso e Boas Vendas!!!