

RELANÇAMENTO



TENOFTAL



Solução Oftálmica 5% c/ 5mL

"Material de divulgação exclusivo aos profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos".

MERCADO



- > O mercado total de Timolol vende aproximadamente 544 mil de unidades por mês, resultando um faturamento de mais de 54, 1 milhões de reais no período entre Mar 2020 e Mar/2021. *MAT. Fonte: (Close Up RM – Mar /2021).

COMPARATIVO DE PREÇOS

TENOFTAL SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5% c/ 5 ML

PRODUTO	LABORATÓRIO	20% PF	20% PMC	18% PF	18% PMC	17% PF	17% PMC	12% PF	12% PMC
TIMOLOL	TEUTO	R\$ 8,10	R\$ 11,20	R\$ 7,89	R\$ 10,91	R\$ 7,81	R\$ 10,79	R\$ 7,36	R\$ 10,18
TIMOLOL	ACHE	R\$ 7,70	R\$ 10,64	R\$ 7,51	R\$ 10,38	R\$ 7,42	R\$ 10,26	R\$ 7,00	R\$ 9,68
TIMOLOL	EMS	R\$ 9,11	R\$ 12,59	R\$ 8,89	R\$ 12,29	R\$ 8,78	R\$ 12,14	R\$ 8,28	R\$ 11,45
TIMOLOL	GERMED PHARMA	R\$ 8,28	R\$ 11,45	R\$ 8,07	R\$ 11,16	R\$ 7,98	R\$ 11,03	R\$ 7,52	R\$ 10,40
TIMOLOL	NEO QUIMICA	R\$ 7,78	R\$ 10,76	R\$ 7,59	R\$ 10,49	R\$ 7,49	R\$ 10,35	R\$ 7,07	R\$ 9,77
TIMOLOL	NOVARTIS	R\$ 9,26	R\$ 12,80	R\$ 9,04	R\$ 12,50	R\$ 8,93	R\$ 12,35	R\$ 8,42	R\$ 11,64
TIMOLOL	ALLERGAN	R\$ 10,25	R\$ 14,17	R\$ 10,00	R\$ 13,82	R\$ 9,88	R\$ 13,66	R\$ 9,32	R\$ 12,88
TIMOLOL	CRISTALIA	R\$ 8,92	R\$ 12,33	R\$ 8,71	R\$ 12,04	R\$ 8,60	R\$ 11,88	R\$ 8,11	R\$ 11,21
TIMOLOL	LEGRAND	R\$ 9,09	R\$ 12,57	R\$ 8,87	R\$ 12,26	R\$ 8,76	R\$ 12,11	R\$ 8,26	R\$ 11,42
GLAUCOTRAT	UNIAO QUIMICA	R\$ 9,84	R\$ 13,60	R\$ 9,60	R\$ 13,27	R\$ 9,48	R\$ 13,11	R\$ 8,95	R\$ 12,37
TIMOPTOL	MUNDIPHARMA	R\$ 14,03	R\$ 19,40	R\$ 13,68	R\$ 18,91	R\$ 13,52	R\$ 18,69	R\$ 12,75	R\$ 17,63
TIMOPTOL XE	MUNDIPHARMA	R\$ 48,36	R\$ 66,85	R\$ 47,18	R\$ 65,22	R\$ 46,61	R\$ 64,44	R\$ 43,97	R\$ 60,79
TIMONEO	NEO QUIMICA	R\$ 9,53	R\$ 13,17	R\$ 9,29	R\$ 12,84	R\$ 9,18	R\$ 12,69	R\$ 8,66	R\$ 11,97
GLAUTIMOL	ALCON	R\$ 9,91	R\$ 13,70	R\$ 9,67	R\$ 13,37	R\$ 9,55	R\$ 13,20	R\$ 9,01	R\$ 12,46
TENOFTAL	TEUTO	R\$ 7,65	R\$ 10,57	R\$ 7,46	R\$ 10,31	R\$ 7,37	R\$ 10,19	R\$ 6,95	R\$ 9,61

Fonte: Revista Kairos online Abril/2021

**Os preços contemplam apenas o período de Lançamento do Produto. Caso deseje os preços atualizados, consultar seu gerente ou consultor.*

COMPARATIVO DE PREÇOS

TENOFTAL SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5% c/ 5 ML

PRODUTO	LABORATÓRIO	18% PF	DIF %	DIF R\$
TIMOLOL	TEUTO	R\$ 7,89	5,45%	R\$ 0,43
TIMOLOL	ACHE	R\$ 7,51	0,67%	R\$ 0,05
TIMOLOL	EMS	R\$ 8,89	16,09%	R\$ 1,43
TIMOLOL	GERMED PHARMA	R\$ 8,07	7,56%	R\$ 0,61
TIMOLOL	NEO QUIMICA	R\$ 7,59	1,71%	R\$ 0,13
TIMOLOL	NOVARTIS	R\$ 9,04	17,48%	R\$ 1,58
TIMOLOL	ALLERGAN	R\$ 10,00	25,40%	R\$ 2,54
TIMOLOL	CRISTALIA	R\$ 8,71	14,35%	R\$ 1,25
TIMOLOL	LEGRAND	R\$ 8,87	15,90%	R\$ 1,41
GLAUCOTRAT	UNIAO QUIMICA	R\$ 9,60	22,29%	R\$ 2,14
TIMOPTOL	MUNDIPHARMA	R\$ 13,68	45,47%	R\$ 6,22
TIMOPTOL XE	MUNDIPHARMA	R\$ 47,18	84,19%	R\$ 39,72
TIMONEO	NEO QUIMICA	R\$ 9,29	19,70%	R\$ 1,83
GLAUTIMOL	ALCON	R\$ 9,67	22,85%	R\$ 2,21
TENOFTAL	TEUTO	R\$ 7,46		

**Os preços contemplam apenas o período de Lançamento do Produto. Caso deseje os preços atualizados, consultar seu gerente ou consultor.*

COMPARATIVO DE PREÇOS

TENOFTAL SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5% c/ 5 ML

PRODUTO	LABORATÓRIO	18% PMC	DIF %	DIF R\$
TIMOLOL	TEUTO	R\$ 10,91	5,50%	R\$ 0,60
TIMOLOL	ACHE	R\$ 10,38	0,67%	R\$ 0,07
TIMOLOL	EMS	R\$ 12,29	16,11%	R\$ 1,98
TIMOLOL	GERMED PHARMA	R\$ 11,16	7,62%	R\$ 0,85
TIMOLOL	NEO QUIMICA	R\$ 10,49	1,72%	R\$ 0,18
TIMOLOL	NOVARTIS	R\$ 12,50	17,52%	R\$ 2,19
TIMOLOL	ALLERGAN	R\$ 13,82	25,40%	R\$ 3,51
TIMOLOL	CRISTALIA	R\$ 12,04	14,37%	R\$ 1,73
TIMOLOL	LEGRAND	R\$ 12,26	15,91%	R\$ 1,95
GLAUCOTRAT	UNIAO QUIMICA	R\$ 13,27	22,31%	R\$ 2,96
TIMOPTOL	MUNDIPHARMA	R\$ 18,91	45,48%	R\$ 8,60
TIMOPTOL XE	MUNDIPHARMA	R\$ 65,22	84,19%	R\$ 54,91
TIMONEO	NEO QUIMICA	R\$ 12,84	19,70%	R\$ 2,53
GLAUTIMOL	ALCON	R\$ 13,37	22,89%	R\$ 3,06
TENOFTAL	TEUTO	R\$ 10,31		

**Os preços contemplam apenas o período de Lançamento do Produto. Caso deseje os preços atualizados, consultar seu gerente ou consultor.*

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Condições especiais de lançamento, consulte seu gerente ou consultor.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tenofтал

maleato de timolol

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Tenofтал® foi prescrito para reduzir o aumento da pressão ocular no tratamento de glaucoma e/ou hipertensão ocular. A pressão ocular elevada pode comprometer o nervo óptico, resultando em deterioração da visão e possível cegueira. Em geral, existem alguns sintomas que você pode sentir e que indicam se você apresenta pressão ocular elevada. O exame médico é necessário para a determinação desta doença. Se ocorrer aumento da pressão intraocular, será necessário fazer exames e medidas da pressão intraocular regularmente.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Tenofтал® é um medicamento oftálmico betabloqueador que diminui a pressão intraocular. O mecanismo de ação preciso de Tenofтал® na diminuição da pressão intraocular não está claramente estabelecido. A ação do Tenofтал® geralmente tem início rápido, ocorrendo aproximadamente 20 minutos após a aplicação tópica no olho.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve usar Tenofтал® se:

- tem ou teve certos problemas respiratórios graves, como asma;
- tem doença pulmonar obstrutiva crônica;
- tem alguns tipos de doenças cardíacas (como batimentos cardíacos lentos ou irregulares);
- for alérgico a qualquer um de seus ingredientes.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Se não tiver certeza se deve utilizar Tenoftal®, entre em contato com seu médico ou farmacêutico.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Informe seu médico sobre quaisquer problemas de saúde que esteja apresentando ou tenha apresentado:

- problemas cardíacos (como doença coronariana, insuficiência cardíaca ou pressão sanguínea baixa);
- distúrbios de frequência cardíaca (como batimentos cardíacos irregulares ou lentos);
- problemas de má circulação sanguínea (como a síndrome de Raynaud);
- problemas pulmonares ou respiratórios (como asma ou doença pulmonar obstrutiva crônica);
- diabetes ou outros problemas relacionados ao açúcar sanguíneo;
- doença da tireoide.

Informe ao seu médico que você está usando Tenoftal® antes de realizar uma cirurgia, já que ele pode alterar os efeitos de alguns medicamentos durante a anestesia.

Informe também o seu médico se você tem alergia a qualquer medicamento. Se suspeitar que Tenoftal® está causando reação alérgica (por exemplo, erupção cutânea ou vermelhidão e coceira nos olhos), interrompa o tratamento e entre em contato com seu médico imediatamente.

Informe seu médico se tiver uma infecção ou sofrer um traumatismo ocular, se precisar se submeter a uma cirurgia ocular ou se desenvolver reação ocular, incluindo sintomas novos ou piora dos sintomas.

Tenoftal® contém cloreto de benzalcônio como conservante. Esse conservante pode ser absorvido por lentes de contato gelatinosas. Se você for usuário(a) de lentes de contato gelatinosas, consulte seu médico antes de usar Tenoftal®. Se

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

permitido, remova as lentes antes da aplicação de Tenofthal® e aguarde 15 minutos após a aplicação para recolocá-las.

Uso na gravidez e lactação: informe seu médico se você está grávida ou pretende engravidar. Seu médico irá decidir se você deve usar Tenofthal®. Não use Tenofthal® se estiver amamentando. Consulte seu médico, caso pretenda amamentar.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Uso em crianças: Tenofthal® pode ser utilizado em crianças, desde que prescrito por seu médico, porém não é recomendado para crianças abaixo de 2 anos de idade. A posologia usual para crianças é de uma gota de Tenofthal® a cada 12 horas no(s) olho(s) afetado(s).

Dirigir ou operar máquinas: existem efeitos adversos associados ao uso deste produto que podem afetar sua capacidade de conduzir veículos ou operar máquinas (veja 8. QUAIS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?).

Este medicamento pode causar doping.

Interações medicamentosas: informe ao seu médico sobre todos os medicamentos, incluindo outros colírios, que você está usando ou pretende usar, incluindo aqueles obtidos sem prescrição médica. É particularmente importante informar seu médico se estiver tomando medicamentos para reduzir a pressão arterial ou para tratamento de doenças cardíacas, diabetes ou depressão.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?
CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C). PROTEGER DA LUZ E UMIDADE.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Após aberto, válido por 28 dias.

Características do medicamento: Solução límpida incolor.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.


6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Instruções de uso:

Não deixe que a ponta do frasco toque o(s) olho(s) ou as áreas ao redor do(s) olho(s). Ela pode ficar contaminada com bactérias que podem causar infecções oculares levando a lesões graves dos olhos, até mesmo perda da visão. A fim de evitar uma possível contaminação, mantenha a ponta do frasco longe do contato com qualquer superfície.

NÃO AGITAR ANTES DE USAR.

1. Retire a tampa do frasco.
2. Incline o frasco a 90° (posição vertical), conforme a ilustração abaixo.



3. Incline sua cabeça para trás e puxe levemente sua pálpebra inferior para formar uma bolsa entre a sua pálpebra e o seu olho, conforme a ilustração abaixo.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



NÃO TOQUE A PONTA DO FRASCO NOS OLHOS OU NAS PÁLPEBRAS.

Se manuseados inadequadamente, os medicamentos oftálmicos podem ser contaminados por bactérias comuns, conhecidas por causar infecções oculares. O uso de medicamentos oftálmicos contaminados pode causar lesões oculares graves e perda da visão. Se você suspeitar que seu medicamento possa estar contaminado ou se você desenvolver uma infecção ocular, contate seu médico imediatamente.

4. Aperte levemente o frasco plástico, para gotejar o produto;

5. Goteje a quantidade recomendada e feche o frasco após o uso.

6. Após o uso de Tenoftal®, pressione com o dedo o canto do seu olho próximo ao nariz (conforme demonstrado na figura) por 2 minutos. Isso ajuda a manter o produto no seu olho.

7. Repita os passos 2, 3, 4, 5 e 6 para aplicar o medicamento no outro olho, se esta tiver sido a recomendação do seu médico.

8. A ponta gotejadora foi projetada para liberar uma única gota; portanto, NÃO alargue o furo da ponta gotejadora.

9. Após o uso de todas as doses, ainda restará um pouco de Tenoftal® no frasco. Não se preocupe, pois foi adicionada uma quantidade extra do medicamento para que não faltasse nenhuma dose prescrita; portanto, não tente remover esse excesso do frasco.

Posologia

Seu médico irá estabelecer a dose e a duração adequadas do tratamento. A dose usual inicial é de uma gota de Tenoftal® no(s) olho(s) afetado(s) pela manhã e à noite.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Para alguns pacientes, se a pressão ocular for mantida em níveis satisfatórios, seu médico poderá prescrever Tenoftal® para ser utilizado uma vez por dia. Em alguns casos, seu médico poderá prescrever outro medicamento, incluindo outros colírios, juntamente com Tenoftal®, para ajudar a diminuir a pressão de seu(s) olho(s). Não altere a dose do medicamento sem consultar seu médico. Se tiver de interromper o tratamento, entre em contato com seu médico imediatamente.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Use Tenoftal® conforme prescrito pelo seu médico. Se você se esquecer de aplicar uma dose, aplique-a assim que possível; no entanto, se já estiver perto do horário da próxima dose, ignore a dose esquecida e volte ao esquema posológico regular.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Qualquer medicamento pode apresentar efeitos não esperados ou indesejáveis, chamados de reações adversas. Apesar de não ocorrerem todas essas reações adversas, caso ocorram, você pode precisar de cuidados médicos.

Você pode apresentar irritação ocular, incluindo queimação e pontadas, ressecamento e vermelhidão dos olhos ou alterações da visão, tais como visão dupla. Além disso, os seguintes efeitos adversos podem ocorrer: zumbido, dor de cabeça, cansaço, tontura, depressão, insônia, pesadelos, perda da memória, formigamento, náusea, diarreia, distúrbios estomacais, ressecamento da boca, dor

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

torácica, desmaio, palpitações, batimento cardíaco irregular, redução da frequência cardíaca, inchaço e esfriamento das mãos e dos pés, falta de ar, tosse, queda de cabelo, erupções na pele, coceira ou outros tipos de reações alérgicas mais graves, dor muscular, disfunção sexual e diminuição do desejo sexual.

Outras reações adversas podem ocorrer raramente (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento) e algumas delas podem ser graves. Pergunte ao seu médico ou farmacêutico mais informações sobre as reações adversas. Eles têm uma lista mais completa dessas reações.

Informe seu médico prontamente sobre qualquer um desses ou outros sintomas.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Se você aplicar muitas gotas em seu olho ou engolir parte do conteúdo do frasco, entre outros efeitos, você pode ter tontura, dificuldade para respirar ou sentir que sua frequência cardíaca diminuiu. Entre em contato com seu médico imediatamente.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

"Tenofal é um medicamento. Durante seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas."

"SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO"

\$UCE\$\$O E BOA\$ VENDA\$!!!

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E MERCADOS



SE É TEUTO,
É DE CONFIANÇA

Ficha: TENOFTAL 5% SOL OFT 5ML
Cód. do produto 9739

OBS: Relançamento!

Classe AF

Denominação genérica Maleato de timolol

Apresentação Embalagem contendo 01 frasco com 5mL

Restrição de uso USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 02 ANOS

Via de administração Uso oftálmico

Nº de MS 1.0370.0628.001-8

Cód. de Barras 7896112197393

Cód da Caixa de Embarque 405420

Quant. de unidades por CE. 100 Unidades

Dimensões da CE. F-09A - 35x35x90mm

Faca/Dimensões da Cartonagem CX/EMB 81A(367x185x185mm)

Classe Terapêutica Antiglaucomatosos

Tipo de Tarja Tarja vermelha

	ICMS	12%	17%	17,5%	18%	19%	20%
Aliquotas	Preço Fábrica	R\$ 6,95	R\$ 7,37	R\$ 7,42	R\$ 7,46	R\$ 7,55	R\$ 7,65
	Preço Consumidor	R\$ 9,61	R\$ 10,19	R\$ 10,26	R\$ 10,31	R\$ 10,43	R\$ 10,57

Referência Timoptol - Mundipharma

Composição

Cada mL (30 gotas) da solução oftálmica contém:
 maleato de timolol (equivalente a 5mg de timolol).....6,8341mg
 Veículo q.s.p.....1mL

Excipientes: fosfato de sódio dibásico, fosfato de sódio monobásico, hidróxido de sódio, cloreto de benzalcônio e água para injetáveis.

Cada gota equivale a aproximadamente 0,17mg de timolol.

Embalagem Primária Frasco plástico polietileno 70% PEBD / 30% PEAD

Classificação fiscal 30049079

Lista PIS/Confins Positiva (0%)

IPI 0%

Validade 24 meses

Peso unitário 0,02 Kg

Peso por Cx. de Embarque 2 Kg

Sucesso e Boas Vendas!!!