



SE É TEUTO,
É DE CONFIANÇA

Diltiazem

O cloridrato de diltiazem é indicado para tratamento de pressão alta, angina pectoris (dores fortes no peito e falta de ar) e coronariopatias (problemas nos vasos que irrigam o coração) acompanhadas ou não de pressão alta e/ou taquicardia (palpitações constantes e duradouras). Referência: Cardizem- Boehringer Ingelheim



1.0370.0744.001-9- Cloridrato de Diltiazem - Comprimido 60mg caixa c/50- "Medicamento Genérico - Lei nº 9.787/99"

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? Indicado no tratamento de pressão alta, angina pectoris e coronariopatias acompanhadas ou não de pressão alta e/ou taquicardia. 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA? Diltiazem é um antianginoso, anti-hipertensivo (dilata os vasos sanguíneos reduzindo a pressão arterial) e antiarritmico (estabiliza o ritmo do coração). O efeito se inicia cerca de 3 horas após ser tomado. 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Não usar diltiazem se tiver problema no nó sinusal e/ou bloqueio atrioventricular de 2º ou 3º grau, e não ser que esteja usando marca-passo; insuficiência cardíaca congestiva descompensada; diminuição acentuada das batidas do coração; alergia a qualquer componente da fórmula. 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS: Diltiazem se encontra na matriz do comprimido e é liberado aos poucos. Essa matriz pode não ser absorvida no intestino e aparecer nas fezes. Isso não prejudica o funcionamento do medicamento. PRECAUÇÕES: Use diltiazem com cuidado e sob controle médico constante se tiver bloqueio atrioventricular de 1º grau, mau funcionamento do coração, com diminuição dos batimentos e pressão arterial muito baixa. Tenha cuidados especiais nos casos de mau funcionamento do fígado ou rins e com pacientes que usam betabloqueadores ou digitálicos. Não interrompa seu uso de forma abrupta e sem o acompanhamento do médico. O uso em idosos deve ser feito com cautela, pois podem ter a duração do efeito aumentado. Você não deve dirigir, operar máquinas ou desempenhar atividades perigosas, durante o tratamento com diltiazem, pois podem ocorrer tonturas. O uso de diltiazem não é recomendado durante a gravidez ou mulheres que possam engravidar e na amamentação. Diltiazem é excretado no leite materno. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Diltiazem pode intensificar os efeitos de: digoxina, J-hipertensivos; betabloqueadores; antagonistas do cálcio; midazolam; carbamazepina; teofilina; fenitoína; estatinas; entre outras substâncias. O efeito de diltiazem pode aumentar se usado com: agentes antiarrítmicos; cimetiídina e medicamentos para HIV; e pode diminuir se usado com: AINEs e rifampicina. Os anestésicos têm seu efeito aumentado com o uso de diltiazem. Informe seu médico ou cirurgião dentista se você está fazendo uso de algum medicamento. Não use medicamento sem conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a saúde. 5. ONDE E COMO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO? Conservar em temperatura ambiente (15 a 30°C). Proteger da luz e umidade. Observe sempre a validade na embalagem. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? USO ADULTO, VIA ORAL. A dose prescrita pelo médico pode variar, usualmente é iniciado com 30mg, 4 vezes ao dia, antes das 3 refeições e ao deitar. A dose deve ser aumentada aos poucos, até chegar na dose certa, que pode variar de 180mg a 240mg ao dia, conforme recomendação médica. Idosos devem iniciar com baixas doses, sob monitoramento médico. Administrar com especial cautela em pacientes com mau funcionamento do fígado. Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e duração do tratamento. 7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO? Continue tomando as próximas doses no horário habitual. Não duplique a dose na próxima tomada. Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou do médico. 8. QUAIS OS EFEITOS QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? Reações comuns: alergia, anorexia, dor de cabeça e azia. Reações incomuns: tontura, bradicardia, bloqueio atrioventricular, rubor, desconforto gastrointestinal, erupção cutânea e mal-estar. Reações raras: palpitação, hipotensão e dor no peito, entre outras (vide bula). Existem outras reações com frequência desconhecida (vide bula). Você deve interromper o tratamento se ocorrer: tontura, mau funcionamento do coração ou do fígado (coloração amarelada da pele), reações graves da pele, coceira ou febre. Informe seu médico ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento. 9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTA MEDICAMENTO? Em caso de dose excessiva de diltiazem pode ocorrer queda da pressão, alteração no ritmo e mau funcionamento do coração. Procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.

"SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO."

CLORIDRATO DE DILTIAZEM É UM MEDICAMENTO. DURANTE SEU USO, NÃO DIRIJA VEÍCULOS OU OPERE MÁQUINAS, POIS SUA AGILIDADE E ATENÇÃO PODEM ESTAR PREJUDICADAS.