



SE É TEUTO,
É DE CONFIANÇA



Losartana + Hidroclorotiazida (Hipertensão Arterial)

É um medicamento indicado para o tratamento de pacientes com hipertensão. Seus ativos, além de baixar a pressão arterial, também ajudam a reduzir o risco de derrame cerebral (AVC) e de ataque cardíaco (infarto). Referência: Hyzaar - Organon

Nov/23

MS. 1.0370.0739 – Losartana + Hidroclorotiazida - 50/12,5mg c/ 30 e 100/25mg c/ 30 comprimidos revestidos – “Medicamento Genérico – Lei nº 9.787-99”.

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? Tratamento da hipertensão. Em pacientes com pressão alta e hipertrofia do ventrículo esquerdo, a losartana, frequentemente em combinação com a hidroclorotiazida, reduz o risco de acidente vascular cerebral e de infarto do miocárdio. 2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Você não deve tomar este medicamento se for alérgico a qualquer um de seus ingredientes; for alérgico a derivados das sulfonamidas; não estiver urinando; for diabético e está tomando um medicamento chamado alisquireno para reduzir a pressão arterial. 3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: importante que seu médico saiba se você tem doença do fígado ou dos rins, gota, diabetes, lúpus eritematoso ou se usa outros diuréticos. Antes de cirurgia e anestesia, informe ao médico (ou dentista) que usa losartana potássica + hidroclorotiazida. Informe ao médico se já teve câncer de pele ou se desenvolver alguma nova lesão de pele durante o tratamento. Se sentir falta de ar grave ou dificuldade em respirar depois de tomar losartana potássica + hidroclorotiazida, pare a medicação e procure atendimento imediatamente. Não deve ser usado no 2º e 3º trimestres da gravidez. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez. Não deve ser administrado a pacientes pediátricos. Este medicamento pode causar doping. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: em geral, este medicamento pode ser tomado com outros medicamentos. Você deve informar ao seu médico sobre todos os medicamentos que tome. É especialmente importante informar ao seu médico se está tomando: suplementos de potássio; agentes poupadores de potássio; substitutos de sal contendo potássio, ou outros medicamentos que possam aumentar o nível sérico de potássio; outros medicamentos para reduzir a pressão sanguínea; outros diuréticos; resinas que reduzem os níveis altos de colesterol; medicamentos para tratar diabetes incluindo insulina; relaxantes musculares; aminas pressoras como a adrenalina; esteróides; alguns analgésicos e medicamentos para artrite; lítio; suco de toranja (que deve ser evitado durante o tratamento com losartana potássica + hidroclorotiazida). Sedativos, tranquilizantes, narcóticos, álcool e analgésicos podem aumentar o efeito redutor da pressão arterial de losartana potássica + hidroclorotiazida, portanto informe ao seu médico se estiver tomando qualquer um desses medicamentos. 4. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO: Pressão alta: a dose usual de losartana potássica + hidroclorotiazida para a maioria dos pacientes com pressão alta é de 1 comprimido 50/12,5mg por dia. Se você não responder adequadamente ao tratamento com 50/12,5mg, o seu médico poderá aumentar a dose para 1 comprimido de 100/25mg uma vez ao dia ou 2 comprimidos de 50/12,5mg uma vez ao dia. A dose máxima é de 1 comprimido de 100/25mg uma vez ao dia ou 2 comprimidos de 50/12,5mg uma vez ao dia. 5. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? Os efeitos adversos podem incluir náusea, vômitos, cólicas, diarreia, constipação, dor de cabeça, fraqueza, tontura, fadiga, urticária, erupção cutânea, alteração de paladar, visão turva momentânea ou aumento da sensibilidade da pele ao sol. Outro efeito adverso pode ser a sensação de tontura ou atordoamento devido a uma queda súbita na pressão sanguínea quando se levanta rapidamente. Seu médico possui uma lista mais completa dos efeitos adversos. Informe ao seu médico imediatamente se você apresentar esses sintomas ou outros sintomas incomuns. Se apresentar uma reação alérgica com inchaço da face, dos lábios, da garganta e/ou da língua que possa dificultar sua respiração ou capacidade de engolir, pare de tomar losartana potássica + hidroclorotiazida e procure seu médico imediatamente. A hidroclorotiazida, componente deste medicamento, pode causar: aumento da sensibilidade da pele ao sol e pode aumentar o risco de alguns tipos de câncer de pele e lábios (câncer de pele não melanoma), falta de ar grave ou dificuldade em respirar. 6. Uso oral. Uso adulto. Venda sob prescrição médica.

LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. “SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO”

Material informativo exclusivo para a equipe de venda do medicamento