

# Ibuprofeno



SE É TEUTO,  
É DE CONFIANÇA

(Anti-inflamatório /Antirreumático /Analgésico)

Ibuprofeno tem ação contra a inflamação (reação de defesa do organismo a uma agressão) dor e febre. Ibuprofeno é indicado no alívio dos sinais e sintomas de osteoartrite (lesão crônica das articulações ou “juntas”) e artrite reumatoide (inflamação crônica das “juntas” causada por reações autoimunes, quando o sistema de defesa do corpo agride por engano ele próprio), reumatismo articular (inflamação das “juntas”), nos traumas relacionados ao sistema musculoesquelético (como entorse do tornozelo e dor nas costas) e alívio da dor após procedimentos cirúrgicos em Odontologia, Ginecologia, Ortopedia, Traumatologia e Otorrinolaringologia.

Referência: Capsfen - Catalent



AGO/2022

MS. 1.0370.0762 – Ibupril Caps – Ibuprofeno cápsula gel. mole 600 mg c/10; MS. 1.0370.0757 – Ibuprofeno cápsula gel. mole 600 mg c/10 – Medicamento Genérico – Lei 9787-99

PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? Ibupril Caps e Ibuprofeno são indicados no alívio dos sinais e sintomas de artrite reumatoide, osteoartrite, reumatismo articular, nos traumas relacionados ao sistema musculoesquelético e no alívio da dor após procedimentos cirúrgicos em odontologia, ginecologia, ortopedia, traumatologia e otorrinolaringologia. 2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? O uso de ibuprofeno é contra-indicado a pacientes com hipersensibilidade ao ibuprofeno, a qualquer componente da fórmula ou a outros anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) tais como ácido acetilsalicílico, nimesulida e diclofenaco sódico. A associação de ácido acetilsalicílico e ibuprofeno pode provocar reações anafilatóides e reações asmáticas fatais. Também é contra-indicado para pacientes com insuficiência cardíaca, renal ou hepática grave. Ibuprofeno não deve ser usado por mulheres grávidas sem orientação médica. 3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Deve-se evitar o uso concomitante de ibuprofeno com anti-inflamatórios não esteroidais incluindo os inibidores da COX-2 como celecoxibe e parecoxibe. Alguns efeitos e alterações foram relatados com o uso de ibuprofeno, caso apresente algum deles procure imediatamente o médico e suspenda o uso, são: efeitos cardíacos – aumento no risco de eventos trombóticos cardiovasculares graves, infarto do miocárdio e derrame, que podem ser fatais; retenção de líquido/edema; efeitos gastrointestinais – inflamação, sangramento, ulceração, perfuração do estômago, intestino delgado ou grosso que podem ser fatais; efeitos hepáticos – icterícia e hepatite fatal; efeitos oftalmológicos – diminuição da acuidade visual e/ou visão turva, alterações na visão em cores; reações cutâneas – dermatite esfoliativa, descamação da pele acompanhada de bolhas e necrólise epidérmica tóxica e efeitos renais – nefrite intersticial, glomerulite, necrose papilar e síndrome nefrótica. Ibuprofeno não deve ser usado por pacientes com sensibilidade ao ácido salicílico e deve ser usado com cautela por pacientes idosos, com asma preexistente, com defeitos intrínsecos da coagulação ou que estejam utilizando anticoagulantes. Foram observadas anormalidades em testes laboratoriais com o uso de ibuprofeno. Para maiores informações, vide bula. Ibuprofeno não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou que estejam amamentando sem orientação médica. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: O uso de ibuprofeno concomitante com alguns medicamentos podem aumentar ou reduzir o efeito deles, além de aumentar as chances de efeitos adversos graves. Portanto, informe sempre o médico sobre o uso dos seguintes medicamentos antes de iniciar o tratamento com ibuprofeno: anticoagulantes, anti-hipertensivos, diuréticos, ácido acetilsalicílico, corticosteroides, ciclosporinas, lítio, ranitidina ou cimetidina, metotrexato e tacrolimo. 4. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Uso adulto e oral. A dose recomendada é de 600mg 3 ou 4 vezes ao dia, não excedendo a dose diária total de 3.200mg. A posologia deve ser adequada a cada caso clínico de acordo com a gravidade dos sintomas. Nos casos de artrite reumatoide juvenil, recomenda-se administrar 30 – 40mg/kg/dia, em doses divididas. 5. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? Existe a probabilidade de relação causal com o ibuprofeno para as seguintes reações adversas: distúrbios do sangue e do sistema linfático, distúrbios do sistema imune, distúrbios metabólicos e nutricionais, distúrbios psiquiátricos, distúrbios do sistema nervoso, distúrbios visuais, distúrbios do ouvido e labirinto, distúrbios cardíacos, distúrbios vasculares, distúrbios respiratórios, distúrbio hepatobiliar, distúrbios da pele e tecido subcutâneo, distúrbios renais e urinários e distúrbios laboratoriais. Para maiores detalhes, vide bula. 6. Uso adulto – Uso Oral – VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.

NÃO USE IBUPRIL CAPS E IBUPROFENO EM CASOS DE ÚLCERAS, GASTRITE, DOENÇAS DOS RINS OU SE VOCÊ JÁ TEVE REAÇÕES ALÉRGICAS A ANTI-INFLAMATÓRIOS. IBUPRIL CAPS E IBUPROFENO SÃO MEDICAMENTOS. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.  
“SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO”

Material informativo exclusivo para a equipe de venda do medicamento