



SE É TEUTO,
É DE CONFIANÇA



Cloridrato de Venlafaxina

(Antidepressivo)

O cloridrato de venlafaxina está indicado para: Tratamento da depressão, incluindo depressão com ansiedade associada. Prevenção de recaída e recorrência da depressão. Tratamento de ansiedade ou transtorno de ansiedade generalizada (TAG), incluindo tratamento em longo prazo. Tratamento do transtorno de ansiedade social (TAS), também conhecido como fobia social. Tratamento do transtorno do pânico, com ou sem agorafobia, conforme definido no DSM-IV Referência: Efexor - Pfizer

Abril/2023

MS. 1.0370.0763 - Cloridrato de Venlafaxina 75mg e 150mg com 30 cápsulas dura de liberação controlada. "Medicamento Genérico - Lei 9.787/99"

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? Indicada no tratamento da depressão, incluindo depressão com ansiedade associada, para prevenção de recaída e recorrência da depressão. Também indicada para o tratamento de transtorno de ansiedade generalizada e de fobia social. 2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Não deve ser usado por alérgicos a qualquer componente da fórmula e, por pacientes recebendo antidepressivos da classe dos inibidores da monoaminooxidase, como tranilcipromina, selegilina, rasagilina e linezolid. É contraindicado para uso em menores de 18 anos. 3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Pacientes tratados devem ser atentamente observados quanto à piora clínica e risco de suicídio. Evite consumir álcool durante o tratamento. A venlafaxina deve ser usada com cuidado em pacientes portadores de insuficiência renal ou hepática. Pode ocorrer crises de hipertensão, logo deve-se fazer monitoramento da pressão arterial e acompanhamento médico. Recomenda-se acompanhamento rigoroso dos pacientes com pressão intraocular elevada ou com risco de glaucoma. Este medicamento não deve ser usado por grávidas e lactantes sem orientação médica. Pode prejudicar o raciocínio ou habilidades motoras. Cuidado ao realizar atividades que exigem concentração, tais como dirigir ou operar máquinas. Este medicamento contém açúcar e deve ser usado com cautela em portadores de diabetes. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: O uso concomitante de venlafaxina com medicamentos que aumentam a predisposição ao sangramento pode aumentar o risco de sangramentos espontâneos. O uso de venlafaxina com outros antidepressivos, antipsicóticos, anfetaminas e antagonistas da dopamina pode aumentar o risco de aparecimento da síndrome serotoninérgica. A venlafaxina pode interferir nos resultados dos testes de urina para avaliar a presença de fenciclidina e anfetaminas. Informe ao seu médico se você está fazendo uso outros medicamentos. 4. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO: Para depressão maior, TAG e fobia social a dose inicial recomendada é de 75mg, administrada 1 vez por dia. Os pacientes que não respondem à dose inicial de 75mg/dia podem beneficiar-se com o aumento da dose até, no máximo, 225mg/dia. A dose deve ser reduzida gradualmente de acordo com as instruções do seu médico. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do médico. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado. Deve ser administrada com alimentos, aproximadamente no mesmo horário todos os dias. 5. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? Reação muito comum: Insônia, dor de cabeça, tontura, sedeção, náusea, boca seca, constipação. Reação comum: Diminuição do apetite, sonhos anormais, nervosismo, diminuição da libido, agitação, falta de prazer sexual ou orgasmo, inquietude, tremor, dormência e formigamento, alteração do paladar, deficiência visual, midríase, zumbido no ouvido, taquicardia, palpitação, hipertensão, ondas de calor, dispnéia, bocejos, diarreia, vômito, erupção cutânea, prurido, suor noturno, hipertonía, hesitação urinária, retenção urinária, polaciúria, disfunção erétil, ejaculação anormal, fadiga, fraqueza, calafrios, perda de peso, aumento de peso. Outras reações adversas comuns, incomuns e raras, podem ocorrer com o uso de venlafaxina, estas e outras informações estão disponíveis na íntegra na bula. Antes de usar venlafaxina leia a bula com atenção. 6. Uso oral. Uso adulto. Venda sob prescrição médica com retenção de receita.

CLORIDRATO DE VENLAFAXINA É UM MEDICAMENTO.
DURANTE O SEU USO NÃO DIRIJA VEÍCULOS OU OPERE MÁQUINAS,
POIS SUA HABILIDADE E ATENÇÃO PODEM ESTAR PREJUDICADAS.
"SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO"

Material informativo exclusivo para a equipe de venda do medicamento