

Omeprazol

(Antiulceroso)



SE É TEUTO,
É DE CONFIANÇA

O omeprazol está indicado para tratamento das úlceras benignas gástrica e duodenal; de esofagite de refluxo, da Síndrome de Zollinger-Ellison, de manutenção para prevenção de recidiva em pacientes com úlcera duodenal, pacientes com úlcera gástrica pouco responsivos e tratamento de manutenção para pacientes com esofagite de refluxo cicatrizada; tratamento de pacientes que apresentam risco de aspiração de conteúdo gástrico durante anestesia geral, tratamento da erradicação do *Helicobacter pylori* associado à úlcera péptica.



Novembro/22

MS. 1.0370.0357 - Omeprazol 20 mg caixas com 28 e 56 cápsulas – Medicamento Genérico – Lei nº 9.787 de 1999.

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? Indicado para tratar produção excessiva de ácido no estômago, como nas úlceras gástricas e duodenais; refluxo gastroesofágico. Usado também com antibióticos para tratar infecções por *Helicobacter pylori*. Tratamento da doença de Zollinger-Ellison, dispepsia ou para evitar sangramento do trato gastrointestinal superior em pacientes seriamente doentes. 2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Não deve ser usado por alérgicos ao omeprazol ou outro componente da fórmula. 3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Antes de usar omeprazol, informe seu médico sobre a presença de: reação alérgica a quaisquer medicamentos; outros tipos de alergias (como a alimento, corante, conservante ou a animais). Avise seu médico se você apresentar: doença no fígado ou história de doença hepática. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Este medicamento tem e deve ser usado com cautela em portadores de diabetes. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: O uso de omeprazol com alguns tipos de medicamentos não é recomendado, mas poderá ser necessário. Nesses casos, seu médico poderá alterar a dose e a frequência dos medicamentos, como por exemplo: atazanavir, clorazepato, delavirdine, metotrexato. A utilização de álcool e tabaco também pode causar interações com alguns medicamentos. Converse com seu médico a respeito. Informe ao seu médico se você usa algum outro medicamento. 4. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO: Ingerir antes da alimentação, de preferência pela manhã; Adultos: a posologia usual é de 20mg uma vez ao dia. Crianças com mais de 1 ano de idade: 10mg em dose única administrada pela manhã. Crianças acima de 20kg: 20mg. Caso a criança tenha dificuldade para engolir, as cápsulas podem ser abertas e o seu conteúdo pode ser misturado com líquido (água ou suco de frutas; mas não em leite) e ingerido imediatamente. A duração do tratamento será determinada pelo médico, assim como dosagens individualizadas diferentes da usual. 5. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? Reação comum (ocorre entre ≥1% e <10% dos pacientes): cefaleia (dor de cabeça), diarreia, constipação, dor abdominal, náusea, flatulência (gases), vômito, regurgitação, infecção do trato respiratório superior, tontura, rash (erupção cutânea), astenia (fraqueza), dor nas costas e tosse. Reação incomum: (ocorre entre ≥0,1% e <1%): parestesia (sensação de formigamento), sonolência, insônia, vertigem. Aumento das enzimas hepáticas. Erupção ou prurido, urticária, mal-estar. Várias outras reações adversas mais raras, incluindo algumas graves, estão descritas na íntegra na bula do medicamento. Leia a bula com atenção antes de fazer uso do Omeprazol. 6. Uso oral. Uso adulto e pediátrico. Venda sob prescrição médica.

OMEPRAZOL É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS.
PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.
“SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO”

Material informativo exclusivo para a equipe de venda do medicamento.