



SE É TEUTO,
É DE CONFIANÇA



Indicação: tratamento de
micoses na pele ou nas unhas



Posologia: 1 vez ao dia



Pode ser tomado com
ou sem alimentos



Terbinafina (Antimicótico)

Julho/24

MS. 1.0370.0707 - Cloridrato de terbinafina 250mg c/ 28 cpr. "Medicamento Genérico - Lei nº 9787/99".

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? Indicado para Onicomicose (infecção fúngica da unha); Infecções fúngicas da pele causadas por Tinea corporis, Tinea cruris e Tinea pedis; infecções cutâneas causadas por leveduras do gênero Candida albicans. 2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Não tome terbinafina se você for alérgico a qualquer componente da fórmula; se você tem ou teve qualquer problema do fígado ou renal. 3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Antes e periodicamente após iniciar o tratamento com terbinafina seu médico deve realizar exames de sangue para monitorar sua função hepática. Se você apresentar fraqueza, sangramento não usual, ferimento ou infecções frequentes (sinais de distúrbios sanguíneos); se você está tomando ou tomou recentemente outro medicamento informe ao médico. Informe seu médico, se você está amamentando, grávida ou desconfia que esteja grávida. Você não deve tomar cloridrato de terbinafina durante a gravidez, a menos que claramente aconselhado pelo seu médico. Se você sentir tontura enquanto estiver tomando cloridrato de terbinafina comprimidos, não dirija ou opere máquinas. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: informe ao seu médico ou farmacêutico se você estiver tomando ou tomou recentemente qualquer medicamento, incluindo fitoterápicos, anticoncepcionais orais e medicamentos sem necessidade de prescrição médica. Alguns outros medicamentos podem interagir com cloridrato de terbinafina, entre eles: cimetidina, fluconazol, cetoconazol, rifampicina, alguns antidepressivos, como por exemplo os tricíclicos, inibidores seletivos da recombinação de serotonina incluindo as classes IA, IB e IC, entre outros. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. 4. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO: A duração do tratamento varia de acordo com a indicação, o local afetado e a gravidade da infecção. Em adultos a dose usual é de 1 comprimido de 250 mg, uma vez ao dia. O cloridrato de terbinafina comprimidos pode ser tomado com o estômago vazio ou depois de uma refeição. Este medicamento não deve ser partido ou mastigado. 5. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? Algumas reações são muito comuns (mais de 10% dos pacientes): dor de cabeça, náuseas, dor abdominal leve, desconforto estomacal após refeição (azia), diarreia, inchaço ou flatulência (sensação de plenitude gástrica), perda do apetite, erupções cutâneas, dores musculares e nas articulações. Algumas reações são comuns (entre 1% e 10% dos pacientes): distúrbio de humor (depressão), perturbação ou perda de sentido do paladar, tonturas, distúrbio ocular e cansaço. Algumas reações são incomuns (entre 0,1% e 1% dos pacientes): pele pálida anormal, revestimento das mucosas ou cristais nas unhas, cansaço, fraqueza ou falta de ar por esforços (possíveis sinais de uma doença que afeta o nível de glóbulos vermelhos), ansiedade, formigamento ou dormência e diminuição da sensibilidade da pele, aumento da sensibilidade da pele ao sol, ruídos (assobios) nos ouvidos, febre e perda de peso. Outras informações estão descritas na íntegra na bula. 6. Uso oral. Uso adulto. Venda sob prescrição médica.

TERBINAFINA É UM MEDICAMENTO. DURANTE SEU USO, NÃO DIRIJA VEÍCULOS OU OPERE MÁQUINAS, POIS SUA AGILIDADE E ATENÇÃO PODEM ESTAR PREJUDICADAS. "SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO"

Material informativo exclusivo para a equipe de venda do medicamento

6340 - 7896112163404