

RELANÇAMENTO

ALBENDAZOL




Suspensão Oral 40mg/mL fr 10mL

"Medicamento Genérico Lei nº 9.787, de 1999".


"Material de divulgação exclusivo aos profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos".

MERCADO

Mercado Total - Albendazol (Unids)




Mercado Total - Albendazol (Reais)




> O mercado total de Albendazol tem vendas de aproximadamente 2,7 milhões de unidades por mês e faturamento de mais de 186,4 milhões de reais no último ano. (RM Close up - Novembro/2017).

MERCADO

Mercado Total - Albendazol Suspensão (Unids)



Mercado Total - Albendazol Suspensão (Reais)



- > O mercado total de suspensão oral vende aproximadamente 990 mil unidades por mês, gerando um faturamento de mais de 70 milhões no último ano.

COMPARATIVO DE PREÇOS*

ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP FR 10ML

PRODUTO	LABORATÓRIO	19% PF	19% PMC	18% PF	18% PMC	17% PF	17% PMC	12% PF	12% PMC
ZENTEL	GSK	R\$ 10,37	R\$ 14,34	R\$ 10,12	R\$ 13,99	R\$ 10,00	R\$ 13,82	R\$ 9,43	R\$ 13,04
PARASIN	ACHÉ	R\$ 8,38	R\$ 11,58	R\$ 8,18	R\$ 11,31	R\$ 8,08	R\$ 11,17	R\$ 7,62	R\$ 10,53
MEBENIX	CIMED	R\$ 7,32	R\$ 10,12	R\$ 7,14	R\$ 9,88	R\$ 7,06	R\$ 9,76	R\$ 6,66	R\$ 9,20
ALBEL	GEOLAB	R\$ 5,90	R\$ 8,16	R\$ 5,76	R\$ 7,96	R\$ 5,69	R\$ 7,87	R\$ 5,37	R\$ 7,42
ZOLBEN	SANOI	R\$ 8,29	R\$ 11,46	R\$ 8,09	R\$ 11,18	R\$ 7,99	R\$ 11,05	R\$ 7,54	R\$ 10,42
ALBENTEL	TEUTO	R\$ 5,96	R\$ 8,24	R\$ 5,81	R\$ 8,03	R\$ 5,74	R\$ 7,94	R\$ 5,42	R\$ 7,49
NEO BENDAZOL	NEO QUÍMICA	R\$ 6,28	R\$ 8,68	R\$ 6,13	R\$ 8,47	R\$ 6,05	R\$ 8,37	R\$ 5,71	R\$ 7,89
ALBENDAZOL	NEO QUÍMICA	R\$ 4,19	R\$ 5,79	R\$ 4,09	R\$ 5,65	R\$ 4,04	R\$ 5,58	R\$ 3,81	R\$ 5,26
ALBENDAZOL	NOVA QUÍMICA	R\$ 6,73	R\$ 9,30	R\$ 6,57	R\$ 9,08	R\$ 6,49	R\$ 8,97	R\$ 6,12	R\$ 8,46
ALBENDAZOL	LEGRAND	R\$ 5,95	R\$ 8,23	R\$ 5,80	R\$ 8,02	R\$ 5,73	R\$ 7,92	R\$ 5,40	R\$ 7,47
ALBENDAZOL	PRATI-DONADUZZI	R\$ 4,69	R\$ 6,48	R\$ 4,58	R\$ 6,33	R\$ 4,52	R\$ 6,25	R\$ 4,27	R\$ 5,90
ALBENDAZOL	EMS	R\$ 6,46	R\$ 8,93	R\$ 6,30	R\$ 8,71	R\$ 6,22	R\$ 8,60	R\$ 5,87	R\$ 8,11
ALBENDAZOL	TEUTO	R\$ 4,45	R\$ 6,15	R\$ 4,34	R\$ 6,00	R\$ 4,28	R\$ 5,92	R\$ 4,04	R\$ 5,59

Fonte: Kairos online Dezembro/2017

**Os preços contemplam apenas o período de Lançamento do Produto. Caso deseje os preços atualizados, consultar seu gerente ou consultor.*

COMPARATIVO DE PREÇOS*

ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP FR 10ML

PRODUTO	LABORATÓRIO	18% PF	DIF %	DIF R\$
ZENTEL	GSK	R\$ 10,12	57,11%	R\$ 5,78
PARASIN	ACHÉ	R\$ 8,18	46,94%	R\$ 3,84
MEBENIX	CIMED	R\$ 7,14	39,22%	R\$ 2,80
ALBEL	GEOLAB	R\$ 5,76	24,65%	R\$ 1,42
ZOLBEN	SANOFI	R\$ 8,09	46,35%	R\$ 3,75
ALBENTEL	TEUTO	R\$ 5,81	25,30%	R\$ 1,47
NEO BENDAZOL	NEO QUÍMICA	R\$ 6,13	29,20%	R\$ 1,79
ALBENDAZOL	NEO QUÍMICA	R\$ 4,09	-6,11%	-R\$ 0,25
ALBENDAZOL	NOVA QUÍMICA	R\$ 6,57	33,94%	R\$ 2,23
ALBENDAZOL	LEGRAND	R\$ 5,80	25,17%	R\$ 1,46
ALBENDAZOL	PRATI-DONADUZZI	R\$ 4,58	5,24%	R\$ 0,24
ALBENDAZOL	EMS	R\$ 6,30	31,11%	R\$ 1,96
ALBENDAZOL	TEUTO	R\$ 4,34		

**Os preços contemplam apenas o período de Lançamento do Produto. Caso deseje os preços atualizados, consultar seu gerente ou consultor.*

COMPARATIVO DE PREÇOS*

ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP FR 10ML				
PRODUTO	LABORATÓRIO	18% PMC	DIF %	DIF R\$
ZENTEL	GSK	R\$ 13,99	57,11%	R\$ 7,99
PARASIN	ACHÉ	R\$ 11,31	46,95%	R\$ 5,31
MEBENIX	CIMED	R\$ 9,88	39,27%	R\$ 3,88
ALBEL	GEOLAB	R\$ 7,96	24,62%	R\$ 1,96
ZOLBEN	SANOFI	R\$ 11,18	46,33%	R\$ 5,18
ALBENTEL	TEUTO	R\$ 8,03	25,28%	R\$ 2,03
NEO BENDAZOL	NEO QUÍMICA	R\$ 8,47	29,16%	R\$ 2,47
ALBENDAZOL	NEO QUÍMICA	R\$ 5,65	-6,19%	-R\$ 0,35
ALBENDAZOL	NOVA QUÍMICA	R\$ 9,08	33,92%	R\$ 3,08
ALBENDAZOL	LEGRAND	R\$ 8,02	25,19%	R\$ 2,02
ALBENDAZOL	PRATI-DONADUZZI	R\$ 6,33	5,21%	R\$ 0,33
ALBENDAZOL	EMS	R\$ 8,71	31,11%	R\$ 2,71
ALBENDAZOL	TEUTO	R\$ 6,00		

**Os preços contemplam apenas o período de Lançamento do Produto. Caso deseje os preços atualizados, consultar seu gerente ou consultor.*

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Condições especiais de lançamento, consulte seu gerente ou consultor.

INFORMAÇÕES

Albendazol

"Medicamento Genérico Lei nº 9.787, de 1999".

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

O albendazol é usado para tratar uma grande variedade de condições causadas por vermes ou parasitas. Estudos mostram que o albendazol é eficaz no tratamento de infecções por *Ascaris lumbricoides*, *Enterobius vermicularis*, *Necator americanus*, *Ancylostoma duodenale*, *Trichuris trichiura*, *Strongyloides stercoralis*, *Taenia spp.* e *Hymenolepis nana*; de opistorquíase (*Opisthorchis viverrini*) e larva migrans cutânea; e de giardíase (*Giardia lamblia*, *G. duodenalis*, *G. intestinalis*) em crianças.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O albendazol pertence a uma classe de compostos anti-helmínticos e antiparasitários benzimidazólicos. O albendazol tem a capacidade de eliminar vermes e parasitas do seu corpo, matando-os.

INFORMAÇÕES

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Contraindicações

Não use este medicamento se:

- você for hipersensível (alérgico) ao albendazol, a medicamentos similares ao albendazol (como mebendazol e tiabendazol) ou a qualquer outro componente da fórmula;
- você está grávida, suspeita de gravidez ou planeja engravidar.

Gravidez e lactação

O albendazol não deve ser administrado durante a gravidez nem a mulheres que possam estar grávidas ou pensem em engravidar. Não se sabe se o albendazol ou seus metabólitos são excretados no leite materno. Fale com seu médico. Este medicamento não deve ser usado durante a amamentação, a não ser que os benefícios potenciais para a mãe justifiquem os possíveis riscos para o filho.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Este medicamento é contraindicado para menores de 2 anos.

INFORMAÇÕES

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Advertências

Avise seu médico antes de começar a usar este medicamento:

- se você planeja ficar grávida, está grávida ou desconfia estar grávida;
- se você está amamentando.

O tratamento com albendazol pode revelar casos de neurocisticercose pré-existente (infecção de sistema nervoso central causada pela ingestão da larva de *Taenia spp* que se caracteriza pela presença de lesões intracerebrais calcificadas), principalmente em áreas de alta incidência de teníase. Quando estiver usando o medicamento, nesse caso, a terapia com esteroides e anticonvulsivantes deve ser iniciada imediatamente, procure seu médico.

Caso você apresente convulsão ou outros sintomas neurológicos quando estiver usando o medicamento, nesse caso, a terapia com esteroides e anticonvulsivantes deve ser iniciada imediatamente, procure seu médico.

Precauções

Para evitar futuras infecções por germes ou parasitas, você deve tomar algumas medidas de prevenção.

MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO CONTRA VERMINOSES:

1. Manter limpas as instalações sanitárias e lavar as mãos após utilizá-las.
2. Evitar andar descalço.
3. Cortar e manter limpas as unhas.
4. Beber água filtrada ou fervida.
5. Lavar e cozinhar bem os alimentos.

INFORMAÇÕES

6. Manter os alimentos e os depósitos de água cobertos.
7. Combater os insetos.
8. Lavar as mãos antes das refeições.
9. Lavar os utensílios domésticos.
10. Ferver as roupas íntimas e de cama.

ESSAS MEDIDAS SE ESTENDEM A TODOS OS MEMBROS DA FAMÍLIA.

Interações com medicamentos, alimentos e exames laboratoriais

Os comprimidos de albendazol podem ser tomados durante ou após as refeições ou de estômago vazio.

De modo geral, você pode continuar a tomar outros medicamentos durante o tratamento com albendazol, exceto se estiver fazendo uso de cimetidina, praziquantel e dexametasona, pois estes medicamentos podem provocar o aumento da concentração dos metabólitos do medicamento no sangue. Já o ritonavir, a fenitoína, a carbamazepina e o fenobarbital podem reduzir as concentrações do metabólito do medicamento no sangue; quando estes forem usados concomitantemente com albendazol.

Não se observaram interações relevantes com alimentos nem com exames laboratoriais.

Informe seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento de seu médico. Pode ser perigoso para sua saúde.

INFORMAÇÕES

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C). PROTEGER DA LUZ E UMIDADE.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Características do medicamento:

Suspensão homogênea de cor camurça com aroma e sabor de baunilha. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6 . COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Modo de usar

A suspensão deve ser bem agitada antes do uso.

Não há necessidade de procedimentos especiais, tais como dieta ou uso de agentes purgantes.

Siga a orientação do médico sobre a dose e os horários corretos da medicação que você deve adotar. Não tome mais do que o médico receitou. É melhor administrar ou tomar albendazol na mesma hora todos os dias.

INFORMAÇÕES

Se você não apresentar melhora após três semanas, fale com o médico. Um segundo ciclo de tratamento pode ser necessário.

Posologia:

Indicações	Idade	Dose	Período
<i>Ascaris lumbricoides</i> <i>Necator americanus</i> <i>Trichuris trichiura</i>	Adultos e crianças acima de 2 anos de idade	400mg (1 comprimido de 400mg)	Dose única
<i>Enterobius vermicularis</i> <i>Ancylostoma duodenale</i>	Adultos e crianças acima de 2 anos de idade	400mg (1 comprimido de 400mg)	Dose única
<i>Strongyloides stercoralis</i> <i>Taenia sp.</i> <i>Hymenolepis nana</i>	Adultos e crianças acima de 2 anos de idade	400mg (1 comprimido de 400mg)	1 dose por dia durante 3 dias
Giardiase (<i>Giardia lamblia</i> , <i>G. duodenalis</i> , <i>G. intestinalis</i>)	Crianças de 2 a 12 anos de idade	400mg (1 comprimido de 400mg)	1 dose por dia durante 5 dias
Larva migrans cutânea	Adultos e crianças acima de 2 anos de idade	400mg (1 comprimido de 400mg)	1 dose por dia por 1 a 3 dias
Opistorquíase (<i>Opisthorchis viverrini</i>)	Adultos e crianças acima de 2 anos de idade	400mg (1 comprimido de 400mg)	2 doses por dia durante 3 dias

No caso de infestação por *Enterobius vermicularis*, fale com seu médico, que dará orientações sobre medidas de higiene tanto para você quanto para as pessoas que utilizam a mesma moradia.

INFORMAÇÕES

No caso de contaminação comprovada por *Hymenolepis nana*, você também deve conversar com o médico, que pode recomendar um segundo ciclo de tratamento.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento de seu médico.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Se você esquecer uma dose, tome-a assim que se lembrar e mantenha o horário normal da próxima dose. No entanto, se ao perceber que deixou de tomar uma dose você já estiver no horário da próxima, pule a dose esquecida e continue usando o medicamento nos horários normais.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico ou cirurgião-dentista.

INFORMAÇÕES

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Alguns efeitos indesejáveis relacionados ao uso de albendazol estão descritos abaixo. Se você apresentar esses ou outros sintomas causados pelo uso do medicamento, informe seu médico.

Reações incomuns (ocorrem de 0,1% a 1% dos pacientes que utilizam este medicamento): dor epigástrica ou abdominal, dor de cabeça, vertigem, enjoo, vômito ou diarreia.

Reações raras (ocorrem de 0,01% a 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento): alergias e elevações dos níveis de algumas enzimas do fígado.

Reações muito raras (ocorrem em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento): vermelhidão da pele, uma doença conhecida como síndrome de Stevens-Johnson, caracterizada por vermelhidão intensa, descamação da pele e lesões, com possibilidade de sintomas sistêmicos (que abrangem todo o organismo) graves.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

INFORMAÇÕES

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Se você acidentalmente ingerir mais albendazol do que lhe foi receitado, avise seu médico imediatamente. Ele deverá tomar as providências adequadas. Em alguns casos pode ser necessário fazer lavagem gástrica ou tomar medidas gerais de suporte.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações

\$UCE\$\$O E BOA\$ VENDAS!!!

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E MERCADOS



SE É TEUTO,
É DE CONFIANÇA

Ficha: ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP 10ML GEN**Cód. do produto** 0790**OBS:** Relançamento!!**Classe** GE**Denominação genérica** Albendazol**Apresentação** Caixa com 1 fr x 10mL**Restrição de uso** Venda sob prescrição médica**Via de administração** Uso Oral**Nº de MS** 1.0370.0313.001-5**Cód. de Barras** 7896112147909**Cód da Caixa de Embarque** 404045**Quant. de unidades por CE.** 100 Unidades**Dimensões da CE.** CX/EMB 30A (367x85x185mm) LAP ESQUERDO**Faca/Dimensões da Cartonagem** 35x35x90mm**Classe Terapêutica** Anti-helmínticos do trato gastrointestinal**Tipo de Tarja** Tarja vermelha

	ICMS	12%	17%	17,5%	18%	19%	20%					
Aliquotas												
Preço Fábrica	R\$	4,04	R\$	4,28	R\$	4,31	R\$	4,34	R\$	4,39	R\$	4,45
Preço Consumidor	R\$	5,59	R\$	5,92	R\$	5,96	R\$	6,00	R\$	6,07	R\$	6,15

Referência ZENTEL - Glaxosmithkline

Composição

Cada mL da suspensão oral contém:

Albendazol).....40mg

veículo - q.s.p.1mL

Embalagem Primária Frasco Vidro**Classificação fiscal** 30049063**Lista PIS/Confins** Positivo (0%)**IPi** 0%**Validade** 24 meses**Peso unitário** 0,044kg**Peso por Cx. de Embarque** 4,400kg

**Sucesso e
Boas Vendas!!!**