

LANÇAMENTO

ATORVASTATINA




Comprimido revestido 20mg c/30

"Medicamento Genérico Lei nº 9.787, de 1999".


"Material de divulgação exclusivo aos profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos".

MERCADO

Mercado Total - ATORVASTATINA (MAT - Unids)



Mercado Total - ATORVASTATINA (MAT - Reais)



- > O mercado total da molécula de atorvastatina comprimido vende aproximadamente 12 milhões de unidades por ano, resultando um faturamento de mais de 1 bilhão no período entre Agosto/2022 e Agosto/2023*, resultando em uma evolução de 9,85% ao ano em unidades e 25,22% em valor.

Fonte: (Close Up RM – Agosto/2023)

COMPARATIVO DE PREÇOS*

ATORVASTATINA CPR. REV. 20 MG C/ 30 GEN									
PRODUTO	LABORATÓRIO	20% PF	20% PMC	18% PF	18% PMC	17% PF	17% PMC	12% PF	12% PMC
ATORVASTATINA	EMS	R\$ 59,00	R\$ 81,56	R\$ 57,56	R\$ 79,57	R\$ 56,87	R\$ 78,62	R\$ 53,64	R\$ 74,15
ATORVASTATINA	NOVARTIS	R\$ 30,23	R\$ 41,79	R\$ 29,49	R\$ 40,77	R\$ 29,13	R\$ 40,27	R\$ 27,48	R\$ 37,99
ATORVASTATINA	GEOLAB	R\$ 70,04	R\$ 96,83	R\$ 68,33	R\$ 94,46	R\$ 67,51	R\$ 93,33	R\$ 63,67	R\$ 88,02
ATORVASTATINA	EUROFARMA	R\$ 56,24	R\$ 77,75	R\$ 54,87	R\$ 75,85	R\$ 54,20	R\$ 74,93	R\$ 51,13	R\$ 70,68
ATORVASTATINA	LEGRAND	R\$ 58,23	R\$ 80,50	R\$ 56,80	R\$ 78,52	R\$ 56,12	R\$ 77,58	R\$ 52,93	R\$ 73,17
ATORVASTATINA	NOVA QUIMICA	R\$ 58,23	R\$ 80,50	R\$ 56,80	R\$ 78,52	R\$ 56,12	R\$ 77,58	R\$ 52,93	R\$ 73,17
ATORVASTATINA	NEO QUIMICA	R\$ 51,28	R\$ 70,89	R\$ 50,02	R\$ 69,15	R\$ 49,42	R\$ 68,32	R\$ 46,61	R\$ 64,44
ATORVASTATINA	MEDLEY	R\$ 66,81	R\$ 92,36	R\$ 65,18	R\$ 90,11	R\$ 64,40	R\$ 89,03	R\$ 60,74	R\$ 83,97
ATORVASTATINA	CIMED	R\$ 46,69	R\$ 64,55	R\$ 45,55	R\$ 62,97	R\$ 45,00	R\$ 62,21	R\$ 42,44	R\$ 58,67
ATORVASTATINA	GERMED PHARMA	R\$ 58,49	R\$ 80,86	R\$ 57,06	R\$ 78,88	R\$ 56,37	R\$ 77,93	R\$ 53,17	R\$ 73,50
ATORVASTATINA	SANDOZ	R\$ 41,99	R\$ 58,05	R\$ 40,96	R\$ 56,62	R\$ 40,47	R\$ 55,95	R\$ 38,17	R\$ 52,77
LIPITOR	MYLAN	R\$ 162,36	R\$ 224,45	R\$ 158,40	R\$ 218,98	R\$ 156,49	R\$ 216,34	R\$ 147,60	R\$ 204,05
VAST	EUROFARMA	R\$ 65,91	R\$ 91,12	R\$ 64,30	R\$ 88,89	R\$ 63,53	R\$ 87,83	R\$ 59,92	R\$ 82,84
ATEROMA	SUPERA RX	R\$ 65,91	R\$ 91,12	R\$ 64,30	R\$ 88,89	R\$ 63,53	R\$ 87,83	R\$ 59,92	R\$ 82,84
TORVILIP	NOVA QUIMICA	R\$ 59,14	R\$ 81,76	R\$ 57,70	R\$ 79,77	R\$ 57,00	R\$ 78,80	R\$ 53,76	R\$ 74,32
CITALOR	VIATRIS	R\$ 107,78	R\$ 149,00	R\$ 105,15	R\$ 145,36	R\$ 103,88	R\$ 143,61	R\$ 97,98	R\$ 135,45
LIPISTAT	EMS	R\$ 63,03	R\$ 87,14	R\$ 61,49	R\$ 85,01	R\$ 60,75	R\$ 83,98	R\$ 57,30	R\$ 79,21
ATORVASTATINA	TEUTO	R\$ 43,19	R\$ 59,71	R\$ 42,13	R\$ 58,24	R\$ 41,63	R\$ 57,55	R\$ 39,26	R\$ 54,27

Fonte: Kairos online Setembro/2023

**Os preços contemplam apenas o período de Lançamento do Produto. Caso deseje os preços atualizados, consultar seu gerente ou consultor.*

COMPARATIVO DE PREÇOS*

ATORVASTATINA CPR. REV. 20 MG C/ 30 GEN				
PRODUTO	LABORATÓRIO	18% PF	DIF %	DIF R\$
ATORVASTATINA	EMS	R\$ 57,56	26,81%	R\$ 15,43
ATORVASTATINA	NOVARTIS	R\$ 29,49	-42,86%	-R\$ 12,64
ATORVASTATINA	GEOLAB	R\$ 68,33	38,34%	R\$ 26,20
ATORVASTATINA	EUROFARMA	R\$ 54,87	23,22%	R\$ 12,74
ATORVASTATINA	LEGRAND	R\$ 56,80	25,83%	R\$ 14,67
ATORVASTATINA	NOVA QUIMICA	R\$ 56,80	25,83%	R\$ 14,67
ATORVASTATINA	NEO QUIMICA	R\$ 50,02	15,77%	R\$ 7,89
ATORVASTATINA	MEDLEY	R\$ 65,18	35,36%	R\$ 23,05
ATORVASTATINA	CIMED	R\$ 45,55	7,51%	R\$ 3,42
ATORVASTATINA	GERMED PHARMA	R\$ 57,06	26,17%	R\$ 14,93
ATORVASTATINA	SANDOZ	R\$ 40,96	-2,86%	-R\$ 1,17
LIPITOR	MYLAN	R\$ 158,40	73,40%	R\$ 116,27
VAST	EUROFARMA	R\$ 64,30	34,48%	R\$ 22,17
ATEROMA	SUPERA RX	R\$ 64,30	34,48%	R\$ 22,17
TORVILIP	NOVA QUIMICA	R\$ 57,70	26,98%	R\$ 15,57
CITALOR	VIATRIS	R\$ 105,15	59,93%	R\$ 63,02
LIPISTAT	EMS	R\$ 61,49	31,48%	R\$ 19,36
ATORVASTATINA	TEUTO	R\$ 42,13		

**Os preços contemplam apenas o período de Lançamento do Produto. Caso deseje os preços atualizados, consultar seu gerente ou consultor.*

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Condições especiais de lançamento, consulte seu gerente ou consultor.

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- ✓ **PRODUTO DE ÓTIMO VALOR AGREGADO;**
- ✓ **PRODUTO DE USO CONTÍNUO OU PROLONGADO – FIDELIZAÇÃO DO CLIENTE;**
- ✓ **TEMOS UM PREÇO MUITO COMPETITIVO;**
- ✓ **ÓTIMO CUSTO / BENEFÍCIO PARA O CONSUMIDOR FINAL;**
- ✓ **GARANTIA DA QUALIDADE DE UM GENÉRICO TEUTO;**
- ✓ **PODE SER USADO POR CRIANÇAS A PARTIR DOS 10 ANOS DE IDADE;**
- ✓ **MERCADO EM FORTE CRESCIMENTO.**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

atorvastatina

Medicamento Genérico Lei nº 9.787, de 1999.

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

A atorvastatina cálcica comprimidos revestidos é indicado para tratamento de:

- hipercolesterolemia (aumento da quantidade de colesterol no sangue) isolada;
- hipercolesterolemia associada à hipertrigliceridemia (aumento dos níveis sanguíneos de outro tipo de gordura);
- hipercolesterolemia associada à redução dos níveis sanguíneos de HDL (tipo de colesterol);
- hipercolesterolemia associada à hipertrigliceridemia e associado também a redução dos níveis sanguíneos de HDL.

Inclusive hipercolesterolemias de transmissão genética/familiar (familiar homozigótica, disbetalipoproteinemia, etc), quando a resposta à dieta e outras medidas não-farmacológicas forem inadequadas.

A atorvastatina cálcica é indicada para prevenção secundária (aquela que é instituída depois de um evento para evitar que ele ocorra novamente) de síndrome coronária aguda (doença em que o músculo cardíaco recebe menor fluxo de sangue), também pode ser usada para prevenção de complicações cardiovasculares (vasos sanguíneos e coração) em pacientes sem doença cardiovascular ou dislipidemia preexistente, mas com múltiplos fatores de risco (tabagismo, hipertensão, diabetes, HDL baixo ou história familiar de doença cardíaca precoce). A atorvastatina cálcica é indicada para o tratamento de pacientes com doença cardíaca (do coração) e coronariana (dos vasos do coração) para reduzir o risco de complicações como: infarto do miocárdio não fatal, de acidente vascular cerebral (derrame) fatal e não fatal, de procedimentos de revascularização (para desobstrução das artérias), de hospitalização por insuficiência cardíaca congestiva (doença em que o músculo cardíaco não consegue bombear o sangue para o corpo) e de angina (dor no peito devido a problemas no coração e seus vasos).

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

A atorvastatina cálcica é contraindicada a pacientes que apresentam hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula; doença hepática (do fígado) ativa ou elevações persistentes inesperadas das transaminases séricas (enzimas do fígado), excedendo em 3 vezes o limite superior da normalidade; durante a gravidez ou lactação (amamentação) ou a mulheres em idade fértil que não estejam utilizando medidas contraceptivas (para evitar gravidez) eficazes. A atorvastatina cálcica deve ser administrada a adolescentes e mulheres em idade fértil somente quando a gravidez for altamente improvável e desde que estas pacientes tenham sido informadas dos potenciais riscos ao feto.

Este medicamento é contraindicado para menores de 10 anos.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou que possam ficar grávidas durante o tratamento.

3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Sempre avise o seu médico todas as medicações que você toma quando ele for prescrever uma medicação nova. O médico precisa avaliar se as medicações reagem entre si alterando a sua ação, ou da outra; isso se chama interação medicamentosa. Siga estritamente as orientações do seu médico.

Medicamentos que reduzem a quantidade de lípidos (gordura) no sangue agem no metabolismo (transformação) dos lípidos no fígado, raramente isso pode levar a alteração dos níveis de enzimas hepáticas (substâncias produzidas pelo fígado) na corrente sanguínea, que voltam ao normal com diminuição ou retirada do tratamento. Recomenda-se que testes de função do fígado sejam feitas antes do início do tratamento e periodicamente. A atorvastatina cálcica deve ser usada com cuidado em pacientes com maior risco de alterações da função do fígado (por exemplo, uso abusivo de bebidas alcoólicas, portadores de doenças hepáticas). Pacientes com AVC hemorrágico (tipo de derrame cerebral) prévio parecem apresentar um risco maior para apresentarem um novo AVC hemorrágico. Relate imediatamente ao seu médico se surgirem inesperadamente dor muscular, alterações da sensibilidade ou fraqueza muscular, particularmente se for acompanhada de mal-estar ou febre. Miopatia (dor ou

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

fraqueza muscular) devido à lesão dos músculos (diagnosticada através do aumento dos valores da substância CPK no sangue) pode ocorrer em pacientes que usam atorvastatina cálcica, sendo mais frequentes naqueles que usam medicamentos que aumentam a concentração sistêmica de atorvastatina (como por exemplo, eritromicina, claritromicina, diltiazem, itraconazol, etc.). Avise imediatamente o seu médico caso você faça uso de alguma dessas medicações. Há raros casos de rabdomiólise (destruição de células musculares) acompanhada de alteração da função dos rins (insuficiência renal aguda) relatados em usuários de medicações da classe da atorvastatina cálcica. Por isso em situações em que os riscos de rabdomiólise aumentarem (infecção aguda grave, hipotensão – pressão baixa, cirurgia de grande porte, politraumatismos, distúrbios metabólicos, endócrinos e eletrolíticos e convulsões não controladas) recomenda-se a interrupção temporária de atorvastatina cálcica. A atorvastatina cálcica é contraindicada durante a gravidez (vide item 3. Quando não devo usar este medicamento?). Não se sabe se atorvastatina cálcica é excretada no leite materno, devido aos riscos potenciais para os lactentes (bebês que mamam leite materno), mulheres utilizando atorvastatina cálcica não devem amamentar. A administração concomitante de atorvastatina cálcica com medicamentos inibidores do CYP 3A4 ou indutores do CYP 3A4 (sistemas de quebra de vários medicamentos) (por ex., ciclosporina, eritromicina/claritromicina, inibidores da protease, letermovir, cloridrato de diltiazem, cimetidina, itraconazol, suco de grapefruit, efavirenz, rifampicina) pode alterar a quantidade de atorvastatina no sangue. Os inibidores de transportadores glicoproteína e pibrentasvir e o elbasvir e grazoprevir aumentam a exposição à atorvastatina. São conhecidas outras interações medicamentosas, avise seu médico se você fizer uso de: antiácidos, colestipol, digoxina, azitromicina, contraceptivos orais (pílulas), varfarina, ácido fusídico.

Efeitos na Habilidade de Dirigir ou Operar Máquinas: Não há evidências de que atorvastatina cálcica possa afetar a habilidade do paciente de dirigir ou operar máquinas.

Uso em Crianças: atorvastatina cálcica 10mg e 20mg está indicada para o tratamento de hipercolesterolemia em pacientes acima de 10 anos de idade. As adolescentes devem ser aconselhadas sobre os métodos contraceptivos (para evitar gravidez) apropriados enquanto estiverem em tratamento com atorvastatina cálcica.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

4. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento deve ser usado após a prescrição médica. A dose pode variar de 10 a 80mg em dose única diária, usada a qualquer hora do dia, com ou sem alimentos. As doses iniciais e de manutenção devem ser individualizadas de acordo com os níveis iniciais do colesterol sanguíneo, a meta do tratamento e a resposta do paciente. Após o início do tratamento e/ou durante o ajuste de dose de atorvastatina cálcica, os efeitos aparecem após 2 a 4 semanas, portanto os exames para avaliação do resultado do ajuste da dosagem devem ser feitos após esse período. **Uso em Pacientes com Insuficiência Hepática (prejuízo da função do fígado):** (vide item 4. O que devo saber antes de usar este medicamento?).

Uso em Pacientes com Insuficiência Renal (diminuição da função dos rins): a insuficiência renal não apresenta influência nas concentrações plasmáticas (sanguíneas) da atorvastatina cálcica. Portanto, o ajuste de dose não é necessário.

Uso em Idosos: não foram observadas diferenças entre pacientes idosos e a população em geral com relação à segurança, eficácia ou alcance do objetivo do tratamento de lípidos (gorduras do sangue).

Uso combinado com outros medicamentos: quando a coadministração de atorvastatina cálcica e ciclosporina, telaprevir, tipranavir/ritonavir ou glecaprevir/pibrentasvir é necessária, a dose de atorvastatina cálcica não deve exceder 10mg.

O uso de atorvastatina cálcica não é recomendado em pacientes que tomam letermovir coadministrado com ciclosporina. Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

5. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

A atorvastatina cálcica é geralmente bem tolerada. As reações adversas foram geralmente de natureza leve e transitória. Os efeitos adversos mais frequentes (reação comum - ocorre em 1% ou mais dos pacientes que utilizam este medicamento) que podem ser associados ao tratamento com atorvastatina cálcica são: Nasofaringite (resfriado comum), hiperglicemia (aumento de glicose do sangue), dor faringolaríngea (de garganta), epistaxe (sangramento nasal), diarreia, dispepsia (má digestão), náusea (enjoo), flatulência (excesso de gases no estômago ou intestinos), artralgia (dor nas articulações), dor nas extremidades, dor musculoesquelética (músculos e ossos), espasmos musculares (contrações involuntárias), mialgia (dor muscular), edema articular (inchaço da articulação), alterações nas funções hepáticas (do fígado), aumento da creatina fosfoquinase sanguínea (CPK – enzima que aumenta quando há lesão muscular).

Efeitos adicionais relatados nos estudos placebo-controlados: Pesadelo, visão turva, tinido (zumbido no ouvido), desconforto abdominal, eructação (liberação de gases pela boca), hepatite (inflamação do fígado) e colestase (parada ou dificuldade da eliminação da bile), urticária (alergia da pele), fadiga muscular (cansaço do músculo), cervicalgia (dor na região cervical), mal-estar, febre, presença de células brancas positivas na urina. Em pacientes pediátrico (idade entre 10 e 17 anos): Infecções.

Efeitos adicionais na experiência pós-comercialização: Trombocitopenia (diminuição das células de coagulação do sangue: plaquetas), reações alérgicas (incluindo anafilaxia - reação alérgica grave), ruptura do tendão, aumento de peso, hipoestesia (perda ou diminuição da sensibilidade), amnésia, tontura, disgeusia (paladar alterado), pancreatite (inflamação no pâncreas), síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica (doença cutânea em que a camada superficial da pele se solta em laminas) angioedema (inchaço), eritema multiforme (reação imunológica das mucosas e da pele), rash bolhosa (erupções em forma de bolha na pele), rabdomiólise (danos na musculatura esquelética com liberação de componentes celulares na circulação), miopatia necrosante autoimune (doença muscular), miosite (inflamação dos músculos), dor nas costas, dor no peito, edema periférico (inchaço nas extremidades), fadiga (cansaço).

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

ATORVASTATINA É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. "SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO".

Maiores informações vide a bula.

\$UCE\$\$O E BOA\$ VENDA\$!!!

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E MERCADOS



SE É TEUTO,
É DE CONFIANÇA

Ficha: ATORVASTATINA

Cód. do produto	4457																								
OBS:	LANÇAMENTO!																								
Classe	GE																								
Denominação genérica	Atorvastatina																								
Apresentação	Cpr. Rev. 20mg c/ 30																								
Restrição de uso	USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 10 ANOS																								
Via de administração	USO ORAL																								
Nº de MS	1.0370.0562.010-9																								
Cód. de Barras	7896112104575																								
Cód da Caixa de Embarque	405812																								
Quant. de unidades por CE.	50 unidades																								
Dimensões da CE.	CX/EMB 87A(338X215X262MM)																								
Faca/Dimensões da Cartonagem	F-144A - 65x40x125mm																								
Classe Terapêutica	Antilipêmico																								
Tipo de Tarja	Tarja Vermelha																								
Aliquotas	<table><thead><tr><th>ICMS</th><th>12%</th><th>17%</th><th>17,5%</th><th>18%</th><th>19%</th><th>20%</th><th>21%</th></tr></thead><tbody><tr><td>Preço Fábrica</td><td>R\$ 39,26</td><td>R\$ 41,63</td><td>R\$ 41,88</td><td>R\$ 42,13</td><td>R\$ 42,65</td><td>R\$ 43,19</td><td>R\$ 43,73</td></tr><tr><td>Preço Consumidor</td><td>R\$ 54,27</td><td>R\$ 57,55</td><td>R\$ 57,90</td><td>R\$ 58,24</td><td>R\$ 58,96</td><td>R\$ 59,71</td><td>R\$ 60,45</td></tr></tbody></table>	ICMS	12%	17%	17,5%	18%	19%	20%	21%	Preço Fábrica	R\$ 39,26	R\$ 41,63	R\$ 41,88	R\$ 42,13	R\$ 42,65	R\$ 43,19	R\$ 43,73	Preço Consumidor	R\$ 54,27	R\$ 57,55	R\$ 57,90	R\$ 58,24	R\$ 58,96	R\$ 59,71	R\$ 60,45
ICMS	12%	17%	17,5%	18%	19%	20%	21%																		
Preço Fábrica	R\$ 39,26	R\$ 41,63	R\$ 41,88	R\$ 42,13	R\$ 42,65	R\$ 43,19	R\$ 43,73																		
Preço Consumidor	R\$ 54,27	R\$ 57,55	R\$ 57,90	R\$ 58,24	R\$ 58,96	R\$ 59,71	R\$ 60,45																		
Referência	Citalor - Mylan																								
Composição	Cada comprimido revestido de 10mg contém: atorvastatina cálcica (equivalente a 10mg de atorvastatina).....10,85mg Excipiente q.s.p.....1 comprimido Excipientes: carbonato de cálcio, celulose microcristalina, lactose monoidratada, croscarmelose sódica, polissorbato 80, hiprolose, estearato de magnésio, emulsão de simeticona, Opadry® branco (hipromelose, macrogol, dióxido de titânio e talco) e água de osmose reversa.																								
Embalagem Primária	Alumínio/Alumínio																								
Classificação fiscal	30049069																								
Lista PIS/Confins	a (0%)																								
IPI	0%																								
Validade	18 meses																								
Peso unitário	0,031 kg																								
Peso por Cx. de Embarque	1,55 kg																								

**Sucesso e
Boas Vendas!!!**