

LANÇAMENTO

CLORIDRATO DE VENLAFAXINA




Cáps. dura de lib. controlada 75mg c/30

"Medicamento Genérico Lei nº 9.787, de 1999".


"Material de divulgação exclusivo aos profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos".

MERCADO

Mercado Total - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA CÁPS. 75MG E 150MG (MAT - Unids)



Mercado Total - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA CÁPS. 75MG E 150MG (MAT - Reais)



> O mercado total de cloridrato de venlafaxina vendeu mais de 6 milhões de unidades, resultando em um total faturado de mais de 791,3 milhões de reais no último ano. Se considerarmos uma média mensal teremos 582 mil unidades vendidas por mês, com uma evolução entre Nov/2021 a Nov/2022 em unidades de 14,82% e 14,40% em valor neste mesmo período.* No que se refer concentração de 75mg c/30, nota-se que representa 62% em unidades vendidas.

*MAT. Fonte: (Close Up RM - Novembro/2022).

COMPARATIVO DE PREÇOS*

CLORIDRATO DE VENLAFAXINA CÁPS. 75MG C/30

PRODUTO	LABORATÓRIO	20% PF	20% PMC	18% PF	18% PMC	17% PF	17% PMC	12% PF	12% PMC
VENLAFAXINA	EUROFARMA	R\$ 141,68	R\$ 195,86	R\$ 138,22	R\$ 191,08	R\$ 136,55	R\$ 188,77	R\$ 128,80	R\$ 178,06
VENLAFAXINA	SUN PHARMA	R\$ 73,61	R\$ 101,76	R\$ 71,82	R\$ 99,29	R\$ 70,95	R\$ 98,08	R\$ 66,92	R\$ 92,51
VENLAFAXINA	MEDLEY	R\$ 72,06	R\$ 99,62	R\$ 70,30	R\$ 97,19	R\$ 69,46	R\$ 96,02	R\$ 65,51	R\$ 90,56
VENLAFAXINA	NEO QUIMICA	R\$ 80,06	R\$ 110,68	R\$ 78,11	R\$ 107,98	R\$ 77,17	R\$ 106,68	R\$ 72,78	R\$ 100,61
VENLAFAXINA	GEOLAB	R\$ 79,60	R\$ 110,04	R\$ 77,66	R\$ 107,36	R\$ 76,72	R\$ 106,06	R\$ 72,36	R\$ 100,03
VENLAFAXINA	AUROBINDO	R\$ 210,56	R\$ 291,09	R\$ 205,43	R\$ 283,99	R\$ 202,95	R\$ 280,87	R\$ 191,42	R\$ 264,63
VENLAFAXINA	CELLERA	R\$ 141,64	R\$ 195,81	R\$ 138,18	R\$ 191,03	R\$ 136,52	R\$ 188,73	R\$ 128,76	R\$ 178,00
VENLIFT	TORRENT	R\$ 76,57	R\$ 105,85	R\$ 74,70	R\$ 103,27	R\$ 73,80	R\$ 102,02	R\$ 69,61	R\$ 96,23
ALENTHUS	MEDLEY	R\$ 80,11	R\$ 110,75	R\$ 78,16	R\$ 108,05	R\$ 77,22	R\$ 106,75	R\$ 72,83	R\$ 100,68
EFEFOR	VIATRIS	R\$ 303,03	R\$ 418,92	R\$ 295,63	R\$ 408,69	R\$ 292,07	R\$ 403,77	R\$ 275,48	R\$ 380,83
CLORIDRATO DE VENLAFAXINA	TEUTO	R\$ 64,48	R\$ 59,14	R\$ 62,90	R\$ 86,96	R\$ 62,14	R\$ 85,90	R\$ 58,61	R\$ 81,02

Fonte: Revista Kairos online Janeiro/2023

CLORIDRATO DE VENLAFAXINA CÁPS. 75MG C/30

PRODUTO	LABORATÓRIO	18% PF	DIF %	DIF R\$
VENLAFAXINA	EUROFARMA	R\$ 138,22	54,49%	R\$ 75,32
VENLAFAXINA	SUN PHARMA	R\$ 71,82	12,42%	R\$ 8,92
VENLAFAXINA	MEDLEY	R\$ 70,30	10,53%	R\$ 7,40
VENLAFAXINA	NEO QUIMICA	R\$ 78,11	19,47%	R\$ 15,21
VENLAFAXINA	GEOLAB	R\$ 77,66	19,01%	R\$ 14,76
VENLAFAXINA	AUROBINDO	R\$ 205,43	69,38%	R\$ 142,53
VENLAFAXINA	CELLERA	R\$ 138,18	54,48%	R\$ 75,28
VENLIFT	TORRENT	R\$ 74,70	15,80%	R\$ 11,80
ALENTHUS	MEDLEY	R\$ 78,16	19,52%	R\$ 15,26
EFEFOR	VIATRIS	R\$ 295,63	78,72%	R\$ 232,73
CLORIDRATO DE VENLAFAXINA	TEUTO	R\$ 62,90		

*Os preços contemplam apenas o período de Lançamento do Produto. Caso deseje os preços atualizados, consultar seu gerente ou consultor.

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Condições especiais de lançamento, consulte seu gerente ou consultor.

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- ✓ ÓTIMO CUSTO / BENEFÍCIO PARA O CONSUMIDOR FINAL;
- ✓ GARANTIA DA QUALIDADE DE UM GENÉRICO TEUTO;

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

cloridrato de venlafaxina

Medicamento Genérico Lei nº 9.787, de 1999.

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

O cloridrato de venlafaxina está indicado para o tratamento da depressão, incluindo depressão com ansiedade associada e; para prevenção de recaída e recorrência da depressão. Também está indicado para o tratamento, incluindo tratamento em longo prazo, do transtorno de ansiedade generalizada e do transtorno de ansiedade social (também conhecido como fobia social).

2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

O cloridrato de venlafaxina não deve ser utilizado por pacientes alérgicos a qualquer componente da formulação e, por pacientes recebendo antidepressivos da classe dos inibidores da monoaminoxidase (IMAOs), como por exemplo tranilcipromina, selegilina, rasagilina e linezolida.

O tratamento com o cloridrato de venlafaxina não deve ser iniciado no período de, no mínimo, 14 dias após a descontinuação do tratamento com um inibidor da monoaminoxidase (IMAO).

O cloridrato de venlafaxina deve ser descontinuado por, no mínimo, 7 dias antes do início do tratamento com qualquer inibidor da monoaminoxidase.

Este medicamento é contraindicado para uso em menores de 18 anos.

3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Recomenda-se que o uso de cloridrato de venlafaxina não seja interrompido bruscamente. A dose deve ser reduzida progressivamente de acordo com as instruções do seu médico.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

As cápsulas de cloridrato de venlafaxina contêm pequenos grânulos que liberam o medicamento lentamente no intestino. A parte destes grânulos que não é absorvida pelo organismo é eliminada e pode ser vista nas fezes.

Pacientes tratados devem ser apropriadamente monitorados e atentamente observados quanto à piora clínica e risco de suicídio.

Pacientes, familiares e cuidadores devem ficar alerta e informar ao médico sobre aparecimento de ansiedade, agitação, ataques de pânico, insônia, irritabilidade, hostilidade, agressividade, impulsividade, outras alterações incomuns de comportamento, piora da depressão e ideação suicida, principalmente no início do tratamento ou durante qualquer alteração de dose. Houve relatos de disfunção sexual de longa duração, em que os sintomas continuaram, apesar da descontinuação dos inibidores de recaptção da serotonina-noradrenalina. Embora o uso de cloridrato de venlafaxina não tenha demonstrado intensificar as alterações mentais e motoras causadas pelo álcool, pacientes devem evitar consumir bebidas alcoólicas enquanto em tratamento com cloridrato de venlafaxina.

O cloridrato de venlafaxina deve ser usado com cuidado em pacientes portadores de insuficiência renal (prejuízo na função dos rins) ou hepática (prejuízo na função do fígado). Siga rigorosamente a orientação do seu médico.

Foi observada elevação da pressão arterial em alguns pacientes usando altas doses de cloridrato de venlafaxina e, por este motivo, deve-se fazer monitoramento regular da pressão arterial e acompanhamento médico.

Pode ocorrer midríase (dilatação da pupila) associada ao tratamento com o cloridrato de venlafaxina. Recomenda-se acompanhamento rigoroso dos pacientes com pressão intraocular (do olho) elevada ou com risco de glaucoma (aumento rápido, abrupto, da pressão ocular).

Gravidez: a segurança do uso de cloridrato de venlafaxina durante a gravidez em humanos ainda não foi estabelecida. O cloridrato de venlafaxina só deve ser administrado a mulheres grávidas se os benefícios esperados superarem os riscos possíveis.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Se cloridrato de venlafaxina for usado durante a gravidez, o recém-nascido deve ser monitorado pelo médico pelo risco de apresentar complicações.

Um estudo mostrou que as mulheres que interromperam a medicação antidepressiva durante a gravidez tinham maior probabilidade de apresentar uma recidiva da depressão maior do que as mulheres que continuaram a medicação antidepressiva.

A exposição a antidepressivos da classe dos inibidores de receptação de serotonina e noradrenalina (SNRIs), como é o caso de cloridrato de venlafaxina, da metade ao final da gravidez pode aumentar o risco de pré-eclâmpsia, e a exposição a SNRIs perto do parto pode aumentar o risco de hemorragia pós-parto.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Lactação: se você está amamentando ou pretende amamentar, não é recomendado usar cloridrato de venlafaxina, já que ele é excretado pelo leite e a segurança deste medicamento para as mulheres e crianças não é conhecida.

Uso em Idosos: não há recomendação específica para ajuste de dose do cloridrato de venlafaxina de acordo com a idade do paciente.

Efeitos sobre as atividades que requerem concentração: cloridrato de venlafaxina pode prejudicar o julgamento, o raciocínio ou as habilidades motoras. Até que você saiba como cloridrato de venlafaxina te afeta, tenha cuidado ao realizar atividades que requeiram concentração, tais como dirigir ou operar máquinas.

Durante o tratamento, o paciente não deve dirigir veículos ou operar máquinas, pois sua habilidade e atenção podem estar prejudicadas.

Abuso e dependência: estudos clínicos não evidenciaram comportamento de busca por drogas, desenvolvimento de tolerância, ou elevação indevida de dose da venlafaxina durante o período de uso.

Atenção: Este medicamento contém açúcar, portanto, deve ser usado com cautela em portadores de Diabetes.

Interações medicamentosas: sempre avise ao seu médico todas as medicações que você toma quando ele for prescrever uma medicação nova. O médico precisa

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

avaliar se as medicações reagem entre si alterando a sua ação, ou da outra; isso se chama interação medicamentosa.

O uso concomitante (no mesmo período de tempo) de cloridrato de venlafaxina com medicamentos que aumentam a predisposição ao sangramento pode aumentar o risco de sangramentos espontâneos. O uso de cloridrato de venlafaxina com outros medicamentos que podem aumentar a quantidade de serotonina no organismo (outros antidepressivos, antipsicóticos, anfetaminas e antagonistas da dopamina) pode aumentar o risco de aparecimento da síndrome serotoninérgica (reação do corpo ao excesso de serotonina que se manifesta por inquietação, alteração do comportamento, rigidez muscular, aumento da temperatura, aumento da velocidade dos reflexos e tremores; que pode ser fatal), o uso com cetoconazol (antifúngico) pode aumentar a quantidade de cloridrato de venlafaxina no sangue. O uso de cloridrato de venlafaxina com antidepressivos do tipo IMAO pode levar a reações sérias, com possíveis alterações rápidas dos sinais vitais e do estado mental (vide item 3. “Quando não devo usar este medicamento?”). O cloridrato de venlafaxina pode interferir nos resultados dos testes de urina para avaliar a presença de substâncias como fenciclidina e anfetaminas.

4. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

O cloridrato de venlafaxina deve ser administrado com alimentos aproximadamente no mesmo horário todos os dias. As cápsulas devem ser tomadas inteiras com algum líquido e não devem ser divididas, trituradas, mastigadas ou dissolvidas, ou podem ser administradas cuidadosamente abrindo-se a cápsula e espalhando todo o conteúdo em uma colher de purê de maçã. Esta mistura de medicamento e alimento deve ser engolida imediatamente sem mastigar e deve ser seguida de um copo de água para assegurar que você engoliu todo o medicamento.

Depressão Maior

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

A dose inicial recomendada para cloridrato de venlafaxina é de 75mg, administrada uma vez por dia (1x/dia). Os pacientes que não respondem à dose inicial de 75mg/dia podem beneficiar-se com o aumento da dose até, no máximo, 225mg/dia.

Transtorno de Ansiedade Generalizada

A dose inicial recomendada para cloridrato de venlafaxina é de 75mg, administrada uma vez por dia (1x/dia). Os pacientes que não respondem à dose inicial de 75mg/dia podem beneficiar-se com o aumento da dose até, no máximo, 225mg/dia.

Fobia Social

A dose inicial recomendada para cloridrato de venlafaxina é de 75mg, administrada uma vez por dia (1x/dia). Não há evidências de que doses maiores proporcionem algum benefício adicional.

Descontinuando o uso de cloridrato de venlafaxina. Recomenda-se que cloridrato de venlafaxina não seja interrompido bruscamente. A dose deve ser reduzida gradualmente de acordo com as instruções do seu médico. O período necessário para descontinuação gradativa pode depender da dose, da duração do tratamento e de cada paciente individualmente.

Uso em Pacientes com Insuficiência Renal

A dose diária total de cloridrato de venlafaxina deve ser reduzida em 25% a 50% nos pacientes com insuficiência renal com taxa de filtração glomerular (TFG) de 10 a 70mL/min.

A dose diária total de cloridrato de venlafaxina deve ser reduzida em até 50% nos pacientes em hemodiálise.

Uso em Pacientes com Insuficiência Hepática

A dose diária total de cloridrato de venlafaxina deve ser reduzida em até 50% em pacientes com insuficiência hepática leve a moderada. Em alguns pacientes, reduções maiores que 50% podem ser adequadas.

Uso em Crianças

Não há experiência suficiente com o uso de cloridrato de venlafaxina em pacientes com menos de 18 anos de idade.

Uso em Idosos

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Não há recomendação específica para ajuste da dose do cloridrato de venlafaxina de acordo com a idade do paciente.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento de seu médico.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

5. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso você esqueça-se de tomar cloridrato de venlafaxina no horário estabelecido pelo seu médico, tome-o assim que lembrar.

Entretanto, se já estiver perto do horário de tomar a próxima dose, pule a dose esquecida e tome a próxima, continuando normalmente o esquema de doses recomendado pelo seu médico.

Neste caso, não tome o medicamento 2 vezes para compensar doses esquecidas. Se você esquecer uma dose você pode comprometer o resultado do tratamento.

6. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

As reações adversas estão relacionadas abaixo de acordo com as categorias de frequência:

Reação muito comum (ocorre em mais de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): insônia, dor de cabeça, tontura, sedação, náusea, boca seca, constipação, hiperidrose (suor excessivo).

Reação comum (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): diminuição do apetite, sonhos anormais, nervosismo, diminuição da libido, agitação, anorgasmia (falta de prazer sexual ou orgasmo), acatisia (incapacidade de se manter quieto), tremor, parestesia (dormência e formigamento), disgeusia (alteração do paladar), deficiência visual, distúrbio de acomodação, midríase (pupila dilatada), tinido (zumbido no ouvido), taquicardia (aceleração dos batimentos cardíacos), palpitação, hipertensão (pressão alta),

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

ondas de calor, dispneia (falta de ar), bocejos, diarreia, vômito, erupção cutânea (lesão na pele), prurido (coceira), suor noturno, hipertonia (aumento da contração muscular), hesitação urinária, retenção urinária, polaciúria (aumento da frequência urinária), disfunção erétil, ejaculação anormal, fadiga, astenia (fraqueza), calafrios, perda de peso, aumento de peso.

Reação incomum (ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento): estado de confusão, mania, hipomania, despersonalização, alucinação, orgasmo anormal, bruxismo, apatia (ausência de emoção), síncope (desmaio), mioclonia (espasmos musculares), distúrbio do equilíbrio, coordenação anormal, discinesia (movimentos involuntários, principalmente dos músculos da boca, língua e face, ocorrendo exteriorização da língua e movimentos de um canto a outro da boca), hipotensão ortostática (diminuição da pressão arterial ao levantar), hipotensão (pressão baixa), sangramento gastrointestinal, teste de função hepática anormal, urticária (alergia de pele), alopecia (perda de cabelo), equimose (manchas arroxeadas), reação de fotossensibilidade (sensibilidade à luz), incontinência urinária (dificuldade em controlar a urina), metrorragia (sangramento vaginal fora do período menstrual), menorragia (sangramento menstrual excessivo ou prolongado), aumento do colesterol no sangue, fratura óssea.

Reação rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento): agranulocitose (ausência de células de defesa: neutrófilos, basófilos e eosinófilos), anemia aplástica (diminuição da produção de glóbulos vermelhos do sangue), pancitopenia (diminuição de todas as células do sangue), neutropenia (diminuição de um tipo de células de defesa no sangue: neutrófilos), reação anafilática, secreção inapropriada do hormônio antidiurético (alteração na secreção do hormônio ADH), hiponatremia (redução da concentração de sódio no sangue), delírio, síndrome neuroléptica maligna (contração muscular grave, febre, aceleração dos batimentos do coração, tremor), síndrome da serotonina (alterações do estado mental, dos movimentos entre outras), convulsão, distonia (contração involuntária da musculatura, lenta e repetitiva), glaucoma de ângulo fechado, torsade de pointes, taquicardia ventricular, fibrilação ventricular,

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

eletrocardiograma com prolongamento do intervalo QT, cardiomiopatia do estresse (cardiomiopatia de takotsubo), doença pulmonar intersticial, eosinofilia pulmonar, pancreatite (inflamação no pâncreas), hepatite (inflamação do fígado), Síndrome de Stevens-Johnson (reação alérgica grave), necrólise epidérmica tóxica (descamação grave da camada superior da pele), angioedema (inchaço das partes mais profundas da pele ou da mucosa, geralmente de origem alérgica), eritema multiforme (manchas vermelhas, bolhas e ulcerações em todo o corpo), rabdomiólise (destruição das células musculares).

Reação muito rara (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento): trombocitopenia (diminuição das plaquetas do sangue), prolactina aumentada no sangue, discinesia

tardia, hemorragia da mucosa, tempo de sangramento aumentado.

Os seguintes sintomas foram relatados em associação com a repentina interrupção ou redução de dose ou retirada de tratamento: hipomania, ansiedade, agitação, nervosismo, confusão, insônia ou outros distúrbios do sono, fadiga (sensação de cansaço), sonolência, parestesia (formigamento), tontura, convulsão, vertigem, cefaleia (dor de cabeça), sintomas de gripe, tinido, coordenação e equilíbrio prejudicados, tremor, sudorese, boca seca, anorexia, diarreia, náusea, vômito, deficiência visual e hipertensão. Em estudos anteriores à comercialização, a maioria das reações à interrupção foi leve e resolvida sem tratamento.

Embora esses eventos sejam geralmente autolimitados, tem havido relatos de sintomas graves de descontinuação e, às vezes, esses efeitos podem ser prolongados e graves.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA
RECEITA**

VENLAFAXINA É UM MEDICAMENTO. DURANTE O SEU USO NÃO DIRIJA VEÍCULOS OU OPERE MÁQUINAS, POIS SUA AGILIDADE E ATENÇÃO PODEM ESTAR PREJUDICADAS. “SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO”.

Maiores informações vide a bula.

\$UCE\$\$O E BOA\$ VENDA\$!!!

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E MERCADOS



SE É TEUTO,
É DE CONFIANÇA

Ficha: CLORIDRATO DE VENLAFAXINA

Cód. do produto	5327																					
OBS:	Lançamento!																					
Classe	GF																					
Denominação genérica	Cloridrato de venlafaxina																					
Apresentação	Cápsula dura de liberação controlada 75mg c/ 30																					
Restrição de uso	USO ADULTO																					
Via de administração	USO ORAL																					
Nº de MS	1.0370.0763.001-2																					
Cód. de Barras	7896112153276																					
Cód da Caixa de Embarque	301384																					
Quant. de unidades por CE.	50 unidades																					
Dimensões da CE.	CX/EMB 02B 265X165X216																					
Faca/Dimensões da Cartonagem	F-22- 50x30x105mm																					
Classe Terapêutica	Antidepressivo																					
Tipo de Tarja	Tarja Vermelha																					
Aliquotas	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ICMS</th> <th>12%</th> <th>17%</th> <th>17,5%</th> <th>18%</th> <th>20%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Preço Fábrica</td> <td>R\$</td> <td>58,61</td> <td>R\$ 62,14</td> <td>R\$ 62,52</td> <td>R\$ 62,90</td> <td>R\$ 64,48</td> </tr> <tr> <td>Preço Consumidor</td> <td>R\$</td> <td>81,02</td> <td>R\$ 85,90</td> <td>R\$ 86,43</td> <td>R\$ 88,03</td> <td>R\$ 89,14</td> </tr> </tbody> </table>		ICMS	12%	17%	17,5%	18%	20%	Preço Fábrica	R\$	58,61	R\$ 62,14	R\$ 62,52	R\$ 62,90	R\$ 64,48	Preço Consumidor	R\$	81,02	R\$ 85,90	R\$ 86,43	R\$ 88,03	R\$ 89,14
	ICMS	12%	17%	17,5%	18%	20%																
Preço Fábrica	R\$	58,61	R\$ 62,14	R\$ 62,52	R\$ 62,90	R\$ 64,48																
Preço Consumidor	R\$	81,02	R\$ 85,90	R\$ 86,43	R\$ 88,03	R\$ 89,14																
Referência	Efexor - Mylan																					
Composição	<p>Cada cápsula dura de liberação controlada de 75mg contém:</p> <p>cloridrato de venlafaxina (equivalente a 75mg de venlafaxina base)..... 84,86mg</p> <p>Excipiente q.s.p..... 1 cápsula</p> <p>Excipientes: sacarose, etilcelulose, ácido esteárico, macrogol, dióxido de silício, hipromelose, álcool isopropílico e água purificada.</p>																					
Embalagem Primária	Blister PVDC cristal+ Alumínio																					
Classificação fiscal	30049019																					
Lista PIS/Confins	Positivo (0%)																					
IPI	0%																					
Validade	24 meses																					
Peso unitário	0,029 kg																					
Peso por Cx. de Embarque	1,45 kg																					

**Sucesso e
Boas Vendas!!!**