

# Lançamento

## METRONIDAZOL




## Comprimido 250mg c/20 e Comprimido 400mg c/24

"Medicamento Genérico Lei nº 9.787, de 1999".


"Material de divulgação exclusivo aos profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos".

# MERCADO

**Mercado Total - Metronidazol (Unids)**




**Mercado Total - Metronidazol (Reais)**



> O mercado total de Metronidazol comprimido vende em média 300 mil unidades por mês, resultando um faturamento de mais de 48 milhões de reais no último ano. Isto representa um crescimento de 8,46% em reais, se compararmos Abril/2018 com Abril/2017. (Close Up – Abr/2018).


# MERCADO

**Mercado Total - Metronidazol 400mg (Reais)**



> A apresentação de 400mg tem maior crescimento no mercado embora a de 250 ainda seja responsável pelo maior número de vendas. A primeira rendeu quase 29 milhões de reais no último ano, tendo uma evolução de mais de 13% enquanto a segunda vendeu quase 2 milhões de unidades nesse mesmo período, sendo responsável por mais de 55% do mercado total. (Fonte: RM Close-Up, Abr/2018)

**Mercado Total - Metronidazol 250mg (Reais)**



# COMPARATIVO DE PREÇOS\*

## Metronidazol Comprimido 250mg c/20

PRODUTO	LABORATÓRIO	20% PF	20% PMC	18% PF	18% PMC	17% PF	17% PMC	12% PF	12% PMC
METRONIDAZOL	NEO QUÍMICA	R\$ 7,69	R\$ 10,63	R\$ 7,50	R\$ 10,37	R\$ 7,41	R\$ 10,24	R\$ 6,99	R\$ 9,66
HELMIZOL	TEUTO	R\$ 11,77	R\$ 16,27	R\$ 11,49	R\$ 15,88	R\$ 11,35	R\$ 15,69	R\$ 10,70	R\$ 14,79
FLAGYL	SANOI	R\$ 13,92	R\$ 19,24	R\$ 13,58	R\$ 18,77	R\$ 13,42	R\$ 18,55	R\$ 12,65	R\$ 17,49
CANDERME	LEGRAND	R\$ 12,66	R\$ 17,50	R\$ 12,35	R\$ 17,07	R\$ 12,20	R\$ 16,87	R\$ 11,51	R\$ 15,91
METRONIDAZOL	PRATI-DONADUZZI	R\$ 8,44	R\$ 11,67	R\$ 8,24	R\$ 11,39	R\$ 8,14	R\$ 11,26	R\$ 7,68	R\$ 10,62
NEO METRODAZOL	NEO QUÍMICA	R\$ 12,52	R\$ 17,31	R\$ 12,21	R\$ 16,88	R\$ 12,06	R\$ 16,67	R\$ 11,38	R\$ 15,73
METRONIDAZOL	TEUTO	R\$ 7,50	R\$ 10,37	R\$ 7,32	R\$ 10,12	R\$ 7,23	R\$ 10,00	R\$ 6,82	R\$ 9,43

Fonte: Revista Kairos Junho/2018

## Metronidazol Comprimido 400mg c/24

PRODUTO	LABORATÓRIO	20% PF	20% PMC	18% PF	18% PMC	17% PF	17% PMC	12% PF	12% PMC
FLAGYL	SANOI	R\$ 19,10	R\$ 26,40	R\$ 18,63	R\$ 25,75	R\$ 18,41	R\$ 25,45	R\$ 17,36	R\$ 24,00
HELMIZOL	TEUTO	R\$ 19,09	R\$ 26,39	R\$ 18,63	R\$ 25,75	R\$ 18,40	R\$ 25,44	R\$ 17,36	R\$ 24,00
METRONIDAZOL	TEUTO	R\$ 12,11	R\$ 16,74	R\$ 11,81	R\$ 16,33	R\$ 11,67	R\$ 16,13	R\$ 11,00	R\$ 15,21

Fonte: Revista Kairos Junho/2018

*\*Os preços contemplam apenas o período de Lançamento do Produto. Caso deseje os preços atualizados, consultar seu gerente ou consultor.*

# COMPARATIVO DE PREÇOS\*

## Metronidazol Comprimido 250mg c/20

PRODUTO	LABORATÓRIO	18% PF	DIF %	DIF R\$
METRONIDAZOL	NEO QUÍMICA	R\$ 7,50	2,40%	R\$ 0,18
HELMIZOL	TEUTO	R\$ 11,49	36,29%	R\$ 4,17
FLAGYL	SANOI	R\$ 13,58	46,10%	R\$ 6,26
CANDERME	LEGRAND	R\$ 12,35	40,73%	R\$ 5,03
METRONIDAZOL	PRATI-DONADUZZI	R\$ 8,24	11,17%	R\$ 0,92
NEO METRODAZOL	NEO QUÍMICA	R\$ 12,21	40,05%	R\$ 4,89
METRONIDAZOL	TEUTO	R\$ 7,32		

## Metronidazol Comprimido 250mg c/20

PRODUTO	LABORATÓRIO	18% PMC	DIF %	DIF R\$
METRONIDAZOL	NEO QUÍMICA	R\$ 10,37	-13,89%	-R\$ 1,44
HELMIZOL	TEUTO	R\$ 15,88	25,63%	R\$ 4,07
FLAGYL	SANOI	R\$ 18,77	37,08%	R\$ 6,96
CANDERME	LEGRAND	R\$ 17,07	30,81%	R\$ 5,26
METRONIDAZOL	PRATI-DONADUZZI	R\$ 11,39	-3,69%	-R\$ 0,42
NEO METRODAZOL	NEO QUÍMICA	R\$ 16,88	30,04%	R\$ 5,07
METRONIDAZOL	TEUTO	R\$ 10,12		

*\*Os preços contemplam apenas o período de Lançamento do Produto. Caso deseje os preços atualizados, consultar seu gerente ou consultor.*

# COMPARATIVO DE PREÇOS\*

## Metronidazol Comprimido 400mg c/24

PRODUTO	LABORATÓRIO	18% PF	DIF %	DIF R\$
FLAGYL	SANOI	R\$ 25,75	71,57%	R\$ 18,43
HELMIZOL	TEUTO	R\$ 25,75	71,57%	R\$ 18,43
METRONIDAZOL	TEUTO	R\$ 16,33		

## Metronidazol Comprimido 400mg c/24

PRODUTO	LABORATÓRIO	18% PMC	DIF %	DIF R\$
FLAGYL	SANOI	R\$ 18,63	36,61%	R\$ 6,82
HELMIZOL	TEUTO	R\$ 18,63	36,61%	R\$ 6,82
METRONIDAZOL	TEUTO	R\$ 11,81		

*\*Os preços contemplam apenas o período de Lançamento do Produto. Caso deseje os preços atualizados, consultar seu gerente ou consultor.*

# CONDIÇÕES COMERCIAIS

Condições especiais de lançamento, consulte seu gerente ou consultor.

# INFORMAÇÕES TÉCNICAS

## Metronidazol

Medicamento Genérico Lei nº 9.787, de 1999.

### 1 . PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Este medicamento está indicado no tratamento de giardíase (infecção do intestino delgado causada pelo protozoário flagelado, *Giardia lamblia*), amebíase (infecção causada por qualquer uma de várias amebas), tricomoníase (infecções produzidas por várias espécies de Tricomonas), vaginites (inflamação na vagina) por *Gardnerella vaginalis* e infecções causadas por bactérias anaeróbias (que crescem na presença de baixas concentrações de oxigênio ou até mesmo na sua ausência) como *Bacteroides fragilis* e outros bacteroides, *Fusobacterium sp*, *Clostridium sp*, *Eubacterium sp* e cocos anaeróbios.

### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O metronidazol é um anti-infeccioso que apresenta atividade antimicrobiana, que abrange exclusivamente microrganismos anaeróbios, e atividade antiparasitária. A absorção máxima ocorre entre 1 á 2 horas.

### 3 . QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento não deve ser usado se você já teve alergia ao metronidazol ou outro derivado imidazólico, e/ou aos demais componentes do produto.

**Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos.**



# INFORMAÇÕES TÉCNICAS

## **4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

O uso de metronidazol para tratamento com duração prolongada deve ser cuidadosamente avaliado pelo seu médico.

Caso o tratamento com metronidazol, por razões especiais, necessite de uma duração maior do que a geralmente recomendada, procure seu médico para realizar regularmente testes hematológicos (sangue), principalmente contagem leucocitária (contagem de leucócitos). Seu médico irá monitorá-lo quanto ao aparecimento de reações adversas como neuropatia (doença que afeta um ou vários nervos) central ou periférica, por exemplo: parestesia (sensações cutâneas subjetivas como frio, calor, formigamento, pressão), ataxia (falta de coordenação dos movimentos), vertigem (tontura) e crises convulsivas.

Este medicamento pode provocar escurecimento da urina (devido aos metabólitos de metronidazol).

Você não deve ingerir bebidas alcoólicas ou medicamentos que contenham álcool em sua formulação durante e no mínimo 1 dia após o tratamento com metronidazol, devido à possibilidade de efeito antabuse, com aparecimento de rubor (vermelhidão), vômito e taquicardia (aceleração do ritmo cardíaco).

Foram reportados casos de hepatotoxicidade severa (toxicidade no fígado) /insuficiência hepática aguda (redução da função do fígado), incluindo casos fatais, com início muito rápido após o começo do tratamento, em pacientes com Síndrome de Cockayne [(doença hereditária rara, caracterizada por várias anomalias, entre as quais: transtornos de fotossensibilidade (excesso de sensibilidade à luz solar), atraso grave do desenvolvimento físico, retardo mental grave, microcefalia, envelhecimento prematuro, perda auditiva e, dependendo da gravidade, morte

# INFORMAÇÕES TÉCNICAS

precoce)] usando medicamentos contendo metronidazol para uso sistêmico. Portanto, nesta população, o metronidazol deve ser utilizado após uma cuidadosa avaliação de risco-benefício, e apenas se não houver tratamento alternativo disponível.

Os testes da função do fígado devem ser realizados imediatamente antes do início do tratamento, durante e após o término do tratamento até que a função do fígado esteja dentro dos limites normais ou até que os valores basais sejam atingidos. Se os testes da função do fígado se tornarem acentuadamente elevados durante o tratamento, o medicamento deve ser descontinuado.

Os pacientes com Síndrome de Cockayne devem ser aconselhados a informar imediatamente ao seu médico quaisquer sintomas de potencial dano ao fígado (tais como novo evento de dor abdominal constante, anorexia (redução ou perda de apetite), enjoo, vômito, febre, mal-estar, cansaço, icterícia (cor amarelada da pele e olhos), urina escurecida ou coceira) e parar de tomar metronidazol.

Foram notificados com metronidazol casos de reações cutâneas bolhosas severas, como síndrome de Stevens Johnson (SSJ) (forma grave de reação alérgica caracterizada por bolhas em mucosas e em grandes áreas do corpo), necrólise epidérmica tóxica (NET) (quadro grave, caracterizado por erupção generalizada, com bolhas rasas extensas e áreas de necrose epidérmica, à semelhança de grande queimadura, resultante principalmente de uma reação tóxica a vários medicamentos) ou pustulose exantemática generalizada aguda (PEGA) (doença rara, que se caracteriza pelo desenvolvimento abrupto de pústulas sobre áreas da pele, acompanhadas por febre alta e aumentos dos leucócitos no sangue) (vide Quais os males que este medicamento pode me causar?). Se estiverem presentes sintomas ou sinais de SSJ, NET ou PEGA, o tratamento com metronidazol deve ser imediatamente interrompido.

# INFORMAÇÕES TÉCNICAS

## **Gravidez e amamentação**

O uso de metronidazol durante a gravidez deve ser cuidadosamente avaliado visto que atravessa a barreira placentária e seus efeitos sobre a organogênese (formação das células que estão formando o feto) fetal humana ainda são desconhecidos.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.**

Visto que o metronidazol é excretado no leite materno, a exposição desnecessária ao medicamento deve ser evitada.

## **Populações especiais**

Não há advertências e recomendações especiais sobre o uso adequado desse medicamento em pacientes idosos.

Pacientes com encefalopatia hepática (disfunção do sistema nervoso central em associação com falência hepática) devem ter cautela quanto ao uso de metronidazol, pois o mesmo é metabolizado pelo fígado. Siga a orientação de seu médico.

Pacientes com doença severa, ativa ou crônica, do sistema nervoso central e periférico devem ter cautela ao tomar metronidazol, devido ao risco de agravamento do quadro neurológico. Siga a orientação do seu médico.

# INFORMAÇÕES TÉCNICAS

## **Alterações na capacidade de dirigir veículos e operar máquinas**

Você não deve dirigir veículos ou operar máquinas caso estes sintomas ocorram: confusão, tontura, alucinações, convulsões ou alterações visuais (vide QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?).

## **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS**

**Álcool:** bebidas alcoólicas e medicamentos contendo álcool não devem ser ingeridos durante o tratamento com metronidazol e no mínimo 1 dia após o mesmo, devido à possibilidade de reação do tipo dissulfiram (efeito antabuse), com aparecimento de rubor, vômito e taquicardia (aceleração do ritmo cardíaco).

**Dissulfiram:** foram relatadas reações psicóticas em pacientes utilizando concomitantemente metronidazol e dissulfiram.

**Terapia com anticoagulante oral (tipo varfarina):** potencialização do efeito anticoagulante e aumento do risco hemorrágico, causado pela diminuição da metabolização desta medicação pelo fígado. Em caso de administração concomitante, o médico deve monitorar o tempo de protrombina com maior frequência e realizar ajuste posológico da terapia anticoagulante durante o tratamento com metronidazol.

**Lítio:** os níveis no plasma de lítio podem ser aumentados pelo metronidazol. O médico deve monitorar as concentrações plasmáticas de lítio, creatinina e eletrólitos enquanto durar o tratamento com metronidazol.

# INFORMAÇÕES TÉCNICAS

**Ciclosporina:** risco de aumento dos níveis no plasma de ciclosporina. O médico deve monitorar rigorosamente os níveis plasmáticos de ciclosporina e creatinina.

**Fenitoína ou fenobarbital:** aumento da eliminação de metronidazol, resultando em níveis no plasma reduzidos.

**Fluoruracila:** o uso concomitante com metronidazol aumenta a sua toxicidade.

**Bussulfano:** os níveis no plasma de bussulfano podem ser aumentados pelo metronidazol, o que pode levar a uma severa toxicidade do bussulfano.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Não use este medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

## **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C). PROTEGER DA LUZ E UMIDADE.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido.**

**Guarde-o em sua embalagem original.**

# INFORMAÇÕES TÉCNICAS

## **Características do medicamento:**

**Comprimido 250mg:** Circular plano com vinco de cor creme claro.

**Comprimido 400mg:** Circular bicôncavo sem vinco de cor creme claro.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Você deve tomar os comprimidos inteiros por via oral, sem mastigar, com quantidade suficiente de líquido (aproximadamente 1 copo de água).

### **POSOLOGIA**

#### **-Infecções parasitárias**

##### **Tricomoníase:**

-2g, em dose única **ou**

-250mg, 2 vezes ao dia, durante 10 dias **ou**

-400mg, 2 vezes ao dia, durante 7 dias.

O esquema a ser utilizado deve ser individualizado.

Esta posologia pode ser aumentada, a critério do médico, e o tratamento repetido, se necessário, depois de 4 a 6 semanas.

Como coadjuvante do tratamento por via oral, poderá ser utilizado o tratamento local.

Os parceiros sexuais também devem ser tratados com 2g em dose única, a fim de prevenir recidivas e reinfecções recíprocas.

# INFORMAÇÕES TÉCNICAS

## **Vaginites e uretrites (inflamação na uretra) por *Gardnerella vaginalis*:**

-2g, em dose única, no primeiro e terceiro dia de tratamento **ou**

-400 a 500mg, 2 vezes ao dia, durante 7 dias.

O parceiro sexual deve ser tratado com 2g, em dose única.

## **Giardíase:**

-250mg, 3 vezes ao dia, por 5 dias.

## **Amebíase:**

-Amebíase intestinal: 500mg, 4 vezes ao dia, durante 5 a 7 dias **ou**

-Amebíase hepática: 500mg, 4 vezes ao dia, durante 7 a 10 dias.

## **-Infecções por bactérias anaeróbias**

### **Adultos e crianças maiores de 12 anos**

400mg (1 comprimido de metronidazol 400mg três vezes ao dia, durante 7 dias ou à critério médico. Tomar após as refeições.

Para crianças, metronidazol deve ser usado preferencialmente na forma de suspensão - (benzoilmetronidazol).

Não há estudos dos efeitos de metronidazol administrado por vias não recomendadas. Portanto, por segurança e para eficácia deste medicamento, a administração deve ser somente pela via oral.

**Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.**

**Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

**Este medicamento não deve ser partido ou mastigado.**

# INFORMAÇÕES TÉCNICAS

## **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Caso esqueça de tomar uma dose, tome-a assim que possível. No entanto, se estiver próximo do horário da dose seguinte espere por este horário. Nunca tome duas doses ao mesmo tempo.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

## **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Reação muito comum (ocorre em mais de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento).

Reação comum (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento).

Reação incomum (ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento).

Reação rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento).

Reação muito rara (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento).

**Distúrbios gastrintestinais:** dor epigástrica (dor de estômago), náusea, vômito, diarreia, mucosite oral (inflamação dos tecidos moles da boca), alterações no paladar (incluindo gosto metálico), anorexia (redução ou perda do apetite) casos reversíveis de pancreatite (inflamação no pâncreas), descoloração da língua/sensação de língua áspera (devido ao crescimento de fungo, por exemplo).



# INFORMAÇÕES TÉCNICAS

**Distúrbios do sistema imunológico:** angioedema (presença de edema de pele, mucosas ou vísceras, acompanhadas de urticárias), choque anafilático (reação alérgica grave).

**Distúrbios do sistema nervoso:** neuropatia (doença que afeta um ou vários nervos) sensorial periférica, dores de cabeça, convulsões, tontura, relatos de encefalopatia (por exemplo, confusão) e síndrome cerebelar subaguda [por exemplo, ataxia, disartria (dificuldade de articular as palavras), alteração da marcha (dificuldade de andar), nistagmo (movimento involuntário, rápido e repetitivo do globo ocular) e tremor], que podem ser resolvidos com a descontinuação do tratamento com o medicamento; meningite asséptica (inflamação nas membranas e tecidos que envolvem o cérebro sem causa infecciosa).

**Distúrbios psiquiátricos:** alterações psicóticas incluindo confusão e alucinações, humor depressivo.

**Distúrbios visuais:** alterações visuais transitórias como diplopia (visão dupla), miopia (visão curta), visão borrada, diminuição da acuidade (qualidade) visual e alteração da visualização das cores, neuropatia óptica (doença que afeta um ou vários nervos, neste caso o nervo óptico)/neurite.

**Distúrbios do ouvido e labirinto:** deficiência auditiva/perda da audição (incluindo neurossensorial), tinido (zumbido no ouvido).

# INFORMAÇÕES TÉCNICAS

**Distúrbios no sangue e no sistema linfático:** foram relatados casos de agranulocitose (diminuição acentuada na contagem de células brancas do sangue), neutropenia (diminuição do número de neutrófilos no sangue) e trombocitopenia (diminuição no número de plaquetas sanguíneas).

**Distúrbios hepatobiliares:** foram relatados casos de aumento das enzimas do fígado (AST, ALT e fosfatase alcalina) e hepatite colestática ou mista (tipos de inflamações do fígado) e lesão das células do fígado, algumas vezes se manifestando com icterícia (cor amarelada da pele e olhos). Foram relatados casos de falência da função do fígado necessitando de transplante em pacientes tratados com metronidazol em associação com outros medicamentos antibióticos.

**Distúrbios na pele e tecido subcutâneo:** rash (erupções cutâneas), prurido (coceira), rubor, urticária (erupção na pele, geralmente de origem alérgica, que causa coceira), erupções pustulosas (pequenas bolhas com conteúdo amarelado "pus"), pustulose exantemática generalizada aguda (doença rara, que se caracteriza pelo desenvolvimento abrupto de pústulas sobre áreas da pele, acompanhadas por febre alta e aumentos dos leucócitos no sangue), erupção fixa medicamentosa (lesão na pele devido à reação alérgica a medicamentos), síndrome de Stevens- Johnson (forma grave de reação alérgica caracterizada por bolhas em mucosas e em grandes áreas do corpo), necrólise epidérmica tóxica (quadro grave, caracterizado por erupção generalizada, com bolhas rasas extensas e áreas de necrose epidérmica, à semelhança de grande queimadura, resultante principalmente de uma reação tóxica a vários medicamentos).

**Distúrbios gerais:** febre.

# INFORMAÇÕES TÉCNICAS

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.**

**Informe também a empresa através do seu serviço de atendimento.**

## **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Foram relatadas ingestões orais únicas de doses de até 12g de metronidazol em tentativas de suicídio e superdoses acidentais.

Os sintomas ficaram limitados a vômito, ataxia (falta de coordenação dos movimentos) e desorientação leve.

Não existe antídoto específico para superdose com metronidazol. Em caso de suspeita de superdose pesada, o médico deve instituir tratamento sintomático e de suporte.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.**

**Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA**

**SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA.**

**\$UCE\$\$O E BOA\$ VENDA\$!!!**

# **DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E MERCADOS**



SE É TEUTO,  
É DE CONFIANÇA

**Ficha: Metronidazol 250mg****Cód. do produto** 4251**OBS:** Lançamento!!!**Classe** GE**Denominação genérica** Metronidazol**Apresentação** Caixa com 20 comprimidos de 250mg**Restrição de uso** Venda sob prescrição médica  
Só pode ser vendido com retenção da receita**Via de administração** Via Oral**Nº de MS** 1.0370.0714.001-5**Cód. de Barras** 7896112102519**Cód da Caixa de Embarque** 301351**Quant. de unidades por CE.** 100 unidades**Dimensões da CE.** CX/EMB 01A 265X265X216**Faca/Dimensões da Cartonagem** F021-50x25x105mm**Classe Terapêutica** Antiparasitários**Tipo de Tarja** Tarja Vermelha

	ICMS	12%	17%	17,5%	18%	19%	20%
<b>Aliquotas</b>	Preço Fábrica	R\$ 6,82	R\$ 7,23	R\$ 7,28	R\$ 7,32	R\$ 7,41	R\$ 7,50
	Preço Consumidor	R\$ 9,43	R\$ 10,00	R\$ 10,06	R\$ 10,12	R\$ 10,24	R\$ 10,37

**Referência** Flagyl - Sanofi**Composição**

Cada comprimido de 250mg contém:

metronidazol.....250mg

Excipiente q.s.p.....1 comprimido

Excipientes: amido, povidona, álcool etílico, celulose microcristalina, crospovidona e estearato de magnésio.

**Embalagem Primária** PVC CRISTAL**Classificação fiscal** 30049066**Lista PIS/Confins** Positivo (0%)**IPi** 0%**Validade** 24 meses**Peso unitário** 0,02 kg**Peso por Cx. de Embarque** 2 kg**Sucesso e  
Boas Vendas!!!**

Ficha: **Metronidazol 400mg**

Cód. do produto **4266**

OBS: **Lançamento!!!**

Classe **GE**

Denominação genérica Metronidazol

Apresentação Caixa com 24 comprimidos de 400mg

Restrição de uso Venda sob prescrição médica  
Só pode ser vendido com retenção da receita

Via de administração Via Oral

Nº de MS 1.0370.0714.008-2

Cód. de Barras 7896112102663

Cód da Caixa de Embarque 301384

Quant. de unidades por CE. 40 unidades

Dimensões da CE. CX/EMB 02B 265X165X216

Faca/Dimensões da Cartonagem F023-50x40x105mm

Classe Terapêutica Antiparasitários

Tipo de Tarja Tarja Vermelha

	ICMS	12%	17%	17,5%	18%	19%	20%
Aliquotas	Preço Fábrica	R\$ 11,00	R\$ 11,67	R\$ 11,74	R\$ 11,81	R\$ 11,96	R\$ 12,11
	Preço Consumidor	R\$ 15,21	R\$ 16,13	R\$ 16,23	R\$ 16,33	R\$ 16,53	R\$ 16,74

Referência **Flagyl - Sanofi**

Composição Cada comprimido de 400mg contém:  
metronidazol.....400mg  
Excipiente q.s.p.....1 comprimido  
Excipientes: amido, povidona, álcool etílico, celulose microcristalina, crospovidona e estearato de magnésio.

Embalagem Primária PVC CRISTAL

Classificação fiscal 30049066

Lista PIS/Confins Positivo (0%)

IPI 0%

Validade 24 meses

Peso unitário 0,033 kg

Peso por Cx. de Embarque 1,32 kg

**Sucesso e  
Boas Vendas!!!**