

RELANÇAMENTO

NEOMICINA + BACITRACINA




**Pomada 5MG + 250.000.000UI/g bisnaga 15G/
50G**

"Material de divulgação exclusivo aos profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos".


"Medicamento Genérico Lei nº 9.787, de 1999".

MERCADO

Mercado Total - Neomicina+Bacitracina (MAT - Unids)



**Mercado Total - Neomicina + Bacitracina
(MAT - Reais)**




> O mercado total de Neomicina + Bacitracina faturou mais de 16,9 milhões em unidades com um rendimento de 176 milhões de reais* no último ano.


*MAT. Fonte: (Close Up RM - Setembro /2019).

MERCADO

Mercado Total - Neomicina + Bacitracina 15g (MAT - Unids)





Mercado Total - Neomicina + Bacitracina 15 g (MAT - Reais)



- > Na concentração de 5mg+250UI x 15 gramas, faturou mais de 108,6 milhões de reais e mais de 12,2 milhões de unidades vendidas no último ano. Se considerarmos uma média mensal, teremos mais de 9 milhões de reais por mês*. *MAT. Fonte: (Close Up RM - Setembro /2019).

MERCADO



- > Na concentração de 5mg+ 250UI x 50g, tem-se uma evolução de mais de 16% no último ano, vendendo mais de 2,9 milhões de unidades, com um rendimento de 50,6 milhões de reais* no último ano.

*MAT. Fonte: (Close Up RM – Setembro /2019).

COMPARATIVO DE PREÇOS*

NEOMICINA+BACITRACINA 5MG/250UI x 15G

PRODUTO	LABORATÓRIO	20% PF	20% PMC	18% PF	18% PMC	17% PF	17% PMC	12% PF	12% PM
NEBACETIN	TAKEDA PHARMA	R\$ 13,20	R\$ 17,57	R\$ 12,83	R\$ 17,09	R\$ 12,65	R\$ 16,86	R\$ 11,83	R\$ 15,80
NEOMICINA+BACITRACINA	MEDLEY	R\$ 7,75	R\$ 9,92	R\$ 7,24	R\$ 9,65	R\$ 7,14	R\$ 9,52	R\$ 6,68	R\$ 8,92
NEOMICINA+BACITRACINA	EMS	R\$ 7,29	R\$ 10,08	R\$ 7,11	R\$ 9,83	R\$ 7,02	R\$ 9,70	R\$ 6,63	R\$ 9,17
NEOMICINA+BACITRACINA	CIMED	R\$ 6,96	R\$ 6,26	R\$ 6,76	R\$ 9,01	R\$ 6,67	R\$ 8,89	R\$ 6,23	R\$ 8,32
NEBACIMED	CIMED	R\$ 10,97	R\$ 14,60	R\$ 10,65	R\$ 14,20	R\$ 10,51	R\$ 14,00	R\$ 9,82	R\$ 13,10
NEOMICINA+BACITRACINA	PRATI-DONADUZZI	R\$ 7,20	R\$ 9,58	R\$ 7,00	R\$ 9,32	R\$ 6,90	R\$ 9,19	R\$ 6,45	R\$ 8,61
NEOMICINA+BACITRACINA	NEO QUIMICA	R\$ 8,25	R\$ 10,98	R\$ 8,02	R\$ 10,69	R\$ 7,91	R\$ 10,54	R\$ 7,40	R\$ 9,88
NEOTRICIN	LEGRAND	R\$ 12,16	R\$ 16,19	R\$ 11,82	R\$ 15,75	R\$ 11,66	R\$ 15,54	R\$ 10,90	R\$ 14,50
BACTODERM	KLEY HERTZ	R\$ 9,96	R\$ 13,26	R\$ 9,68	R\$ 12,90	R\$ 9,55	R\$ 12,73	-	-
BACINA	BELFAR	R\$ 14,29	R\$ 19,76	R\$ 13,94	R\$ 19,27	R\$ 13,77	R\$ 19,04	R\$ 12,99	R\$ 17,90
NEOMICINA+BACITRACINA	TEUTO	R\$ 9,57	R\$ 12,74	R\$ 9,30	R\$ 12,39	R\$ 9,17	R\$ 12,22	R\$ 8,58	R\$ 11,40

Fonte: ABC FARMA Outubro/2019

**Os preços contemplam apenas o período de Lançamento do Produto. Caso deseje os preços atualizados, consultar seu gerente ou consultor.*

COMPARATIVO DE PREÇOS*

NEOMICINA+BACITRACINA 5MG/250UI x 15G				
PRODUTO	LABORATÓRIO	18% PF	DIF %	DIF R\$
NEBACETIN	TAKEDA PHARMA	R\$ 12,83	27,51%	R\$ 3,53
NEOMICINA+BACITRACINA	MEDLEY	R\$ 7,24	-28,45%	-R\$ 2,06
NEOMICINA+BACITRACINA	EMS	R\$ 7,11	-30,80%	-R\$ 2,19
NEOMICINA+BACITRACINA	CIMED	R\$ 6,76	-37,57%	-R\$ 2,54
NEBACIMED	CIMED	R\$ 10,65	12,68%	R\$ 1,35
NEOMICINA+BACITRACINA	PRATI-DONADUZZI	R\$ 7,00	-32,86%	-R\$ 2,30
NEOMICINA+BACITRACINA	NEO QUIMICA	R\$ 8,02	-15,96%	-R\$ 1,28
NEOTRICIN	LEGRAND	R\$ 11,82	21,32%	R\$ 2,52
BACTODERM	KLEY HERTZ	R\$ 9,68	3,93%	R\$ 0,38
BACINA	BELFAR	R\$ 13,94	33,29%	R\$ 4,64
NEOMICINA+BACITRACINA	TEUTO	R\$ 9,30		

**Os preços contemplam apenas o período de Lançamento do Produto. Caso deseje os preços atualizados, consultar seu gerente ou consultor.*

COMPARATIVO DE PREÇOS*

NEOMICINA+BACITRACINA 5MG/250UI x 15G

PRODUTO	LABORATÓRIO	18%PMC	DIF %	DIF R\$
NEBACETIN	TAKEDA PHARMA	R\$ 17,09	45,58%	R\$ 7,79
NEOMICINA+BACITRACINA	MEDLEY	R\$ 9,65	3,63%	R\$ 0,35
NEOMICINA+BACITRACINA	EMS	R\$ 9,83	5,39%	R\$ 0,53
NEOMICINA+BACITRACINA	CIMED	R\$ 9,01	-3,22%	-R\$ 0,29
NEBACIMED	CIMED	R\$ 14,20	34,51%	R\$ 4,90
NEOMICINA+BACITRACINA	PRATI-DONADUZZI	R\$ 9,32	0,21%	R\$ 0,02
NEOMICINA+BACITRACINA	NEO QUIMICA	R\$ 10,69	13,00%	R\$ 1,39
NEOTRICIN	LEGRAND	R\$ 15,75	40,95%	R\$ 6,45
BACTODERM	KLEY HERTZ	R\$ 12,90	27,91%	R\$ 3,60
BACINA	BELFAR	R\$ 19,27	51,74%	R\$ 9,97
NEOMICINA+BACITRACINA	TEUTO	R\$ 12,39		

**Os preços contemplam apenas o período de Lançamento do Produto. Caso deseje os preços atualizados, consultar seu gerente ou consultor.*

COMPARATIVO DE PREÇOS*

NEOMICINA+BACITRACINA 5MG/250UI x 50G

PRODUTO	LABORATÓRIO	20% PF	20% PMC	18% PF	18% PMC	17% PF	17% PMC	12% PF	12% PMC
NEOMICINA+BACITRACINA	MEDLEY	R\$ 15,62	R\$ 20,79	R\$ 15,18	R\$ 20,22	R\$ 14,97	R\$ 19,95	R\$ 14,00	R\$ 18,70
NEBACETIN	TAKEDA PHARMA	R\$ 27,32	R\$ 36,36	R\$ 26,55	R\$ 35,37	R\$ 26,18	R\$ 34,90	R\$ 24,48	R\$ 32,70
NEOMICINA+BACITRACINA	PRATI-DONADUZZI	R\$ 14,91	R\$ 19,84	R\$ 14,50	R\$ 19,31	R\$ 14,29	R\$ 19,04	R\$ 13,37	R\$ 17,85
BACTODERM	KLEY HERTZ	R\$ 12,10	R\$ 16,11	R\$ 11,76	R\$ 15,67	R\$ 11,60	R\$ 15,46	-	-
NEOTRICIN	LEGRAND	R\$ 24,75	R\$ 32,94	R\$ 24,05	R\$ 32,04	R\$ 23,72	R\$ 31,62	R\$ 22,18	R\$ 26,63
NEOMICINA+BACITRACINA	TEUTO	R\$ 20,42	R\$ 27,18	R\$ 19,85	R\$ 26,45	R\$ 19,57	R\$ 26,09	R\$ 18,31	R\$ 24,46

Fonte: ABC FARMA Outubro/2019

**Os preços contemplam apenas o período de Lançamento do Produto. Caso deseje os preços atualizados, consultar seu gerente ou consultor.*

COMPARATIVO DE PREÇOS*

NEOMICINA+BACITRACINA 5MG/250UI x 50G

PRODUTO	LABORATÓRIO	18% PF	DIF %	DIF R\$
NEOMICINA+BACITRACINA	MEDLEY	R\$ 15,18	-30,76%	-R\$ 4,67
NEBACETIN	TAKEDA PHARMA	R\$ 26,55	25,24%	R\$ 6,70
NEOMICINA+BACITRACINA	PRATI- DONADUZZI	R\$ 14,50	-36,90%	-R\$ 5,35
BACTODERM	KLEY HERTZ	R\$ 11,76	-68,79%	-R\$ 8,09
NEOTRICIN	LEGRAND	R\$ 24,05	17,46%	R\$ 4,20
NEOMICINA+BACITRACINA	TEUTO	R\$ 19,85		

**Os preços contemplam apenas o período de Lançamento do Produto. Caso deseje os preços atualizados, consultar seu gerente ou consultor.*

COMPARATIVO DE PREÇOS*

NEOMICINA+BACITRACINA 5MG/250UI x 50G

PRODUTO	LABORATÓRIO	18% PMC	DIF %	DIF R\$
NEOMICINA+BACITRACINA	MEDLEY	R\$ 20,22	-30,81%	-R\$ 6,23
NEBACETIN	TAKEDA PHARMA	R\$ 35,37	25,22%	R\$ 8,92
NEOMICINA+BACITRACINA	PRATI- DONADUZZI	R\$ 19,31	-36,98%	-R\$ 7,14
BACTODERM	KLEY HERTZ	R\$ 15,67	-68,79%	-R\$ 10,78
NEOTRICIN	LEGRAND	R\$ 32,04	17,45%	R\$ 5,59
NEOMICINA+BACITRACINA	TEUTO	R\$ 26,45		

**Os preços contemplam apenas o período de Lançamento do Produto. Caso deseje os preços atualizados, consultar seu gerente ou consultor.*

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Condições especiais de lançamento, consulte seu gerente ou consultor.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

sulfato de neomicina + bacitracina zíncica

"Medicamento Genérico Lei nº 9.787, de 1999".

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Este medicamento é indicado para o tratamento de infecções da pele e/ou de mucosas, causadas por diferentes bactérias, como por exemplo: nas “dobras” da pele, ao redor dos pêlos, na parte de fora da orelha, nos furúnculos, nas lesões com pus, na acne infectada, nas feridas abertas (como úlceras na pele) e nas queimaduras de pele.

O sulfato de neomicina + bacitracina zíncica também é indicado para prevenir infecções de pele e/ou de mucosas após ferimentos, cortes (inclusive de cirurgias) e queimaduras pequenas

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Este medicamento contém dois antibióticos, a neomicina e a bacitracina zíncica, que juntos inibem o crescimento de vários tipos de bactérias, principalmente as que costumam causar infecções de pele e de mucosas. Por isso, o sulfato de neomicina + bacitracina zíncica é eficaz para tratar e para prevenir infecções de pele e de mucosas.

Os efeitos do sulfato de neomicina + bacitracina zíncica começam logo após sua aplicação. Na maioria dos casos, pode-se observar a melhora da lesão cerca de dois ou três dias após o início do tratamento. Contudo, a resposta ao tratamento depende, dentre outros fatores, do tamanho e tipo da lesão e da defesa do

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

organismo do paciente. Caso não seja observada uma melhora, informe seu médico.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve usar este medicamento se tiver alergia à neomicina, aos antibióticos aminoglicosídeos e outros componentes da fórmula. Você também não deve usar sulfato de neomicina + bacitracina zíncica se tiver perda da função dos rins (insuficiência renal grave) ou se você já teve ou tem problemas de audição ou de equilíbrio (sistema labiríntico). Não deve ser utilizada durante a gravidez ou a amamentação.

Este medicamento está contraindicado para bebês prematuros, recém-nascidos e lactantes.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Se você tiver doenças neuromusculares, como por exemplo, *Myasthenia gravis* e utilizar medicamentos relaxantes musculares ao mesmo tempo, somente use o sulfato de neomicina + bacitracina zíncica após a avaliação do seu médico.

Se você já usou antibióticos aminoglicosídeos (por exemplo, a canamicina e/ou a estreptomicina) ou se você usa ao mesmo tempo o sulfato de neomicina + bacitracina zíncica e outros antibióticos aminoglicosídeos, somente use o sulfato de neomicina + bacitracina zíncica após a avaliação do seu médico, pois pode haver uma maior chance de aparecerem efeitos colaterais.

Se você aplicar o sulfato de neomicina + bacitracina zíncica em grandes feridas na pele, pode haver uma maior absorção do medicamento para o sangue. Nos casos em que esta absorção é muito grande, e principalmente se você já tem problemas na função dos rins, ou se você usa outros medicamentos que podem alterar a

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

função dos rins ou da audição, podem ocorrer eventualmente problemas nos rins ou de audição.

O sulfato de neomicina + bacitracina zíncica não deve ser usado nos olhos.

Precauções

Gravidez e amamentação: se você estiver grávida, não deve utilizar este medicamento sem orientação médica. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Pacientes idosos: Não há restrições ou recomendações especiais com relação ao uso do sulfato de neomicina + bacitracina zíncica caso você seja idoso.

Uso com outras substâncias: Evite o uso simultâneo de outros medicamentos, tais como os antibióticos aminoglicosídeos, as cefalosporinas, a anfotericina B, a ciclosporina, o metoxiflurano e os diuréticos de alça, pela possibilidade de afetarem os rins e a audição. Os antibióticos aminoglicosídeos, como a neomicina, podem potencializar o efeito dos relaxantes musculares.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C). PROTEGER DA LUZ E UMIDADE.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Características do medicamento: Pomada de cor branca a amarelada que pode apresentar porções contendo líquido incolor.

Informamos que na composição do produto há óleos de consistência pastosa e líquida.

Dependendo das condições em que o produto é estocado ou transportado, passando por mudanças drásticas da temperatura em um curto período de tempo, pode ocasionar separação desses óleos ou ainda o óleo de consistência pastosa pode estar parcialmente líquido, então, dessa forma ao abrir o produto pode haver escoamento de um líquido incolor.

Se isso ocorrer, o produto poderá ser utilizado normalmente. Informamos que a qualidade do produto não foi afetada.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6 . COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Modo de usar

Aplique uma fina camada do produto, 2 a 5 vezes ao dia com o auxílio de uma gaze. Mantenha o tratamento por mais 2 a 3 dias, após os sintomas terem desaparecido. Para que não ocorra um excesso da absorção do medicamento para o sangue, quando você aplicar o sulfato de neomicina + bacitracina zíncica em grandes áreas ou queimaduras, o tratamento deve ser feito por poucos dias (no máximo 8 a 10 dias).

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Como usar

Antes de você aplicar o produto, lave a região afetada com água e sabão, e seque cuidadosamente o local. Depois da aplicação, você pode proteger a região tratada com gaze.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica ou de seu cirurgião-dentista.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso você tenha esquecido de aplicar uma dose, aplique o medicamento assim que possível. Se estiver muito perto do horário da próxima dose, aguarde e aplique somente uma única dose. Não aplique duas doses ao mesmo tempo ou uma dose extra para compensar a dose perdida.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

Reação comum ($>1/100$ e $<1/10$): Podem ocorrer reações alérgicas locais, limitadas ao local de aplicação em cerca de 1,5% dos pacientes.

Quando o medicamento é utilizado de forma correta, geralmente não se espera nenhum efeito tóxico, pois a dose recomendada é baixa.

Porém, em alguns casos, quando o medicamento é usado em doses muito altas ou

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

quando há um excesso da absorção de neomicina para o sangue, isto pode alterar a função dos rins, a audição/ou o equilíbrio (sistema labiríntico). Quando o paciente já tem alteração na função dos rins, há a possibilidade de ocorrer um acúmulo de antibióticos no sangue, que, em alguns casos, afeta a audição. Podem ocorrer paralisias parciais dos músculos, sensação de formigamento e dores musculares. O médico deve ser avisado quanto ao aparecimento dos seguintes sintomas: coceira, vermelhidão corporal e/ou facial (*rash*), inchaço ou quaisquer sintomas não notados anteriormente ao tratamento e perda auditiva (casos raros).

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.

Informar também a empresa através de seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

É pouco provável que ocorra um quadro de intoxicação com o uso do sulfato de neomicina + bacitracina zínica, quando as doses e a forma de aplicação são feitas de forma adequada. No entanto, caso o medicamento seja usado em quantidade excessiva, lave a região imediatamente com água e sabão neutro, e seque com gaze ou pano limpo. Procure assistência médica, caso apareçam reações indesejáveis.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001 se você precisar de mais orientações.

\$UCE\$\$O E BOA\$ VENDA\$!!!

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E MERCADOS



SE É TEUTO,
É DE CONFIANÇA

Ficha: SULFATO DE NEOMICINA+BACITRACINA ZÍNCICA (15G)
Cód. do produto 3386

OBS: Relançamento!

Classe GO

Denominação genérica sulfato de neomicina + bacitracina zíncica

Apresentação Pomada 5mg + 250UI com 15g

Restrição de uso Uso adulto e pediátrico

Via de administração Uso tópico

Nº de MS 1.0370.0521.002-4

Cód. de Barras 7896112133865

Cód da Caixa de Embarque 301055

Quant. de unidades por CE. 90 unidades

Dimensões da CE. CX/EMB 49A 09X302X149

Faca/Dimensões da Cartonagem F-07H 33x29x149mm

Classe Terapêutica Antiinfecioso tópico

Tipo de Tarja Sem tarja

	ICMS	12%	17%	17,5%	18%	19%	20%					
Aliquotas												
Preço Fábrica	R\$	8,58	R\$	9,17	R\$	9,24	R\$	9,30	R\$	9,43	R\$	9,57
Preço Consumidor	R\$	11,46	R\$	12,22	R\$	12,31	R\$	12,39	R\$	12,56	R\$	12,74

Referência Nebacetin - Takeda

Cada grama da pomada contém:
 sulfato de neomicina (equivalente a 3,5mg de neomicina base).....5mg
 bacitracina (na forma de bacitracina zíncica)..... 250UI
 Excipiente q.s.p.....1g
 Excipientes: cloreto de benzalcônio, oleato de sorbitana, petrolato líquido e petrolato branco

Embalagem Primária Bisnaga de alumínio revestimento Ouro - Epóxi-fenólico

Classificação fiscal 30049099

Lista PIS/Confins Negativo (12%)

IPI 0%

Validade 24 meses

Peso unitário 0,03 kg

Peso por Cx. de Embarque 2,700 Kg

Sucesso e Boas Vendas!!!

Ficha: SULFATO DE NEOMICINA+BACITRACINA ZÍNCICA (50G)Cód. do produto **3390**OBS: **Relançamento!**Classe **GO**

Denominação genérica sulfato de neomicina + bacitracina zíncica

Apresentação Pomada 5mg + 250UI com 50g

Restrição de uso Uso adulto e pediátrico

Via de administração Uso tópico

Nº de MS 1.0370.0521.004-0

Cód. de Barras 7896112133902

Cód da Caixa de Embarque 301358

Quant. de unidades por CE. 100 unidades

Dimensões da CE. CX/EMB 32B AUT 500X340X188

Faca/Dimensões da Cartonagem F-17H 49x33x186mm

Classe Terapêutica Antiinfecioso tópico

Tipo de Tarja Sem tarja

	ICMS	12%	17%	17,5%	18%	19%	20%
Aliquotas	Preço Fábrica	R\$ 18,31	R\$ 19,57	R\$ 19,71	R\$ 19,85	R\$ 20,14	R\$ 20,42
	Preço Consumidor	R\$ 24,46	R\$ 26,09	R\$ 29,27	R\$ 26,45	R\$ 26,82	R\$ 27,18

Referência **Nebacetin - Takeda**

Composição

Cada grama da pomada contém:

sulfato de neomicina (equivalente a 3,5mg de neomicina base)..... 5mg

bacitracina (na forma de bacitracina zíncica)..... 250UI

Excipiente q.s.p..... 1g

Excipientes: cloreto de benzalcônio, oleato de sorbitana, petrolato líquido e petrolato branco

Embalagem Primária Bisnaga de alumínio revestimento Ouro - Epóxi-fenólico

Classificação fiscal 30049099

Lista PIS/Confins Negativo(12%)

IPI 0%

Validade 24 meses

Peso unitário 0,075 kg

Peso por Cx. de Embarque 7,500 kg

Sucesso e Boas Vendas!!!