

INCLUSÃO DE APRESENTAÇÃO

NISTATINA




SUSP. ORAL 100. 000UI/ML C/01 FR. 50ML+COP. MED.

"Medicamento Genérico Lei nº 9.787, de 1999".

"Material de divulgação exclusivo aos profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos".

MERCADO



- > O laboratório Teuto é líder deste mercado na apresentação genérico suspensão oral 100.000 UI/ ML frasco c/50 ml sabor cereja, uso adulto e pediátrico (incluindo lactentes).
- > O mercado total de Nistatina vende aproximadamente 183,6 mil unidades por mês, resultando um faturamento de mais de 3,6 milhões de reais no período entre Setembro/2020 e Setembro/2021.*
- > A nossa apresentação genérica na forma farmacêutica suspensão oral, na concentração de: 100.000 UI/ ML frasco c/50 ml, representa cerca de 32,84% do mercado total desta molécula.

*MAT. Fonte: (Close Up RM - Setembro/2021).

COMPARATIVO DE PREÇOS*

NISTATINA SUSP. ORAL 100.000UI/ML 50ML FR. C/01

PRODUTO	LABORATÓRIO	20% PF	20% PMC	18% PF	18% PMC	17% PF	17% PMC	12% PF	12% PMC
NISTATINA	EMS	R\$ 24,06	R\$ 33,26	R\$ 23,48	R\$ 32,46	R\$ 23,19	R\$ 32,06	R\$ 21,88	R\$ 30,25
NISTATINA	GERMED PHARMA	R\$ 21,71	R\$ 30,01	R\$ 21,18	R\$ 29,28	R\$ 20,93	R\$ 28,93	R\$ 19,74	R\$ 27,29
NISTATINA	CRISTALIA	R\$ 21,77	R\$ 30,10	R\$ 21,24	R\$ 29,37	R\$ 20,98	R\$ 29,01	R\$ 19,80	R\$ 27,37
NISTATINA	LEGRAND	R\$ 22,96	R\$ 31,74	R\$ 22,40	R\$ 30,97	R\$ 22,13	R\$ 30,59	R\$ 20,88	R\$ 28,87
MICOSTALAB	MULTILAB	R\$ 21,45	R\$ 29,65	R\$ 20,93	R\$ 28,93	R\$ 20,67	R\$ 28,58	R\$ 19,50	R\$ 26,96
CANDITRAT	TEUTO	R\$ 16,85	R\$ 23,29	R\$ 16,44	R\$ 22,73	R\$ 16,24	R\$ 22,45	R\$ 15,32	R\$ 21,18
NISTATINA	TEUTO	R\$ 20,18	R\$ 20,18	R\$ 19,68	R\$ 27,21	R\$ 19,45	R\$ 26,89	R\$ 18,34	R\$ 25,35

Fonte: Revista Kairos online Outubro / 2021

NISTATINA SUSP. ORAL 100.000UI/ML 50ML FR. C/01

PRODUTO	LABORATÓRIO	18% PF	DIF %	DIF R\$
NISTATINA	PRATI-DONADUZZI	R\$ 23,48	16,18%	R\$ 3,80
NISTATINA	EMS	R\$ 21,18	7,08%	R\$ 1,50
NISTATINA	GERMED PHARMA	R\$ 21,24	7,34%	R\$ 1,56
NISTATINA	NOVA QUIMICA	R\$ 22,40	12,14%	R\$ 2,72
NISTAMAX	NATULAB	R\$ 20,93	5,97%	R\$ 1,25
MICOSTALAB	MULTILAB	R\$ 16,44	-19,71%	-R\$ 3,24
NISTATINA	TEUTO	R\$ 19,68		

*Os preços contemplam apenas o período de Lançamento do Produto. Caso deseje os preços atualizados, consultar seu gerente ou consultor.

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Condições especiais de lançamento, consulte seu gerente ou consultor.

DIFERENCIAS DO PRODUTO

- ✓ O laboratório Teuto é líder deste mercado na apresentação genérico suspensão oral 100.000 UI/ ML frasco c/50 ml sabor cereja, uso adulto e pediátrico (incluindo lactentes).
- ✓ Incluindo no mercado as apresentações com o copo medida, uma vez que já temos com conta-gotas;
 - ✓ Produto de bom valor agregado;
- ✓ Temos um preço competitivo e ótima rentabilidade para distribuidores e drogarias.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

nistatina

Medicamento Genérico Lei nº 9.787, de 1999.

1 . PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

A nistatina é um antifúngico, um produto destinado a combater os fungos, entre eles um muito comum em recém-nascidos e lactentes - "o sapinho" (*Candida albicans*). Este fungo pode também aparecer na boca de indivíduos adultos, principalmente em casos de uso de próteses dentárias ou quando o organismo está enfraquecido por falta de nutrientes, vitaminas e problemas imunológicos.

Mais recentemente a ocorrência do "sapinho" em adultos, atingindo tanto a região da boca, como outras porções do trato digestivo (esôfago e intestinos), tem sido observada em pacientes portadores de moléstias graves ou tratamentos com imunodepressores e nos casos de queda da imunidade como ocorre na síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS).

2 . QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve utilizar este medicamento se for alérgico à nistatina ou aos demais componentes da fórmula. Você deve interromper o tratamento e procurar um médico imediatamente caso apresente irritação ou hipersensibilidade (alergia) a este medicamento.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento contém propilparabeno e metilparabeno que podem induzir reações alérgicas (as quais podem ser tardias em alguns casos).

A nistatina não deve ser usada para o tratamento de micoses sistêmicas.

Mesmo que ocorra uma melhora nos sintomas dentro dos primeiros dias do tratamento, você não deve interromper a medicação até o tratamento ser completado de acordo com as orientações do seu médico. Carcinogênese, Mutagênese, Comprometimento da Fertilidade: O potencial carcinogênico da nistatina, assim como seu efeito mutagênico na fertilidade não foram estabelecidos. Gravidez: A segurança para o uso durante a gravidez não foi estabelecida para apresentações orais de nistatina.

Também ainda não foi estabelecido se estas preparações podem provocar efeitos nocivos ao feto quando administradas a uma gestante ou pode afetar a reprodução.

Se você estiver grávida, poderá utilizar nistatina apenas após a prescrição do médico, pois ele que estabelecerá se os benefícios para a mãe justificam o potencial risco para o feto.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista.

Lactantes: Não foi comprovado se a nistatina é excretada no leite humano. Embora a absorção gastrointestinal seja insignificante, se você estiver amamentando deverá tomar alguns cuidados ao tomar nistatina, de acordo com orientações do seu médico.

Uso em crianças: vide “COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?”.

Uso em idosos: Não há recomendações especiais para pacientes idosos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Interações Medicamentosas: Não são conhecidas interações com outros medicamentos e/ou outras substâncias.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

4. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Para a aplicação da suspensão oral você deve higienizar a boca de maneira adequada, incluindo os cuidados necessários com a limpeza de próteses dentárias. A suspensão deve ser bochechada e mantida por vários minutos (o maior tempo possível) na boca antes de ser engolida. Nos lactentes (bebês em fase de amamentação) e crianças menores deve-se colocar a metade da dose utilizada em cada lado da boca.

Posologia: Via oral

Prematuros e crianças de baixo peso: estudos clínicos limitados demonstram que a dose de 1mL (100.000UI de nistatina) quatro vezes ao dia é efetiva.

Lactentes: a dose recomendada é de 1 ou 2mL (100.000 a 200.000 UI de nistatina) quatro vezes ao dia.

Crianças e Adultos: A faixa de dose usual varia de 1 a 6mL (100.000 a 600.000 UI de nistatina) quatro vezes ao dia.

A fim de evitar reinfecção, as doses para todas as apresentações devem ser mantidas no mínimo por 48 horas após o desaparecimento dos sintomas ou da negativação dos exames. Se os sinais e sintomas piorarem ou persistirem (após o 14º dia do início do tratamento) você deverá procurar seu médico para ser reavaliado.

Agite antes de usar.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

5. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

A nistatina é geralmente bem tolerada por todos os grupos de idade incluindo crianças debilitadas mesmo em terapia prolongada.

Você poderá apresentar hipersensibilidade (alergia) e angioedema (inchaço nas camadas mais profundas da pele), incluindo edema facial. Com grandes doses orais você poderá apresentar diarreia, distúrbios gastrintestinais (estômago e intestinos), enjoo e vômitos.

Raramente você poderá apresentar erupções cutâneas (pequenas bolhas avermelhadas na pele), incluindo urticária (coceira). Muito raramente você poderá apresentar

Síndrome de Stevens-Johnson (formação de edema com bolhas).

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também a empresa através do seu serviço de atendimento.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

NISTATINA É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. "SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO".

PARA MAIORES INFORMAÇÕES VIDE A BULA.

\$UCE\$\$O E BOA\$ VENDA\$!!!

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E MERCADOS



SE É TEUTO,
É DE CONFIANÇA

Ficha: NISTATINA
Cód. do produto 4561

OBS: Inclusão de Apresentação!

Classe GE

Denominação genérica Nistatina

Apresentação 100.000UI/ML SUSP ORAL C/01 FR 50ML+COP MED

Restrição de uso VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Via de administração USO ORAL. USO ADULTO E PEDIÁTRICO

Nº de MS 1.0370.0482.005-8

Cód. de Barras 7896112105619

Cód da Caixa de Embarque 301098 - CX/EMB 23A

Quant. de unidades por CE. 100 Unidades

Dimensões da CE. 515X260X214

Faca/Dimensões da Cartoagem F-24H - 50x50x105mm

Classe Terapêutica Antifúngico oral

Tipo de Tarja Tarja vermelha

	ICMS	12%	17%	17,5%	18%	20%
Aliquotas	Preço Fábrica	R\$ 18,34	R\$ 19,45	R\$ 19,56	R\$ 19,68	R\$ 20,18
	Preço Consumidor	R\$ 25,35	R\$ 26,89	R\$ 27,04	R\$ 27,21	R\$ 27,90

Referência Canditrat- Teuto

Cada mL da suspensão oral contém:

nistatina.....100.000UI

Veículo q.s.p..... 1mL

Composição

Excipientes: água de osmose reversa, carmelose sódica, glicerol, sacarina sódica, ciclamato de sódio, álcool etílico,

metilparabeno, metabissulfito de sódio, propilparabeno, hidróxido de sódio, aroma de menta e aroma

Embalagem Primária Frasco Vidro Âmbar

Classificação fiscal 30042099

Lista PIS/Confins Positivo (0,00%)

IPI 0%

Validade 24 meses

Peso unitário 0,124 kg

Peso por Cx. de Embarque 12,400 kg

Sucesso e Boas Vendas!!!