

Meloxicam

(Anti-inflamatório)



SE É TEUTO,
É DE CONFIANÇA

O meloxicam é indicado para o tratamento dos sintomas da artrite reumatoide e osteoartrite (doenças das articulações), aliviando a dor e a inflamação.

Referência: Bioflac - Cristália



3206 - 7896112132066

Fevereiro/22
MS: 1.0370.0530.003-1 – Meloxicam - Comprimido 15mg c/ 10 - "Medicamento Genérico - Lei nº 9.787/99"

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? Indicado no tratamento dos sintomas da artrite reumatoide e osteoartrite aliviando a dor e a inflamação. 2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Não usar se tiver alergia a qualquer componente da fórmula, se teve asma, pólipos nasais, inchaço da língua, lábios e garganta ou placas elevadas na pele, após o uso de ácido acetilsalicílico ou outros anti-inflamatórios. Não usar se tiver úlcera ou perfuração gastrointestinal; inflamação intestinal ou sangramento gastrointestinal ativo, sangramento cerebrovascular recente ou distúrbios de sangramento sistêmico; mau funcionamento grave do fígado e dos rins; mau funcionamento grave do coração e intolerância à lactose (contém lactose). É contraindicado para tratar dor após cirurgia de revascularização do miocárdio ou angioplastia. Contraindicado para menores de 12 anos e durante a gravidez e amamentação. 3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Podem ocorrer ulceração, perfuração ou sangramento do aparelho digestivo (inclusive fatal), mesmo que você não tenha sintomas prévios ou antecedentes de problemas digestivos graves. Deve-se ter cautela com o uso junto com anticoagulantes. Foram relatados casos de reações graves da pele, algumas fatais. Caso ocorra lesão na pele/mucosa ou outro sinal de alergia, interromper o tratamento. Meloxicam pode aumentar o risco de formação grave de coágulos dentro dos vasos sanguíneos, bem como de infarto e derrame. Pacientes idosos, desidratados, com insuficiência cardíaca congestiva, cirrose hepática, síndrome nefrótica, mau funcionamento dos rins, em tratamento com diuréticos, inibidores da ECA e outros medicamentos para controlar a pressão arterial ou com baixo volume sanguíneo após cirurgia de grande porte, têm risco de complicações renais com o uso de Meloxicam. Em casos de insuficiência renal grave em tratamento com hemodiálise, a dose de meloxicam não deve ser maior que 7,5mg por dia. Idosos precisam de cuidado especial, pois as funções dos rins, do fígado e do coração podem estar alteradas. Meloxicam pode causar retenção de água e sais minerais, ocasionando inchaço, e diminuir o efeito dos diuréticos, desencadeando o mau funcionamento do coração, ou ainda, pressão alta em pacientes com predisposição. Pode mascarar os sintomas iniciais de uma infecção. Durante o tratamento você poderá apresentar reações indesejadas como visão borrada, tontura ou sonolência. Portanto tenha cautela ao dirigir veículos e evite tarefas arriscadas caso apresente estas reações. Não usar se estiver tentando engravidar ou em investigação de infertilidade, pois ele pode prejudicar sua fertilidade. Este medicamento é contraindicado na gravidez e amamentação. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Não usar meloxicam com outros anti-inflamatórios (como corticoides, ácido acetilsalicílico, diclofenaco, nimesulida); Anticoagulantes orais, heparina parenteral, trombolíticos: podem aumentar o risco de sangramento. Antiplaquetários e inibidores seletivos de recaptação de serotonina: aumento do risco de sangramento; Lítio: pode haver aumento das concentrações de lítio no sangue, podendo chegar a níveis tóxicos. Metotrexato: pode haver aumento da concentração sanguínea de metotrexato; Se o uso combinado for realmente necessário, o médico deve monitorar a contagem de células sanguíneas e a função renal. O uso concomitante no período de 3 dias pode aumentar a toxicidade do metotrexato; Anticoncepcionais: pode ocorrer a diminuição da eficácia do DIU; Diuréticos: pode aumentar o risco de problemas renais graves em pacientes desidratados. Pode haver diminuição do efeito dos anti-hipertensivos; Antagonistas da ECA e bloqueadores do receptor de angiotensina II: pode aumentar o risco de lesão renal em pacientes com a função renal comprometida; pode ocorrer aumento da toxicidade nos rins pela ciclosporina com o uso em conjunto. O uso de meloxicam com antidiabéticos orais pode levar ao aumento de ambos no organismo. Não use medicamento sem conhecimento do médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. 4. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? A dose total diária deve ser tomada como uma dose única. A dose diária máxima recomendada é 15mg. Você deve seguir as doses recomendadas pelo seu médico. 5. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? Reações comuns: cefaleia, dor abdominal, indigestão, diarreia, náusea e vômitos. Reações incomuns: anemia, alergia, tontura, sonolência, aumento da pressão arterial, rubor facial, hemorragia gastrointestinal, gastrite, estomatite, constipação, flatulência, exames da função hepática e renal anormais, inchaço da língua, lábios e garganta, rash e prurido. Outras reações mais raras incluindo algumas graves podem ocorrer e estão descritas na íntegra na bula. 6. USO ORAL. USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 12 ANOS. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.

MELOXICAM É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCO.
PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.
"SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO"

Material informativo exclusivo para a equipe de venda do medicamento