




SE É TEUTO,
É DE CONFIANÇA

QUETIAPINA

(Antipsicótico)

Hemifumarato de quetiapina é indicado para o tratamento da esquizofrenia, como monoterapia ou adjuvante no tratamento dos episódios de mania associados ao transtorno afetivo bipolar, dos episódios de depressão associados ao transtorno afetivo bipolar, no tratamento de manutenção do transtorno afetivo bipolar em combinação com os estabilizadores de humor lítio ou valproato. Referência: Seroquel - Astrazeneca.



2111 - 7896112 121114



Abril/2021

MS. 1.0370.0596 – Hemifumarato de Quetiapina - 25 mg, 100mg e 200 mg caixas com 30 comprimidos revestidos - "Medicamento Genérico - Lei nº 9.787-99"

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? Quetiapina é indicada no tratamento da esquizofrenia; como monoterapia ou adjuvante no tratamento do transtorno afetivo bipolar (episódios maníaco, misto ou depressivo) em combinação com os estabilizadores de humor lítio ou Valproato. 2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Não utilizar se tiver alergia a quetiapina ou a qualquer componente da fórmula. Este medicamento é contraindicado para menores de 10 anos. 3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS e PRECAUÇÕES: Usar com cuidado nas seguintes situações: pacientes com sintomas de infecção, diabéticos ou que apresentem alterações nos níveis de triglicérides e colesterol. Parâmetros de peso, glicemia e lipídeos devem ser monitorados. Quetiapina pode induzir a queda de pressão arterial em pé, especialmente durante o início do tratamento. Cuidado também no uso em pacientes com histórico de apneia do sono e que estão recebendo depressivos do sistema nervoso central, pacientes com risco de pneumonia por aspiração e pacientes com história de convulsões. Usar com precaução em pacientes com síndrome neuroléptica maligna (caso isso ocorra, procure seu médico imediatamente), pacientes com distúrbios cardiovasculares ou história familiar de prolongamento do intervalo QT. Em pacientes com histórico de retenção urinária, hipertrofia prostática, obstrução intestinal, pressão intraocular elevada e com histórico de abuso de drogas ou álcool. Reações adversas de pele graves foram reportadas durante o uso de quetiapina. Informe seu médico o mais rápido possível se você tiver: Febre, sintomas de gripe, dor de garganta, ou de qualquer outra infecção, uma vez que pode ser resultado da contagem de células brancas do sangue muito baixa, podendo exigir a interrupção do tratamento. Foram descritos sintomas de abstinência por descontinuação repentina da Quetiapina. Quetiapina não está aprovada para o tratamento de pacientes idosos com psicose relacionada à demência. Pacientes tratados com medicamentos para transtornos psiquiátricos devem ser monitorados de perto quanto à piora clínica, tendência suicida ou alterações não usuais no comportamento. Possui lactose. Este medicamento não deve ser utilizado por grávidas sem orientação médica. Mulheres amamentando devem ser aconselhadas a evitar a amamentação enquanto fazem uso de quetiapina. Durante o tratamento, o paciente não deve dirigir veículos ou operar máquinas, pois sua habilidade e atenção podem estar prejudicadas. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Utilizar quetiapina com cuidado nas seguintes situações: Se estiver tomando bebidas alcoólicas e outras medicações que atuam no cérebro e no comportamento, em conjunto com outras medicações que são conhecidas por causar desequilíbrio eletrolítico ou por aumentar o intervalo QT; se estiver tomando outras medicações com efeitos anticolinérgicos; se estiver tomando tioridazina, carbamazepina, fenitoína, cetoconazol, rifampicina, barbitúricos, antifúngicos azóis, antibióticos macrolídeos, inibidores da protease (usados no tratamento do HIV) e medicamentos que causam constipação. Informe ao seu médico se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. 4. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Quetiapina pode ser tomada com ou sem alimentos. Nos primeiros 5 dias de tratamento as doses devem ser aumentadas gradativamente de acordo com orientação médica. As doses de manutenção variam de acordo com a doença e a resposta do paciente ao tratamento. Quetiapina deve ser usada com cautela em pacientes com insuficiência hepática conhecida e pode precisar de ajustes de doses para uso em idosos. Siga sempre a prescrição médica e as orientações da bula. Leia a bula para todos os detalhes de como usar este produto. 5. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? Reação muito comum (ocorre em 10% ou mais dos pacientes): boca seca, sintomas de abstinência por descontinuação, elevações dos níveis de triglicérides e colesterol total, diminuição de HDL colesterol, ganho de peso, tontura, sonolência, diminuição da contagem de hemoglobina e sintomas extrapiramidais. Reação comum (entre 1% e 10%): leucopenia e neutropenia, taquicardia, palpitações, visão borrada, constipação, vômito, fraqueza, inchaço nas extremidades, irritabilidade, aumento da glicemia, alterações dos hormônios tireoideanos, aumento do apetite, dispnéia, hipotensão ortostática e pesadelos. Reação incomum (entre 0,1% e 1%): bradicardia, disfagia, reações alérgicas, diminuição da contagem de plaquetas, convulsão, síndrome das pernas inquietas, desmaio e retenção urinária. Outras reações mais raras e que podem ser graves podem ocorrer, consulte a bula. 6. USO ORAL - USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 10 ANOS. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA.

HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA É UM MEDICAMENTO. DURANTE SEU USO, NÃO DIRIJA VEÍCULOS OU OPERE MÁQUINAS, POIS SUA AGILIDADE E ATENÇÃO PODEM ESTAR PREJUDICADAS.
"SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO."