



SE É TEUTO,  
É DE CONFIANÇA

## tinidazol + nitrato de miconazol

Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999.

30mg/g + 20mg/g

Creme vaginal

USO INTRAVAGINAL  
USO ADULTO

Contém **01** bisnaga com **45g** +  
**7** aplicadores de **5g**

TEUTO

**G**  
Medicamento  
Genérico

VENDA SOB  
PRESCRIÇÃO MÉDICA

# TINIDAZOL + MICONAZOL

(anti-infeccioso ginecológico)

O tinidazol + nitrato de miconazol é indicado no tratamento tópico (intravaginal) das vulvovaginites (infecções de vagina e vulva, região externa dos genitais femininos) sensíveis aos componentes da fórmula.

Referência: Gino colon – Geolab

Abril/24

MS. 1.0370.0577 – Tinidazol + Nitrato de Miconazol - Creme vaginal 30mg/g + 20mg/g bisn. 45g + 7 aplicadores – “Medicamento Genérico – Lei 9.787-99”

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? Indicado no tratamento tópico das vulvovaginites sensíveis aos componentes da fórmula. 2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? É contraindicado a pacientes com história prévia de hipersensibilidade ao tinidazol, ao miconazol ou a qualquer componente da fórmula. Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos. Este medicamento é contraindicado para uso por homens. 3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Em casos de reações de hipersensibilidade ou irritação local, o uso deve ser descontinuado. Bebidas alcoólicas ou outros preparados contendo álcool não devem ser ingeridos durante e até 3 dias após o tratamento com o medicamento. Utilizar medidas higiênicas para controlar as fontes de infecção ou de reinfecção. O tinidazol é excretado no leite materno. Se o medicamento for administrado durante o período de lactação, um método alternativo para alimentação da criança deverá ser instituído. Medicamento classificado na categoria C de risco de gravidez. Portanto, este medicamento não deve ser utilizado por grávidas sem orientação médica. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: A ingestão de álcool etílico é incompatível com o uso de medicamentos contendo tinidazol, dando lugar a reações, tais como náusea, vômito, cólicas abdominais e rubor. Bebidas alcoólicas ou outros preparados contendo álcool devem ser evitados durante e até 3 dias após o tratamento. 4. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO: Aplicar o conteúdo de 1 aplicador cheio (aproximadamente 5g de creme), por via intravaginal, 1vez por dia, antes de deitar-se, durante 7 dias seguidos. deve ser aplicado profundamente na vagina, de preferência fora do período menstrual. Porém, a paciente não deve descontinuar a medicação no caso do período menstrual iniciar durante o tratamento. Deve-se usar absorventes externos e não internos. A paciente deve continuar o uso do medicamento durante todos os dias do tratamento, mesmo que os sintomas melhorem nos primeiros dias. Para uma aplicação do medicamento mais fácil, o aplicador pode ser molhado com um pouco de água quente. Também pode ser usado um gel lubrificante, mas não se deve utilizar lubrificantes a base de petróleo (vaselina). 5. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? Foram reportados casos isolados de irritação local, com sensação de queimação. Caso isso ocorra, a administração do produto deve ser descontinuada. 6. Uso ginecológico. Uso adulto. Venda sob prescrição médica.

TINIDAZOL+MICONAZOL É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS.  
PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.  
“SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO”

Material informativo exclusivo para a equipe de venda do medicamento