



4745 - 7896112107453

4746 - 7896112107460

Axetilcefuroxima

(Antibiótico)

A axetilcefuroxima é indicada para o tratamento das seguintes situações: infecção da garganta (amigdalites e faringites), infecção do ouvido médio (otite média), infecção dos pulmões e dos brônquios (pneumonia e exacerbações agudas de doença pulmonar obstrutiva crônica), infecção da urina (infecção do trato urinário), infecções de pele (infecções cutâneas) e infecções dos seios da face (sinusites) desde que causados por germes sensíveis a medicação.

Referência: Zinnat – Sandoz

Abril/24

MS. 1.0370.0783 – Axetilcefuroxima - 500mg c/10 e c/14 comprimidos – “Medicamento Genérico – Lei 9.787-99”

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? É indicada no tratamento de amigdalites e faringites, otite média, pneumonias, infecção da urina, de pele e sinusites, desde que causados por germes sensíveis. 2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Não deve ser usada por alérgicos à cefuroxima, a qualquer outro componente da fórmula ou às cefalosporinas. 3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: O uso de axetilcefuroxima pode resultar em reações indesejáveis graves tais como reações alérgicas, infecções por fungos e diarreia severa (colite pseudomembranosa). Caso você apresente esses sintomas, procure o seu médico. Pode ser que ele recomende a interrupção do tratamento. Consulte o médico antes de usar este medicamento caso tenha problemas nos rins; se está grávida, pretende engravidar ou estiver amamentando. O médico irá avaliar os benefícios de tomar este medicamento em relação aos possíveis riscos ao bebê. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Antiácidos podem diminuir a eficiência de axetilcefuroxima. Axetilcefuroxima pode interferir na eficácia do seu anticoncepcional. 4. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO: Os comprimidos podem ser ingeridos com água e terão melhor efeito se você os tomar após uma refeição. A axetilcefuroxima não deve ser partido ou triturado. Para crianças que não podem engolir comprimidos, o médico deve indicar Axetilcefuroxima pó para suspensão oral. Use o medicamento de acordo com as instruções do médico. A receita médica lhe dirá quantos comprimidos tomar e com que frequência. Não tome mais comprimidos além daqueles que o médico recomendou. A posologia padrão costuma ser 1 comp. 500mg ao dia. Em alguns casos seu médico talvez precise aumentar essas doses. O tratamento deve durar normalmente 7 (sete) dias, mas o médico poderá recomendar diferentes períodos de uso da medicação conforme a infecção apresentada. 5. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? A maioria das pessoas que tomam este medicamento não apresentam problemas decorrentes de seu uso. Como acontece com todo medicamento, algumas pessoas podem sentir efeitos colaterais. Reações comuns (ocorrem entre 1% e 10% dos pacientes): infecções fúngicas; dor de cabeça, tonturas; diarreia; náuseas (enjoo); dor abdominal; aumento de eosinófilos e aumento de algumas enzimas hepáticas. Reações incomuns (ocorrem entre 0,1% e 1% dos pacientes): vômitos; erupções cutâneas. Outras reações mais raras estão descritas na íntegra na bula. 6. Uso oral. Uso adulto e pediátrico acima de 6 anos. Venda sob prescrição médica. Só pode ser vendido com retenção de receita.

AXETILCEFUROXIMA É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. “SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO”

Material informativo exclusivo para a equipe de venda do medicamento